

DICETEL[®] FILM COATED TABLET

Pinaverium Bromide 100mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan DICETEL
2. Bagaimana DICETEL berfungsi
3. Sebelum menggunakan DICETEL
4. Cara menggunakan DICETEL
5. Semasa menggunakan DICETEL
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan DICETEL
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan DICETEL

Setiap Dicetel tablet mengandungi 100mg pinaverium. Dicetel merawat dan melegakan gejala-gejala yang dikaitkan dengan sindrom usus besar (IBS) seperti sakit perut, gangguan usus (sembelit dan / atau cirit-birit) dan ketidakelesaan usus (kembung). Dicetel juga digunakan untuk melegakan gejala yang berkaitan dengan gangguan pundi hempedu.

Bagaimana DICETEL berfungsi

Dicetel berfungsi dengan melegakan otot-otot di dinding usus.

Sebelum menggunakan DICETEL

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Dicetel jika anda mempunyai sebarang alahan atau mempunyai tindak balas kepada mana-mana ramuan dalam Dicetel (lihat bahan-bahan).

- Sebelum mula menggunakan Dicetel

Jika anda intoleransi kepada laktosa, berbincanglah dengan doktor anda, kerana produk ini mengandungi laktosa.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor tentang semua preskripsi, over-the-counter (bukan preskripsi), dan ubat-ubatan herba yang anda ambil. Juga beritahu mereka tentang apa-apa ubat tambahan yang anda ambil. Oleh kerana kafein, alkohol, nikotin dari rokok, atau ubat jalanan boleh menjejaskan tindakan ubat-ubatan yang banyak, anda harus membenarkan prescriber anda tahu jika anda menggunakannya.

Cara menggunakan DICETEL

Tablet harus ditelan dengan segelas air semasa makan; jangan menghancurkan, mengunyah atau menghisap tablet.

Tablet tidak boleh ditelan ketika berada dalam posisi berbaring atau sebelum tidur.

- Berapa banyak harus digunakan

Dos dewasa ialah 1 tablet dua kali sehari. Dos boleh ditingkatkan sehingga maksimum 1 tablet tiga kali sehari.

- Bila perlu digunakan

Ambil hanya seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlepas satu dos, ambil tablet secepat yang mungkin dan teruskan dengan dos seterusnya seperti yang telah dijadualkan. Jika masa untuk pengambilan sudah sangat hampir, dos yang telah terlepas tidak perlu diambil. Jangan mengambil dos berganda untuk mencukupkan dos yang telah terlepas.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil lebih banyak tablet Dicetel daripada dos yang disyorkan, beritahu doktor anda dengan serta-merta. Tunjukkan kepada doktor pek tablet anda.

Semasa menggunakan DICETEL

- Perkara yang perlu dilakukan

Sebelum memulakan pengambilan ubat, pastikan anda memberitahu doktor sekiranya anda mempunyai penyakit lain atau alahan, rawatan ubat lain, hamil, menyusukan bayi dan keadaan lain mengenai kesihatan anda. Semua maklumat ini mungkin mempengaruhi pengambilan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Keselamatan pengambilan pinaverium semasa hamil belum dipastikan. Dicetel tidak boleh digunakan semasa kehamilan melainkan jika doktor anda memutuskan ia perlu. Dicetel tidak boleh digunakan semasa penyusuan susu ibu.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Sekiranya anda telah diberitahu oleh doktor bahawa anda mengalami laktosa intoleransi, jangan ambil ubat ini sebelum bercakap dengan doktor anda, kerana produk itu mengandungi laktosa.

Kesan-kesan sampingan

Seperti mana-mana ubat lain, Dicetel boleh menyebabkan kesan sampingan pada sesetengah orang. Sesetengah orang mungkin merasa sakit perut dan / atau kenyang, mual, muntah, kesukaran menelan, sembelit, pedih ulu hati, kembung atau cirit-birit. Oleh kerana kesan sampingan ini mirip dengan gejala IBS, mungkin sukar untuk membezakannya. Kesan sampingan yang lain termasuk sakit kepala, kekeringan mulut, mengantuk, pening, alergi kulit, ruam, gatal-gatal, kemerahan kulit dan tindak balas alergi. Luka atau kerosakan pada esofagus mungkin berlaku jika tablet Dicetel tidak diambil seperti yang diarahkan. Jika anda mendapat masalah ini atau apa-apa masalah lain semasa anda mengambil Dicetel, berjumpa doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web npra.moh.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan DICETEL

- Penyimpanan

- Jangan simpan di atas 30 °C
- Jauhi dari kanak-kanak
- Simpan di dalam pakej asal dan simpan blister di luar kotak untuk melindungi dari cahaya.
- Jangan gunakan ubat selepas tarikh luput yang dinyatakan pada kotak.

- Pelupusan

Jangan buang ubat ini dalam air buangan (contohnya: sinki, tandas) atau dalam sampah domestic. Sila tanya ahli farmasi bagaimana untuk membuang ubat ini sekiranya tidak digunakan lagi.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet Dicetel adalah biconvex bulat, tablet bersalut berwarna kuning oren untuk pengambilan melalui mulut, terukir "100" pada satu sisi dan diameter 11 mm.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Pinaverium bromide

- Bahan tidak aktif

Bahan asas: microcrystalline cellulose, pre-gelatinised starch, lactose monohydrate, anhydrous colloidal silica, talc, magnesium stearate.

Lapisan asas: basic butylated metacrylate copolymer, sodium laurylsulfate, stearic acid, talc, hydroxypropyl methylcellulose, iron oxide yellow (E172), iron oxide red (E172).

- Saiz bungkus

Dicetel 100 mg: 10, 15, 20, 25, 30, 50 atau 100 tablet setiap pek (tidak semua saiz pek boleh dipasarkan). Blister diperbuat dari PVC / aluminium.

- Nombor MAL

MAL20122215ACZ

Pengilang

Mylan Laboratories SAS
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
France

Pemegang Pendaftaran Produk

Abbott Laboratories (M) Sdn. Bhd.
27-02, Level 27, Imazium,
8, Jalan SS21/37, Damansara Uptown,
47400 Petaling Jaya,
Selangor Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

21/04/2022

Nombor Siri

NPRA (R1/2) 20042022/096