

CIPROX TABLET

Ciprofloxacin (250mg & 500mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan CIPROX
2. Bagaimana CIPROX berfungsi
3. Sebelum menggunakan CIPROX
4. Cara menggunakan CIPROX
5. Semasa menggunakan CIPROX
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan CIPROX
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh Kemaskini RiMUP
12. Nombor Siri

Apakah kegunaan CIPROX

CIPROX digunakan untuk merawat jangkitan kuman seperti berikut:

- Jangkitan rumit disebabkan oleh patogen ciprofloxacin sensitif.
- Jangkitan saluran pernafasan.
- Dalam rawatan pesakit luar dengan radang paru-paru yang disebabkan oleh Pneumokokus, ciprofloxacin tidak harus digunakan sebagai dadah pilihan pertama. Ciprofloxacin boleh dianggap sebagai rawatan untuk pneumonias disebabkan oleh Klebsiella, Enterobacter, Proteus, E. coli, Pseudomonas, Haemophilus, Branhamella, Legionella dan Staphylococcus.
- Jangkitan telinga tengah (otitis media), sinus paranasal (resdung), terutamanya jika ini adalah disebabkan oleh organisma gram-negatif termasuk Pseudomonas atau oleh Staphylococcus.
- Jangkitan mata.
- Jangkitan buah pinggang dan / atau saluran kencing efferent.
- Jangkitan organ-organ kemaluan, termasuk adnexitis, gonorea, Prostat.
- Jangkitan rongga abdomen (misalnya, jangkitan saluran gastrousus atau saluran biliary, peritonitis).
- Jangkitan kulit dan tisu lembut.
- Jangkitan tulang dan sendi.
- Sepsis.
- Jangkitan atau risiko jangkitan berlaku (profilaksis) dalam pesakit yang sistem imun telah lemah (contohnya, pesakit immunosuppressants atau mempunyai neutropenia).

Bagaimana CIPROX berfungsi

CIPROX adalah sejenis antibiotik yang tergolong dalam keluarga fluoroquinolone. Bahan aktif adalah ciprofloxacin. Ciprofloxacin berfungsi dengan membunuh bakteria yang

menyebabkan jangkitan. Ia hanya berkesan terhadap bakteria jenis yang khas.

Sebelum menggunakan CIPROX

- Bila tidak boleh menggunakan
Jangan mengambil CIPROX jika anda:

- alah (hipersensitif) terhadap bahan aktifnya, alah terhadap ubat quinolone atau terhadap kandungan lain dalam CIPROX
- mengambil tizanidine
- mengandung atau menyusui bayi

- Sebelum mula menggunakan CIPROX

- Beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda jika anda telah didiagnosis dengan pembesaran atau "bonjol" dari saluran darah besar (aneurisme aorta atau aneurisme saluran besar periferi).
- Beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda jika anda telah mengalami diseksi aorta sebelumnya (robekan dalam dinding aorta)
- Beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda jika anda mempunyai sejarah keluarga yang menghidap aneurisme aorta atau diseksi aorta atau faktor risiko lain atau keadaan yang berkecenderungan (contohnya gangguan tisu penghubung seperti sindrom Marfan, atau sindrom Ehlers-Danlos vaskular, atau gangguan vaskular seperti arteritis Takayasu, arteritis sel gergasi, penyakit Behcet, tekanan darah tinggi, atau aterosklerosis yang diketahui).
- Anda tidak boleh mengambil ubat antibakteria fluoroquinolone, termasuk CIPROX, jika anda mengalami sebarang kesan sampingan yang serius pada masa lalu ketika mengambil fluoroquinolone (lihat bahagian Perkara yang perlu diberi perhatian dan kesan sampingan). Dalam situasi ini, anda perlu memberitahu penyedia penjagaan kesihatan anda secepat mungkin.

Maklumkan pada doktor jika anda:

- pernah mengalami masalah ginjal kerana rawatan anda harus diselaraskan
- mengalami sawan atau keadaan neurologi yang lain

- sebelum ini mempunyai sejarah masalah tendon semasa rawatan dengan antibiotik seperti CIPROX
- mempunyai myasthenia gravis (sejenis keadaan kelemahan otot)
- mempunyai sejarah ritma denyupan jantung yang tidak normal (arrythmias)

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau farmasi anda jika anda sedang menggunakan ubat lain atau telah menggunakan ubat yang lain baru-baru ini, termasuk ubat yang anda boleh beli tanpa preskripsi.

Jangan mengambil CIPROX bersama dengan tizanidine, kerana ia boleh menyebabkan kesan sampingan seperti tekanan darah rendah dan mengantuk (rujuk Seksyen Beri Perhatian pada CIPROX). Ubat-ubatan yang berikut telah dikenalpasti akan berinteraksi dengan CIPROX dalam badan anda. Pengambilan ubat-ubatan ini bersama CIPROX boleh mempengaruhi tahap terapeutic ubat-ubatan tersebut. Ia juga boleh meningkatkan peluang untuk mendapat kesan sampingan.

Maklumkan pada doktor jika anda sedang mengambil:

- warfarin atau ubat anti-pembekuan (untuk mencairkan darah)
- probenecid (untuk gout)
- methotrexate (untuk sesetengah jenis kanser, psoriasis, radang sendi)
- theophylline (untuk masalah pernafasan)
- tizanidine (untuk kekejangan otot dalam sklerosis multipel)
- clozapine (sejenis antipsikotik)
- ropinirole (untuk penyakit Parkinson)
- phenytoin (untuk sawan)

CIPROX boleh menyebabkan tahap dalam darah meningkat untuk ubat yang berikut:

- pentoxifylline (untuk masalah peredaran darah)
- caffeine

Sesetengah ubat mengurangkan kesan CIPROX. Maklumkan pada doktor jika anda mengambil atau ingin mengambil:

- antasid

CIPROX TABLET

Ciprofloxacin (250mg & 500mg)

- mineral tambahan
- sucralfate
- pengikat fosfat polimer (contohnya sevelamer)
- ubat-ubatan atau makanan tambahan yang mengandungi kalsium, magnesium, aluminium atau besi

Jika persediaan ini adalah penting, ambil CIPROX kira-kira dua jam sebelum atau tidak lebih awal daripada empat jam.

Cara menggunakan CIPROX

- Berapa banyak harus digunakan

Doktor anda akan menerangkan dengan tepat berapa jumlah serta berapa kerap dan untuk berapa lama anda perlu mengambil CIPROX. Ini bergantung kepada jenis jangkitan dan keadaan jangkitan anda.

Beritahu doktor anda jika anda mengalami masalah buah pinggang kerana dos anda mungkin perlu diselaraskan.

Rawatan biasanya memerlukan 5 hingga 21 hari, tetapi mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk jangkitan yang teruk. Ambil tablet tepat seperti yang diberitahu oleh doktor anda. Tanya doktor atau farmasi anda jika anda tidak pasti berapa banyak tablet dan bagaimana untuk mengambil CIPROX.

- Telan tablet dengan cecair yang banyak. Jangan mengunyah tablet kerana ia tidak rasa sedap.
- Cuba ambil tablet anda pada masa yang sama setiap hari.
- Anda boleh mengambil tablet pada waktu makan atau antara waktu makan. Mana-mana kalsium yang anda ambil sebagai sebahagian daripada makanan tidak akan menjejaskan penyerapan. Walaubagaimanapun, jangan ambil tablet CIPROX dengan produk tenusu seperti susu atau yogut atau jus buah-buahan yang diperkayakan (contohnya jus oren yang diperkayakan dengan kalsium).

Jangan lupa minum air yang banyak semasa mengambil CIPROX.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Ia adalah penting untuk menghabiskan rawatan yang diberi walaupun anda mula berasa lebih sihat selepas beberapa hari. Jika anda berhenti mengambil ubat ini terlalu awal, jangkitan anda mungkin tidak sembuh sepenuhnya dan gejala jangkitan boleh kembali atau menjadi lebih buruk. Anda juga boleh membina penentangan terhadap antibiotik.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos biasa anda secepat mungkin dan kemudian teruskan seperti yang ditetapkan. Walaubagaimanapun, jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, tinggalkan dos yang anda lupa dan teruskan dengan dos yang seterusnya. Jangan gandakan dos anda untuk gantikan dos yang terlepas. Pastikan anda habiskan rawatan yang diberi.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil lebih daripada dos yang ditetapkan, dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Jika boleh, bawa bersama tablet atau kotak untuk ditunjukkan kepada doktor anda.

Semasa menggunakan CIPROX

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan pada doktor dengan segera, jika yang berikut berlaku semasa mengambil CIPROX. Doktor anda akan membuat keputusan sama ada rawatan dengan CIPROX harus diberhentikan.

- Reaksi alahan secara tiba-tiba yang teruk, (tindak balas anaphylactic/kejutan, angioedema). Walaupun dengan dos yang pertama, ada kemungkinan kecil yang anda mungkin mengalami reaksi alahan yang teruk dengan gejala berikut: sesak di dada, rasa pening, sakit atau pengan, atau mengalami pening apabila berdiri. Jika ini berlaku, berhenti mengambil CIPROX dan hubungi doktor anda dengan segera.

- Sakit dan bengkak pada sendi dan tendinitis mungkin berlaku sekali-sekala, terutamanya jika anda adalah warga tua dan juga dirawat dengan kortikosteroid. Pada tanda pertama sebarang kesakitan atau bengkak berhenti mengambil CIPROX dan rehatkan bahagian yang menyakitkan. Elakkan daripada melakukan senaman yang tidak perlu, kerana ini mungkin akan meningkatkan risiko putus tendon.
- Jika anda mengalami sawan atau lain-lain keadaan neurologi seperti iskemia serebrum atau strok, anda mungkin mengalami kesan sampingan yang dikaitkan dengan sistem saraf pusat. Jika ini berlaku, berhenti mengambil CIPROX dan hubungi doktor anda dengan segera.
- Anda mungkin mengalami reaksi psikiatri pada kali pertama anda mengambil CIPROX. Jika anda mengidap penyakit kemurungan atau psikosis, gejala anda mungkin menjadi lebih buruk di bawah rawatan CIPROX. Dalam kes yang sangat jarang berlaku kemurungan atau masalah kesihatan mental telah membawa kepada pemikiran untuk membunuh diri dan tingkah laku yang mencederakan diri sendiri seperti percubaan membunuh diri. Jika anda mengalami reaksi sedemikian, berhenti mengambil/menggunakan CIPROX dan hubungi doktor anda dengan segera.
- Anda mungkin mengalami gejala neuropati seperti kesakitan, rasa terbakar, berdenyut-denyut, kebas dan atau kelemahan. Jika ini berlaku, berhenti mengambil CIPROX dan hubungi doktor anda dengan segera.
- Anda mungkin mendapat cirit birit apabila mengambil antibiotik, termasuk CIPROX, atau bahkan beberapa minggu selepas anda berhenti mengambil mereka. Jika ia menjadi teruk atau berterusan atau anda perasan bahawa najis anda mengandungi darah atau bendalir, berhenti mengambil CIPROX dengan segera, oleh kerana ia boleh mengancam nyawa. Jangan mengambil ubat yang menghentikan atau melambatkan pergerakan usus dan hubungi doktor anda.

CIPROX TABLET

Ciprofloxacin (250mg & 500mg)

- Beritahu doktor atau kakitangan makmal yang anda mengambil CIPROX jika anda perlu memberikan sampel darah atau air kencing.
 - CIPROX mungkin menyebabkan kerosakan hati. Jika anda mendapati sebarang tanda-tanda seperti kehilangan selera makan, jaundis (kekuningan kulit), warna gelap air kencing, gatal, atau kelembutan perut, berhenti mengambil CIPROX dan hubungi doktor anda segera.
 - CIPROX boleh menyebabkan pengurangan bilangan sel darah putih dan daya pertahanan terhadap jangkitan boleh menurun. Jika anda mengalami jangkitan dengan gejala-gejala seperti demam dan kemerosotan keadaan am yang serius, atau demam dengan gejala jangkitan seperti sakit tekak/faring/mulut atau masalah kencing anda harus berjumpa dengan doktor dengan segera. Ujian darah akan dijalankan untuk memeriksa kemungkinan pengurangan bilangan sel darah putih (agranulocytosis). Ia adalah penting untuk memaklumkan kepada doktor anda tentang ubat anda.
 - Beritahu doktor anda jika anda atau ahli keluarga anda mempunyai defisiensi glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD), kerana anda mungkin mengalami risiko anemia dengan ciprofloxacin.
 - Kulit anda menjadi lebih sensitif kepada cahaya matahari atau cahaya ultraungu (UV) apabila mengambil CIPROX. Elakkan daripada pendedahan kepada cahaya matahari yang kuat, atau cahaya UV tiruan seperti katil cahaya.
- Perkara yang tidak boleh dilakukan
Melainkan jika anda mengambil CIPROX semasa makan, jangan makan atau minum apa apa produk tenusu (seperti susu atau yogut) atau minuman dengan kalsium tambahan apabila anda mengambil tablet, kerana ia boleh menjejaskan penyerapan bahan aktif.
- Ia adalah lebih baik untuk mengelakkan penggunaan CIPROX semasa mengandung.

Maklumkan pada doktor jika anda merancang untuk hamil.

- Jangan mengambil CIPROX semasa menyusui bayi kerana ciprofloxacin akan keluar dalam susu ibu dan boleh membahayakan anak anda.
- Perkara yang perlu diberi perhatian
CIPROX boleh membuat anda berasa kurang berjaga-jaga. Beberapa kesan sampingan neurologi mungkin berlaku. Oleh itu, pastikan anda tahu kesan CIPROX sebelum memandu atau mengendalikan mesin. Jika ragu-ragu, berbincang dengan doktor anda.

Jika anda tiba-tiba merasa sakit yang teruk di bahagian perut, dada atau belakang, pergi ke jabatan kecemasan dengan segera.

Kesan sampingan serius yang berpanjangan, melumpuhkan dan berpotensi tidak dapat dipulihkan

Ubat antibakteria Fluoroquinolone, termasuk CIPROX, telah dikaitkan dengan kesan sampingan yang sangat jarang berlaku tetapi serius, sesetengahnya berpanjangan (bulan atau tahun berterusan), melumpuhkan atau berpotensi tidak dapat dipulihkan.

Berhenti mengambil antibiotik fluoroquinolone anda dan hubungi penyedia penjagaan kesihatan dengan segera jika anda mempunyai tanda-tanda kesan sampingan berikut:

- Tendon sakit atau bengkak, selalu bermula di pergelangan kaki atau betis. Jika ini berlaku, rehatkan bahagian yang menyakitkan sehingga anda dapat berjumpa dengan penyedia penjagaan kesihatan anda.
- Sakit di sendi atau bengkak di bahu, lengan, atau kaki anda.
- Kesakitan yang tidak normal atau sensasi (seperti pin-dan-jarum, kesemutan, gatal, kebas, atau kepedihan yang berterusan), kelemahan dalam badan anda, terutamanya di kaki atau lengan, atau kesukaran berjalan.
- Keletihan yang teruk, perasaan tertekan, kebimbangan, masalah dengan ingatan anda, atau masalah tidur yang teruk.
- Perubahan penglihatan, rasa, bau, atau pendengaran anda.

Beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda jika anda pernah

mengalami salah satu daripada kesan di atas semasa atau sejurus selepas mengambil fluoroquinolone -ini bermakna anda harus mengelakkannya pada masa depan. Anda dan penyedia penjagaan kesihatan anda akan membuat keputusan untuk meneruskan rawatan dengan mempertimbangkan antibiotik dari kelas yang lain.

Tendinitis dan putus tendon

Kesakitan dan bengkak pada sendi dan keradangan atau putus tendon mungkin jarang berlaku. Risiko anda meningkat jika anda adalah warga tua (melebihi umur 60 tahun), telah menerima pemindahan organ, mengalami masalah buah pinggang atau jika anda dirawat dengan kortikosteroid. Keradangan dan putus tendon mungkin berlaku dalam tempoh 48 jam rawatan pertama dan juga sehingga beberapa bulan selepas berhenti terapi CIPROX. Pada tanda pertama sakit atau keradangan tendon (contohnya di pergelangan kaki, pergelangan tangan, siku, bahu atau lutut anda), hentikan mengambil CIPROX, hubungi penyedia penjagaan kesihatan anda dan rehatkan kawasan yang menyakitkan. Elakkan senaman yang tidak perlu kerana ini mungkin meningkatkan risiko putus tendon.

Kerosakan Saraf (Peripheral Neuropathy)

Anda mungkin mengalami gejala kerosakan saraf (neuropati) seperti sakit, kepedihan, kesemutan, kebas dan / atau kelemahan terutama pada kaki atau tangan dan lengan. Sekiranya ini berlaku, hentikan mengambil CIPROX dan memberitahu kepada penyedia penjagaan kesihatan anda dengan segera untuk mengelakkan perkembangan keadaan yang berpotensi tidak dapat dipulihkan.

Kesan-kesan Sampingan

Seperti semua ubat, CIPROX boleh memberikan kesan sampingan, walaubagaimanapun bukan semua orang akan mengalaminya.

Jika kesan sampingan menjadi semakin serius, atau jika anda perasan kesan sampingan yang tidak tersenarai dalam risalah ini, sila beritahu pada doktor atau farmasi anda.

CIPROX TABLET

Ciprofloxacin (250mg & 500mg)

Fluoroquinolones telah dilaporkan akan menyebabkan kesan sampingan yang serius yang melibatkan tendon, otot, sendi, dan saraf - dalam sebilangan kecil pesakit, kesan-kesan sampingan ini menyebabkan ketidakupayaan yang berpanjangan atau kekal (lihat bahagian Sebelum mula mengambil dan Perkara yang perlu diberi perhatian).

Kesan sampingan yang biasa

- loya, cirit birit
- sakit sendi di kalangan kanak-kanak

Kesan sampingan yang tidak biasa berlaku

- jangkitan kulat yang luar biasa
- kepekatan yang tinggi eosinofil, sejenis sel darah putih
- hilang selera makan (anoreksia)
- hiperaktif atau pergolakan
- sakit kepala, pening, masalah tidur atau gangguan pada citarasa
- muntah, sakit perut, masalah penghadaman seperti ketidakselesaan perut (senak/pedih ulu hati), atau angin
- peningkatan jumlah bahan-bahan tertentu di dalam darah (transaminases dan/atau bilirubin)
- ruam, gatal-gatal atau tompok merah
- sakit sendi di kalangan orang dewasa
- fungsi buah pinggang yang lemah
- sakit otot dan tulang, rasa tidak sihat (asthenia), atau demam
- peningkatan fosfatase alkali dalam darah (sejenis bahan tertentu dalam darah)

Kesan sampingan yang jarang berlaku

- radang usus (kolitis) yang dikaitkan dengan penggunaan antibiotik (boleh membawa maut yang sangat jarang berlaku)
- perubahan dalam jumlah bilangan darah (leukopenia, leukocytosis, neutropenia, anaemia), pertambahan atau pengurangan jumlah faktor pembekuan darah (thrombocytes)
- reaksi alahan, bengkak (edema), atau bengkak pesat pada kulit dan mukus membrane (angioedema).
- peningkatan gula dalam darah (hyperglisemia)
- kekeliruan, tidak tertentu, tindak balas bimbang, mimpi pelik, kemurungan (berpotensi membawa kepada pemikiran untuk membunuh diri, percubaan membunuh diri, atau telah membunuh diri), atau halusinasi

- pin dan jarum, kepekaan luar biasa terhadap rangsangan deria, penurunan kepekaan pada kulit, bergegar, sawan (lihat Seksyen: jagaan khas dengan CIPROX), atau pening
- masalah penglihatan
- tinnitus, kehilangan pendengaran, pendengaran yang terjejas
- dengupan jantung yang pantas (tachycardia)
- pengembangan saluran darah (vasodilatasi), tekanan darah rendah, atau pening
- sesak nafas, termasuk gejala asma
- masalah hati, jaundis (kolestatik icterus), atau radang hati
- sensitif pada cahaya
- sakit otot, radang sendi, peningkatan nada otot atau kekejangan
- kegagalan buah pinggang, darah atau kristal dalam air kencing, radang saluran kencing
- retensi cecair atau peluh berlebihan
- tahap abnormal faktor pembekuan (protrombin) atau peningkatan paras enzim amilase

Kesan sampingan yang sangat jarang berlaku

- jenis khas pengurangan bilangan sel darah merah (anemia hemolitik); penurunan yang berbahaya sejenis sel darah putih (agranulocytosis); sejenis penurunan dalam sel darah merah, sel darah putih dan platelet (pancytopenia), yang boleh membawa maut; dan kemerosotan sum sum tulang, yang juga boleh membawa maut
- reaksi alahan yang teruk (tindak balas anaphylactic atau kejutan anaphylactic, yang boleh membawa maut – penyakit serum)
- gangguan mental (reaksi psikotik) berpotensi membawa kepada pemikiran untuk membunuh diri, percubaan membunuh diri, atau telah membunuh diri
- migrain, gangguan koordinasi, berjalan kaki yang tidak mantap (gangguan kiproh), gangguan deria bau (gangguan deria bau), tekanan pada otak (tekanan intrakranium)
- gangguan visual warna
- radang pada dinding saluran darah (vaskulitis)
- pankreatitis
- kematian sel sel hati (nekrosis hati) yang jarang membawa kepada kegagalan hati yang membawa maut

- kecil, pin-mata pendarahan di bawah kulit (petechiae); pelbagai jenis letusan kulit atau ruam (contohnya, yang boleh membawa maut sindrom Stevens-Johnson atau toksik epidermis necrolysis)
- kelemahan otot, radang tendon, putus tendon – terutama pada tendon besar pada belakang buku lali (Achilles tendon)
- gejala myasthenia gravis yang semakin teruk.

Kekারণ yang tidak diketahui

- masalah yang berkaitan dengan sistem saraf seperti sakit, sesemut, kebas dan atau kelemahan di hujung kaki
- ritma jantung abnormal yang teruk, denyutan jantung yang tidak teratur (Torsades de Pointes)

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan CIPROX

- Penyimpanan

- Jauhkan dari kanak-kanak.
- Jangan simpan pada tempat yang melebihi suhu 30°C. Simpan dalam pek asal. Lindungi daripada cahaya matahari dan kelembapan. Jangan guna selepas tarikh luput seperti yang ternyata pada bungkusan.

- Pelupusan

- Ubat anda tidak harus dilupuskan melalu sisa air atau sisa isian rumah. Tanya pada farmasi anda cara untuk melupuskan ubatan yang tidak diperlukan lagi. Langkah ini membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Putih bujur, 17.3 x 8.3 mm, tablet bersalut filem, bergaris pecah pada kedua dua belah.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:
Ciprofloxacin

CIPROX TABLET

Ciprofloxacin (250mg & 500mg)

- Bahan tidak aktif:

Hydroxypropyl cellulose, sodium starch glycolate dan magnesium stearate.

Bahan salutan filem:
hydroxypropylmethyl cellulose,
polyethelene glycol 400 dan
titanium dioxide.

- Nombor MAL:

CIPROX Tablet 250mg:
MAL08082713ACZ

CIPROX Tablet 500mg:
MAL08082706ACZ

Pengilang

Delorbis Pharmaceuticals Ltd.,
17 Athinon Street,
Ergates Industrial Area,
2643 Ergates, Lefkosia,
Cyprus.

Pemegang Pendaftaran Produk

Apex Pharmacy Marketing Sdn Bhd
No. 2, Jalan SS13/5,
47500 Subang Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

05/09/2024

Nombor Siri

NPRA(R2/1)240904/1342