

AVELAC ORAL SOLUTION

Lactulose (667 mg/ml)

Apakah yang ada pada risalah ini:

1. Apakah kegunaan AVELAC
2. Bagaimana AVELAC berfungsi
3. Sebelum menggunakan AVELAC
4. Cara menggunakan AVELAC
5. Semasa menggunakan AVELAC
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan AVELAC
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan AVELAC

AVELAC membantu melembutkan najis dan melegakan sembelit.

Hepatic encephalopathy (HE): Digunakan untuk rawatan dan pencegahan hepatic coma atau precoma.

Bagaimana AVELAC berfungsi

AVELAC mengandungi laxative, sejenis julap yang menyebabkan penghasilan najis yang lembut dan merangsang pembuangan najis.

Sebelum menggunakan AVELAC

Bila anda tidak boleh menggunakan

Dilarang menggunakan AVELAC jika:

- Anda mempunyai masalah galactosemia (kadar galaktosa yang tinggi dalam darah).
- Anda mengamalkan diet galaktosa.
- Anda mempunyai intoleransi laktosa.
- Anda merupakan pesakit kencing manis.
- Anda mempunyai gangguan usus.

Sebelum anda mula menggunakan

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan AVELAC jika:

- Anda hamil atau sedang menyusukan anak.
- Anda mengambil ubat-ubatan lain termasuk herba dan makanan tambahan.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau kebelakangan ini mengambil ubat lain, termasuk sebarang ubat tanpa preskripsi.

Cara menggunakan AVELAC

Berapa banyak harus digunakan

Sembelit

Kesan ubat mungkin akan dirasai selepas 48 jam. Dos diubahsuai berdasarkan respon pesakit.

Umur	Dos Permulaan	Dos Seterusnya
Dewasa	15ml – 45ml	15ml – 30ml
Kanak-kanak (7 - 14 tahun)	15ml	10ml – 15ml
Kanak-kanak (1 - 6 tahun)	5ml – 10ml	5ml – 10ml
Bayi (< 1tahun)	5ml	5ml

Koma (Hepatic encephalopathy)

Untuk dewasa sahaja.

30ml - 45ml, 3 hingga 4 kali sehari. Dos seterusnya diubahsuai untuk menghasilkan 2 atau 3 kali pembuangan najis lembut dalam sehari.

Bila perlu digunakan

Boleh diambil sebelum atau selepas makan.

Sila ikut preskripsi doktor atau ahli farmasi.

Berapa lama perlu digunakan

Doktor akan mengubah dos mengikut keperluan anda. Sila ikut arahan doktor atau ahli farmasi.

Jika anda terlupa menggunakannya

Jika anda terlepas dos, dilarang mengambil dos berganda. Dos yang berganda akan menyebabkan dos yang berlebihan.

Jika anda mengambil secara berlebihan (terlebih dos)

Dos yang berlebihan akan menyebabkan cirit-birit sekaligus menyebabkan badan kehilangan air, elektrolit terutamanya Kalium. Kadar Natrium yang tinggi juga pernah dilaporkan. Sila rujuk doktor atau ahli farmasi anda.

Semasa menggunakan AVELAC

Perkara yang perlu dilakukan

- Amalkan pengambilan AVELAC pada waktu yang sama setiap hari.
- Goncang sebelum minum.
- Digalakkan untuk minum air yang banyak bagi menggantikan air yang hilang dari dalam badan.
- Jikalau terdapat rasa yang tidak enak, anda boleh mencairkan AVELAC ke dalam air.
- Sila minum AVELAC dengan perlahan.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Dilarang menggandakan dos.
- Dilarang mengambil ubatan baharu sebelum berjumpa dengan doktor.
- Dilarang memberikan AVELAC kepada kanak-kanak sebelum berunding dengan doktor atau ahli farmasi, walaupun mereka mempunyai simptom-simptom yang sama seperti anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda merasa lemah, cepat penat atau selalu pergi ke tandas untuk membuang najis, itu mungkin merupakan petanda kekurangan air dalam badan.

Kesan-kesan sampingan

- Ketidakselesaan perut
- Kembung perut
- Kekejangan
- Mual
- Muntah

Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan atau masalah alahan. Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas juga boleh berlaku pada sesetengah orang. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau lawan web portal.bpfk.gov.my (Consumers → Reporting).

Cara penyimpanan dan pelupusan AVELAC

Penyimpanan

Simpan di tempat sejuk, bawah 30°C.

Jauhi dari kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

AVELAC merupakan sirap yang jelas, tiada warna atau coklat-kuning cair dan likat. Produk ini boleh didapati dalam bungkus 100ml dan 200ml.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

Lactulose.

Bahan tidak aktif

AVELAC tidak mempunyai bahan lain.

Nombor MAL

MAL

**Pengilang dan Pemegang Pendaftaran
Produk**

Pengilang

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd
1-5 Cheng Industrial Estate,
72550 Melaka, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran produk

Apex Pharmacy Marketing Sdn Bhd
No.2, Jalan SS13/5, 47500 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

10 Nov 2017

Nombor Siri

BPFK