

STENAC GRANULES

Acetylcysteine (100mg, 200mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Stenac Granules
2. Bagaimana Stenac Granules berfungsi
3. Sebelum menggunakan Stenac Granules
4. Cara menggunakan Stenac Granules
5. Semasa menggunakan Stenac Granules
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Stenac Granules
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Stenac Granules

Stenac Granules digunakan untuk:

- mengurangkan kelikatan rembesan dari saluran pernafasan
- sebagai terapi tambahan dalam penyakit paru-paru kronik.

Bagaimana Stenac Granules berfungsi

Acetylcysteine tergolong dalam kumpulan ubat yang disebut mukolitik yang berfungsi dengan mengurangkan kelikatan mukus supaya ia dapat berbatuk keluar dengan lebih mudah.

Sebelum menggunakan Stenac Granules

- Bila tidak boleh menggunakan

- Anda alah (hipersensitif) terhadap acetylcysteine atau mana-mana ramuan lain dari ubat ini.
- Anak anda berumur di bawah 2 tahun.

- Sebelum mula menggunakan Stenac Granules

Maklumkan kepada doktor anda sebelum anda menggunakan Stenac jika:

- Anda mengalami penyakit asma. Anda mungkin perlu dipantau dengan rapi.
- Mempunyai risiko pendarahan gastrousus (seperti di ulser perut/ usus, saluran darah esofagus yang bengkak) kerana pengambilan acetylcysteine secara oral boleh menyebabkan muntah.
- Tidak toleransi terhadap histamin.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Arang harus dielakkan dalam rawatan acetaminophen kerana ia boleh menyebabkan pengurangan penyerapan acetylcysteine yang diberikan secara oral.

Cara menggunakan Stenac Granules

- Berapa banyak harus digunakan

- Larutkan kandungan satu uncang ke dalam segelas air sejuk atau suam.
- Dewasa & remaja berusia lebih 12 tahun: 600 mg sehari, dibahagikan kepada satu atau beberapa kali sehari (cth: 200 mg 3 kali sehari)
- Kanak-kanak 2 hingga 12 tahun: 100mg 3 kali sehari atau 200mg 2 kali sehari.
- Rawatan jangka panjang: 400–600mg sehari, dibahagikan kepada satu atau beberapa kali sehari
- Mucoviscidosis (gangguan genetik): Dos yang sama seperti di atas. Namun untuk kanak-kanak berusia 6 tahun ke atas, 200 mg 3 kali sehari atau 600 mg sekali sehari.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jika terambil dos Acetylcysteine berlebihan boleh menyebabkan kesan sampingan yang berlebihan. Hubungi doktor anda atau dapatkan nasihat perubatan dengan segera. Sekiranya boleh, bawa bungkusan kotak dan risalah untuk ditunjukkan kepada doktor.

Semasa menggunakan Stenac Granules

- Perkara yang perlu dilakukan

Anda mungkin mendapati peningkatan dalam jumlah kahak setelah mengambil acetylcysteine. Sila keluarkan kahak dengan batuknya agar saluran udara tetap bersih. Sekiranya anda sukar bernafas setelah mengambil ubat ini (terutamanya jika anda mengalami asma), hentikan pengambilan dan dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

STENAC GRANULES

Acetylcysteine (100mg, 200mg)

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Sebaiknya jangan mencampurkan ubat lain yang anda gunakan dengan larutan Stenac. Jangan simpan larutan Stenac untuk kegunaan kemudian. Setelah larut dalam air, minum dengan segera.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Stenac mengandungi agen pewarna makanan yang disebut Sunset Yellow. Sekiranya anda alah kepada ramuan ini atau bahan lain dari produk ini, sila dapatkan nasihat perubatan sebelum menggunakannya.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Stenac boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

- Keradangan mulut dan bibir
- Loya dan muntah
- Demam
- Mata dan hidung berair
- Mengantuk
- Sesak dada
- Penyempitan saluran udara, menyebabkan kesukaran bernafas.

Jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan atau kesan yang tidak disenaraikan ini, hentikan penggunaan produk ini, dan dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

Stenac Granules mungkin akan menyebabkan alahan dan reaksi kulit yang teruk. Hentikan penggunaan Stenac Granules dan dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda mengalami mana-mana gejala seperti berikut:

- Alahan teruk: kesukaran bernafas, pening kepala, kulit bengkak atau ruam.

- Reaksi kulit yang teruk: kemerahan kulit, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Stenac Granules

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya. Simpan dalam bungkus asal untuk melindungi dari kelembapan. Jauhkan ubat dari jangkauan kanak-kanak.

- Pelupusan

Jangan buang apa-apa ubat-ubatan melalui air sisa atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi bagaimana untuk membuang ubat-ubatan yang anda tidak gunakan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Granul jingga dengan rasa oren. Letakkan 1 uncang dalam 100ml air panas dan kacau sehingga granul larut sepenuhnya. Warna larutan adalah jingga terang dan jernih.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Acetylcysteine

- Bahan tidak aktif
Dextrose Anhydrous,
Saccharin Sodium, FD & C
Yellow No.6 (Sunset Yellow
FCF), Orange Powder.

- Nombor MAL:

- Stenac Granules 100mg:
MAL22076011XCZ
- Stenac Granules 200mg:
MAL22076012XCZ

Pengilang

U-Liang Pharmaceutical Co.,
Ltd.
No.10, Kuang-Fu Rd., Hu-Kou
Hsiang, Hsin Chu Hsien,
Taiwan, R.O.C.

Pemegang Pendaftaran

Produk

Apex Pharmacy Marketing Sdn
Bhd
No. 2, Jalan SS 13/5, 47500
Subang Jaya, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

26/8/2025

Nombor Siri

NPRA (R2) 22/030