Avetaprost 0.005% w/v Eye Drop

Latanoprost 0.005% w/v

Apa yang ada pada risalah ini:

1. Apakah kegunaan Avetaprost
2. Bagaimana Avetaprost berfungsi
3. Sebelum mengambil Avetaprost
4. Cara menggunakan Avetaprost
5. Semasa menggunakan Avetaprost
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Avetaprost
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Avetaprost

Avetaprost digunakan untuk merawat keadaan yang dikenali sebagai glaukoma sudut terbuka, glaukoma kronik sudut tutup dan hipertensi okular.

Avetaprost juga digunakan untuk merawat peningkatan tekanan mata dan glaukoma dalam kanak-kanak.

Bagaimana Avetaprost berfungsi

Avetaprost tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai analog prostaglandin. Ia berfungsi dengan meningkatkan pengaliran cecair semula jadi dari mata ke dalam aliran darah.

Sebelum mengambil Avetaprost

- Bila tidak boleh mengambil

Avetaprost boleh digunakan dalam lelaki dan wanita dewasa (termasuk warga tua). Keberkesanan dan keselamatan data dalam kumpulan umur <1 tahun adalah sangat terhad. Tiada data yang tersedia untuk bayi pramatang (kurang daripada 36 minggu usia kandungan).

Jangan gunakan Avetaprost jika anda adalah

- alahan (hipersensitif) pada *latanoprost* atau mana-mana bahan-bahan lain Avetaprost
- Mengandung atau cuba untuk hamil
- Menyusui bayi

- Sebelum mula mengambil

Berbincang dengan doktor atau dengan doktor yang merawat anak anda atau ahli farmasi anda sebelum anda mengambil Avetaprost atau sebelum anda memberi kepada anak anda jika anda berfikir mana-mana yang berikut terpakai kepada anda atau anak anda:

- Jika anda atau anak anda akan menjalani pembedahan mata (termasuk pembedahan katarak)
- Jika anda atau anak anda memakai kanta lekap.
- Jika anda telah mengalami atau sedang mengidap jangkitan virus mata yang disebabkan oleh herpes simplex virus (HSV)

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Avetaprost boleh berinteraksi dengan ubat lain. Sila beritahu doktor, doktor yang merawat anak anda atau ahli farmasi jika anda atau anak anda mengambil atau telah mengambil sebarang ubat-ubatan lain termasuk ubat-ubatan (atau titisan mata) yang diperolehi tanpa preskripsi.

Cara mengunakan Avetaprost

- Berapa banyak harus digunakan

Dos penitisan Avetaprost 0.005% tidak boleh melebihi sekali sehari kerana ia telah menunjukkan bahawa penitisan yang lebih kerap mengurangkan kesan menurunkan tekanan intraokular.

Jika lebih daripada satu ubat oftalmik topikal akan digunakan, anda harus menunggu 5 minit antara titisan ubat-ubatan oftalmik topikal.

Avetaprost boleh digunakan pada pesakit pediatrik dengan dos yang sama dengan orang dewasa.

- Bila perlu digunakan

Dos yang dicadangkan untuk orang dewasa (termasuk warga tua):

Terapi yang disyorkan ialah satu titis dalam mata terjejas sekali sehari. Kesan optimum diperolehi jika Avetaprost Mata 0.005% dititis pada sebelah petang.

Avetaprost mengandungi benzalkonium klorida yang berfungsi sebagai pengawet. Pengawet ini boleh menyebabkan kerengsaan mata atau gangguan kepada permukaan mata. Benzalkonium klorida boleh diserap oleh kanta lekap dan juga akan menghitamkan kanta sentuh lembut. Oleh itu, elakkan sentuhan dengan kanta sentuh lembut. Jika anda atau anak anda memakai kanta sentuh, kanta sentuh perlu dikeluarkan sebelum menggunakan Avetaprost. Selepas menggunakan Avetaprost, anda perlu menunggu 15 minit sebelum meletakkan kanta lekap kembali.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaa ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Gunakan dos seperti biasa. Jangan mengambil dos berganda bagi dos yang anda telah terlupa. Jika anda tidak pasti, sila bercakap dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda meletakkan titik yang terlalu banyak ke dalam mata, ia boleh menyebabkan kerengsaan di mata dan mata anda akan berair dan menjadi merah. Ini tidak bermasalah, tetapi jika

Avetaprost 0.005% w/v Eye Drop

Latanoprost 0.005% w/v

anda bimbang, sila hubungi doktor anda untuk mendapatkan nasihat. Sila hubungi doktor anda secepat mungkin jika anda atau anak anda telah menelan Avetaprost.

Semasa menggunakan Avetaprost

- *Perkara yang perlu dilakukan*

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Avetaprost.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Jangan berkongsi Avetaprost dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- *Perkara yang perlu diberi perhatian*

Memandu dan menggunakan jentera

Apabila anda menggunakan Avetaprost, anda mungkin mempunyai penglihatan kabur, untuk masa yang singkat. Jika ini berlaku kepada anda, jangan memandu atau menggunakan mana-mana alat atau mesin sehingga penglihatan anda menjadi jelas lagi.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Avetaprost boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mendapat kesan sampingan itu.

Kesan yang sangat umum (berkemungkinan akan menjejaskan lebih daripada 1 dalam 10 orang):

- Perubahan beransur-ansur dalam warna mata anda dengan meningkatkan jumlah pigmen coklat di bahagian yang berwarna mata yang dikenali sebagai iris. Jika anda mempunyai campuran warna mata (biru-coklat, kelabu-coklat, kuning-coklat atau hijau perang), anda lebih cenderung untuk melihat perubahan ini daripada jika anda mempunyai mata dengan satu warna (biru, kelabu, hijau atau warna mata perang). Sebarang perubahan dalam warna mata anda mungkin mengambil masa bertahun-tahun walaupun ia biasanya dapat dilihat dalam masa 8 bulan rawatan. Perubahan warna mungkin kekal dan mungkin lebih ketara jika anda menggunakan Avetaprost hanya dalam satu mata. Tiada masalah dengan perubahan dalam warna mata. Perubahan warna mata tidak akan berterusan selepas berhenti rawatan Avetaprost.
- Kemerahan mata.
- Kerengsaan mata (perasaan pembakaran, gatal, menyengat atau sensasi bendaasing dalam mata).
- perubahan secara beransur-ansur untuk bulu mata yang dirawat dan bulu halus di sekeliling mata yang dirawat, kebanyakannya di kalangan mereka yang berasal dari Jepun. Perubahan ini melibatkan peningkatan warna (gelap), kepanjangan dan ketebalan bulu mata anda.

Kesan biasa (mungkin menjejaskan kurang daripada 1 dalam 10 orang)

- Kerengsaan atau gangguan kepada permukaan mata, keradangan kelopak mata dan sakit mata.

Kesan luar biasa (mungkin menjejaskan kurang daripada 1 dari setiap 100 orang):

- kelopak mata bengkak, kekeringan mata, keradangan atau kerengsaan permukaan mata (keratitis), penglihatan menjadi kabur dan konjunktivitis.
- ruam kulit.

Kesan jarang berlaku (mungkin menjejaskan kurang daripada 1 dari setiap 1000 orang):

- Keradangan iris, mewarnai bahagian mata; pembengkakan retina (makular edema), tanda-tanda bengkak atau menggaru / kerosakan kepada permukaan mata, bengkak di sekeliling mata (periorbital edema) salah arah bulu mata atau barisan tambahan bulu mata.
- reaksi kulit pada kelopak mata, kulit kelopak mata gelap.
- Asma, semakin teruk asma dan sesak nafas (nafas yg sulit).

Kesan yang amat jarang (mungkin menjejaskan kurang daripada 1 dalam 10,000 orang):

- Keterukan angina dalam pesakit yang juga mempunyai penyakit jantung. Sakit dada.

Pesakit juga telah dilaporkan kesan sampingan: takungan cecair dalam bahagian mata berwarna (iris sista), sakit kepala, pening, berdebar-debar, sakit otot dan sakit sendi.

Kesan sampingan yang dilihat lebih kerap di kalangan kanak-kanak berbanding orang dewasa adalah seperti berikut: hidung gatal, berair dan demam.

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda mendapati apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila hubungi doktor atau ahli

Avetaprost 0.005% w/v Eye Drop

Latanoprost 0.005% w/v

farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Avetaprost

- *Penyimpanan*

Simpan di dalam peti sejuk (2°C - 8°C). Lindungi daripada cahaya.

Selepas membuka botol: tidak simpan melebihi 25°C dan perlu guna dalam tempoh empat minggu.

- *Pelupusan*

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui sisa air atau sisa isian rumah. Tanya pada farmasi anda cara untuk melupuskan ubatan yang tidak diperlukan lagi.

Maklumat lanjut

- *Rupa dan warna produk*

Ubat mata yang lut sinar dan tidak berwarna di dalam bekas plastik lut sinar.

- *Bahan-bahan kandungan*
  - *Bahan aktif: Latanoprost.*
  - *Bahan tidak aktif: Dibasic sodium phosphate Anhydrous, Monobasic sodium phosphate (Monohydrate), Sodium chloride, Benzalkonium chloride and Sterile purified water.*

- *Nombor MAL*

MAL15025038ACZ

Pengilang

Hanmi Pharmaceuticals Co., Ltd.
214, Muha-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, South Korea.

Pemegang Pendaftaran Produk

Apex pharmacy marketing Sdn Bhd
No.2, Jalan SS13/5, 47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

16 April 2021

Nombor Siri

NPRA(R2/1)210414/663