

Avorius 5mg Tablet

Desloratadine 5mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Avorius
2. Bagaimana Avorius berfungsi
3. Sebelum menggunakan Avorius
4. Cara menggunakan Avorius
5. Semasa menggunakan Avorius
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Avorius
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Avorius

Avorius tablet digunakan untuk melegakan simptom rinitis alergi (radang laluan udara dalam hidung yang disebabkan oleh alergi [alahan], misalnya, demam alergi atau alergi terhadap tunggau habuk). Antara simptom ini ialah bersin, hidung berhingus atau terasa gatal, lelangit mulut terasa gatal, dan mata yang gatal, merah-merah atau berair.

Avorius tablet juga digunakan untuk melegakan simptom urtikaria (masalah kulit yang disebabkan oleh alergi). Antara simptomnya ialah gatal-gatal dan gegata.

Bagaimana Avorius berfungsi

Avorius ialah sejenis ubat antialergi yang tidak membuatkan anda mengantuk. Ubat ini dapat mengawal tindak balas alergi dan simptomnya.

Sebelum menggunakan Avorius

Bila tidak boleh mengambil
Jangan mengambil Avorius jika anda alah (hipersensitif) terhadap *desloratadine*, terhadap mana-mana bahan lain di dalam Avorius tablet atau terhadap *loratadine*.

Sebelum mula mengambil
Penggunaan Avorius tablet dari segi efikasi dan keselamatan di kalangan kanak-kanak yang berumur tidak lebih daripada 12 tahun belum dibuktikan.

Bercakap dengan doktor, ahli farmasi atau jururawat anda sebelum mengambil *desloratadine* jika anda atau keluarga anda mempunyai sawan.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Avorius

Berapa banyak harus digunakan

Orang dewasa dan remaja (12 tahun ke atas): makan satu tablet sekali sehari.

Bila perlu digunakan

Telan tablet bulat-bulat dengan air, sebelum ataupun selepas makan.

Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil ubat anda seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Jangan berhenti mengambilnya melainkan jika doktor anda

memberitahu anda - walaupun anda berasa lebih baik.

Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dose)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Avorius

Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Avorius.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

Avorius 5mg Tablet

Desloratadine 5mg

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Avorius dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Beri perhatian apabila memandu kereta atau mengendalikan jentera kerana sesetengah orang berasa mengantuk dan ia boleh menjejaskan keupayaan mereka untuk memandu atau mengendalikan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Avorius boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan yang paling kerap yang dilaporkan adalah keletihan, kering mulut dan sakit kepala. Jadual di bawah adalah lain-lain kesan yang tidak diingini dilaporkan dalam tempoh pasca-pemasaran:

Kelas Organ Sistem	Reaksi buruk dilihat dengan desloratadine
Gangguan metabolik dan permakanan	
Tidak diketahui	Meningkat selera makan
Gangguan mental	
Sangat jarang	halusinasi
Tidak diketahui	Tingkah laku yang tidak biasa, pencerobohan
Gangguan system saraf	
Biasa	Sakit kepala
Sangat jarang	Pening, keletihan, kesukaran tidur, kegelisahan dengan pergerakan badan meningkat, sawan
Gangguan jantung	
Sangat jarang	Kadar denyutan jantung cepat, denyutan jantung tidak teratur
Tidak diketahui	Irama jantung tidak teratur
Gangguan gastrousus	
Biasa	Mulut kering
Sangat jarang	Sakit perut, mual, muntah-muntah, gangguan pencernaan, cirit-birit
Gangguan hati	
Sangat jarang	Keradangan hati dan ujian fungsi hati yang tidak normal
Tidak diketahui	Penyakit kuning
Masalah tisu kulit dan subkutaneus	
Tidak	Alahan

deketahui	matahari
Gangguan otot dan tisu perantara	
Sangat jarang	Sakit otot
Gangguan umum	
Biasa	Keletihan
Sangat jarang	Reaksi alergi yang teruk (kesukaran bernafas, bengkak, gatal dan ruam)
Tidak diketahui	Kurang tenaga
Siasatan	
Tidak diketahui	Berat meningkat

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Adverse Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Avorius

Penyimpanan

Tablet ini perlu disimpan di bawah 30°C, lindungi dari kelembapan.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet berwarna biru muda, berbentuk bulat, sewaktu dua dan filem bersalut

Avorius 5mg Tablet

Desloratadine 5mg

dengan kedua-dua belah permukaan kosong.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

Desloratadine

Bahan tidak aktif

*Maize starch,
Microcrystalline Cellulose,
Pregelatinized Starch,
Disodium Hydrogen
Phosphate Dihydrate,
Purified Water, Sodium
sulphite, Talc, Opadry Blue
03B50533, Isopropyl
alcohol and
Dichloromethane.*

Nombor MAL: MAL18116128ACZ

Pengilang

Ind-Swift Laboratories Limited
Off NH 21, Village
Jawaharpur, Tehsil Derabassi,
District S.A.S. Nagar
(Mohali), Punjab - 140 507,
India.

**Pemegang Pendaftaran
Produk**

Apex Pharmacy Marketing
Sdn Bhd
No. 2, Jalan SS 13/5, 47500
Subang Jaya, Selangor,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

20 January 2026

Nombor Siri

NPRA(R2/1)260204/00014