

AVERA GEL

Choline Salicylate/ Cetalkonium Chloride (8.71% w/w/ 0.01% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Avera
2. Bagaimana Avera berfungsi
3. Sebelum menggunakan Avera
4. Cara menggunakan Avera
5. Semasa menggunakan Avera
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Avera
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Avera

Avera digunakan untuk ulser mulut, kudis herpes, dan semasa penumbuhan gigi. Ia membantu melegakan kesakitan, keradangan, dan merawat jangkitan kuman yang ringan.

Bagaimana Avera berfungsi

Avera mengandungi bahan 'non-steroidal anti-inflammatory (NSAID) dan anti-jangkitan. Choline Salicylate ialah NSAID yang membantu mengurangkan kesakitan dan keradangan. Cetalkonium Chloride adalah bahan anti-jangkitan yang melawan pertumbuhan mikroorganisma.

Sebelum menggunakan Avera

Bila anda tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Avera jika:

- Anda alah kepada Choline Salicylate, Cetalkonium Chloride, Ethanol atau Glycerin.
- Anda mengambil ubat-ubatan untuk pembekuan darah atau gout.
- Anda mempunyai pendarahan di perut atau usus.
- Anda mengalami masalah pembekuan darah.
- Anda mempunyai ulser perut.

Sebelum anda mula menggunakan

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika:

- Anda hamil atau sedang menyusukan anak.
- Anda mempunyai masalah pembekuan darah.

Jika mengambil ubat-ubat lain

- Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau kebelakangan ini mengambil ubat lain, termasuk sebarang ubat tanpa preskripsi.
- Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil ubat-ubatan untuk merawat pembekuan darah atau gout.

Cara menggunakan Avera

Berapa banyak harus digunakan

- **Bayi (4 bulan ke atas) dan Kanak-kanak**
Urut kira-kira setengah sentimeter gel Avera di kawasan yang sakit. Boleh ulangi selepas 3 jam. Tidak melebihi 6 dos dalam 24 jam. Tidak diguna pada bayi umur kurang daripada 4 bulan.

• **Dewasa**

Urut kira-kira satu sentimeter gel Avera di kawasan yang sakit. Boleh ulangi selepas 3 jam.

Luka akibat penggunaan gigi palsu

Urut kira-kira satu sentimeter gel Avera pada luka dan biarkan sekurang-kurangnya 30 minit sebelum masukkan semula gigi palsu. Jangan guna terus pada gigi palsu.

Bila perlu digunakan

Bila diperlukan sahaja.

Berapa lama perlu digunakan

- Sila ikut arahan daripada doktor atau ahli farmasi anda.
- Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

Jika anda terlupa menggunakannya

Sapu terus dengan dos baru dan ikut arahan yang dinyatakan di atas.

Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Sapuan ubat yang kerap terutamanya pada kanak-kanak akan menyebabkan keracunan salicylate. Oleh itu, guna bila diperlukan sahaja. Simptom keracunan salicylate termasuk mual, muntah, *tinnitus* (gangguan pada telinga) dan berpeluh.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Avera

Perkara yang perlu dilakukan

- Avera adalah untuk kegunaan luaran oral sahaja.
- Sentiasa basuh tangan anda sebelum menggunakan gel.
- Pastikan tangan anda bersih.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan sapu gel Avera terus ke gigi palsu.
- Jangan melebihi dos yang dibenarkan.

Perkara yang perlu diberi perhatian

- Sila berunding dengan doktor anda atau ahli farmasi, terutamanya kepada mereka yang terdapat alahan dengan gel Avera.

Kesan-kesan sampingan

- Serangan asma boleh berlaku pada individu yang sensitif terhadap salicylates.
- Oleh kerana produk ini mengandungi glycerin, sesetengah individu mungkin mengalami sakit kepala, sakit perut dan cirit-birit.

Jika anda mengalami tanda-tanda berterusan melebihi 7 hari, sila berjumpa dengan doktor, doktor gigi atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (Consumers → Reporting).

Cara penyimpanan dan pelupusan Avera

Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C.

Jauhi dari kanak-kanak.

Tarikh luput produk ini ditunjukkan pada bungkusan.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Setiap tiub mengandungi 10g gel lutsinar tanpa warna.

Bahan- bahan kandungan

Bahan aktif

Choline Salicylate, Cetalkonium Chloride.

Bahan tidak aktif

Ethanol, Glycerol, Menthol, Hypromellose, Saccharin Sodium, Aniseed Oil dan Purified Water.

Nombor MAL

MAL

Pengilang

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd
1-5 Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka,
Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Apex Pharmacy Marketing Sdn Bhd
No.2, Jalan SS13/5, 47500 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

4 Julai 2016

Nombor Siri

BPFK