

Actrapid®

100 IU/ml

Cecair suntikan dalam pen, FlexPen®

Insulin human (rDNA)

Risalah Maklumat Ubat Untuk Pengguna (RiMUP)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Actrapid®
2. Bagaimana Actrapid® berfungsi
3. Sebelum mengambil Actrapid®
4. Cara menggunakan Actrapid®
5. Semasa menggunakan Actrapid®
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Actrapid®
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP

1. Apakah kegunaan Actrapid®

Actrapid® adalah *insulin human* yang digunakan untuk merawat **kencing manis**. Kencing manis (*diabetes mellitus*) adalah suatu penyakit di mana badan anda tidak menghasilkan insulin yang cukup untuk mengawal paras gula darah anda.

2. Bagaimana Actrapid® berfungsi

Actrapid® adalah insulin bertindak pantas. Ini bermakna ia akan mula merendahkan gula darah anda kira-kira ½ jam selepas anda mengambilnya, dan kesan tersebut akan kekal selama kira-kira 8 jam. Actrapid® selalunya diberikan dalam kombinasi dengan produk-produk insulin bertindak lebih lama.

3. Sebelum mengambil Actrapid®

- Bila tidak boleh mengambil

- Dalam pam infusi insulin.
- Jika anda alah (*hipersensitif*) kepada insulin manusia atau mana-mana bahan lain di dalam Actrapid® (lihat bahagian 8. *Maklumat lanjut*).

► Jika anda mengesyaki *hypoglycaemia* (paras gula darah rendah) bermula (lihat bahagian 4. *Cara menggunakan Actrapid®*).

► Jika FlexPen® terjatuh, rosak, atau remuk.

► Jika ia tidak disimpan dengan betul atau jika ia telah beku (lihat bahagian 7. *Cara penyimpanan dan pelupusan Actrapid®*).

► Jika insulin tidak kelihatan jelas dan kelihatan berwarna.

- Sebelum mula mengambil

► Periksa label untuk memastikan jenis insulin ini adalah betul.

► Selalu gunakan jarum baru bagi setiap suntikan untuk mengelakkan jangkitan.

► Jarum dan Actrapid® FlexPen® tidak boleh dikongsi.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sesetengah ubat-ubatan menjejaskan cara glukosa bertindak di dalam badan anda dan ini mungkin mempengaruhi dos insulin anda. Disenaraikan di bawah adalah ubat-ubatan paling biasa yang mungkin menjejaskan rawatan insulin anda. Maklumkan doktor, jururawat atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil atau baru-baru ini telah mengambil ubat-ubatan lain, termasuklah ubat-ubatan yang diperoleh tanpa preskripsi. Terutamanya, anda harus maklumkan doktor anda jika anda menggunakan ubat-ubatan lain yang telah disenaraikan yang mungkin menjejaskan paras gula darah anda.

Keperluan insulin anda mungkin berubah jika anda turut mengambil: ubat-ubatan lain untuk rawatan kencing manis; perencat monoamine oksidase (MAOI), penghalang-beta, perencat enzim penukar angiotensin (*ACE inhibitors*); asid asetilsalisilik; steroid anabolik; *sulphonamides*, pil perancang oral, *thiazides*;

glucocorticoids; terapi hormon tiroid; *sympathomimetics*; hormon pertumbuhan; *danazol*; *octreotide* atau *lanreotide*.

Thiazolidinediones (kelas ubat antidiabetik oral yang digunakan untuk merawat kencing manis jenis 2). Sesetengah pesakit yang menghidapi kencing manis jenis 2 yang berjangka panjang dan penyakit jantung atau pernah menghidapi strok yang dirawat dengan *thiazolidinediones* berkombinasi dengan insulin mungkin akan mengalami kegagalan jantung. Maklumkan doktor anda secepat mungkin jika anda mengalami tanda-tanda kegagalan jantung seperti sesak nafas yang luar biasa atau peningkatan berat badan yang pantas atau bengkak setempat (*oedema*).

4. Cara menggunakan Actrapid®

- Berapa banyak harus digunakan

Bincangkan tentang keperluan insulin anda dengan doktor dan jururawat anda. Pastikan anda mengambil Actrapid® FlexPen® seperti yang diarahkan oleh doktor atau jururawat anda dan patuhi nasihat mereka dengan teliti. Jika doktor anda telah menukarkan anda daripada satu jenis atau jenama insulin kepada jenis atau jenama insulin berlainan, dos anda mungkin harus diubahsuai oleh doktor anda.

- Bila perlu digunakan

Suntikan hendaklah diikuti dalam masa 30 minit dengan makanan atau makanan ringan yang mengandungi karbohidrat.

- Bagaimana menggunakan Actrapid®

Actrapid® diberikan secara suntikan di bawah kulit (*subcutaneously*). Anda tidak harus

menyuntik diri anda secara terus ke dalam salur darah (*intravenously*) atau otot (*intramuscularly*). Actrapid® FlexPen® hanya sesuai diberikan secara suntikan di bawah kulit. Bincang dengan doktor anda jika anda perlu menyuntik insulin anda melalui kaedah lain. Selalu ubah tempat suntikan di kawasan yang sama untuk mengurangkan risiko mengalami benjolan atau lekukan kulit (lihat bahagian 6. *Kesan-kesan sampingan*). Tempat terbaik untuk memberi diri anda suntikan adalah: bahagian depan pinggang anda (perut); punggung anda; bahagian depan paha anda atau lengan atas. Insulin akan berfungsi lebih pantas jika disuntik ke dalam pinggang anda (perut).

Suntikan insulin: Lihat helai arahan untuk maklumat terperinci.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil Actrapid® untuk selama doktor anda mencadangkan.

Hiperglisemia dan ketoasidosis kencing manis mungkin berlaku berikutan dos insulin yang diambil tidak mencukupi atau penghentian rawatan, terutamanya dalam golongan pesakit kencing manis jenis 1.

- Jika terlupa menggunakan

Paras gula darah anda mungkin menjadi terlalu tinggi (ini dipanggil *hyperglycaemia*).

Tanda-tanda amaran muncul perlahan-lahan. Ini termasuklah: buang air kecil lebih kerap; dahaga; hilang selera; rasa tidak sihat (loya atau muntah-muntah); rasa mengantuk atau letih; kulit kering dan kemerahan; mulut kering dan nafas berbau buah-buahan (*acetone*).

Jika anda mengalami mana-mana tanda ini, uji paras gula darah anda

dan periksa air kencing anda untuk *ketone* jika boleh. Kemudian dapatkan nasihat perubatan dengan segera.

Ini mungkin tanda-tanda kepada keadaan yang sangat serius dipanggil ketoasidosis kencing manis. Jika anda tidak merawatnya, ia boleh menyebabkan kehilangan kesedaran disebabkan oleh kencing manis (*diabetic coma*) dan akhirnya kematian.

Sebab-sebab *hyperglycaemia*

- ▶ Terlupa mengambil insulin anda.
- ▶ Berulang kali mengambil insulin kurang daripada apa yang anda perlukan.
- ▶ Jangkitan atau demam.
- ▶ Makan lebih banyak daripada biasa.
- ▶ Bersukan kurang daripada biasa.

- Jika anda berhenti mengambilnya

Ini boleh mengakibatkan hiperglisemia dan ketoasidosis yang teruk. Jangan berhenti mengambil insulin tanpa bercakap dengan doktor, yang akan memberitahu anda apa yang perlu dilakukan.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lanjut tentang penggunaan produk ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika mengambil berlebihan (*terlebih dos*)

Paras gula darah anda mungkin menjadi terlalu rendah (ini dipanggil *hypoglycaemia*).

Tanda-tanda amaran *hypo* boleh terjadi secara tiba-tiba dan ini termasuklah: peluh sejuk; kulit pucat dan dingin; sakit kepala; denyutan jantung pantas; berasa tidak sihat; berasa sangat lapar; perubahan penglihatan sementara; berasa mengantuk; letih dan lemah yang luar biasa; gemuruh atau menggigil; berasa

cemas; berasa keliru; sukar menumpukan perhatian.

Jika anda mengalami mana-mana tanda ini, makan ubat biji glukosa atau snek bergula tinggi (gula-gula, biskut, jus buah), kemudian rehat.

Sebab-sebab *hypoglycaemia*

Anda akan mengalami *hypo* jika gula darah anda terlalu rendah. Kejadian ini mungkin akan berlaku:

- ▶ Jika anda terambil terlalu banyak insulin.
- ▶ Jika anda makan terlalu sedikit atau terlepas makan.
- ▶ Jika anda bersukan lebih daripada biasa.

Menggunakan glukagon

Anda boleh sedar lebih cepat dengan suntikan hormon glukagon oleh seseorang yang tahu menggunakannya. Jika anda diberi glukagon, anda akan memerlukan glukosa atau snek yang bergula sebaik sahaja anda sedar. Jika anda tidak bertindak balas terhadap rawatan glukagon, anda harus dirawat di hospital. Dapatkan nasihat perubatan selepas suntikan glukagon: anda perlu mencari sebab *hypo* anda untuk mengelakkan ia terjadi lagi.

5. Semasa menggunakan Actrapid®

- Perkara yang perlu dilakukan

Makan hidangan atau snek yang mengandungi karbohidrat dalam masa 30 minit selepas suntikan.

Anda digalakkan untuk mengukur paras gula darah dengan kerap.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil sebarang insulin jika anda rasa *hypo* sedang berlaku. Bawakan ubat biji glukosa, gula-gula,

biskut atau jus buah dengan anda, jika diperlukan.

Maklumkan saudara, kawan, dan rakan kerja rapat jika anda pengsan (tidak sedarkan diri), mereka mesti memusingkan anda ke sisi anda dan dapatkan bantuan perubatan segera. Mereka **tidak harus** memberikan anda sebarang makanan atau minuman kerana ia boleh menyebabkan anda tercekik.

- **Jika hypoglycaemia yang teruk** tidak dirawat, ia akan mengakibatkan kerosakan otak (sementara atau selama-lamanya) dan juga kematian.
- **Jika anda mengalami hypo** yang menyebabkan anda pengsan, ataupun banyak hypo, maklukkannya kepada doktor anda. Jumlah atau masa pengambilan insulin, makanan atau senaman mungkin perlu diubahsuai.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- **Jika anda menghadapi masalah** dengan buah pinggang atau hati anda, atau dengan kelenjar *adrenal*, pituitari atau tiroid anda.
- **Jika anda minum alkohol**, perhatikan tanda-tanda *hypo* dan jangan minum alkohol semasa perut sedang kosong.
- **Jika anda bersukan** lebih daripada biasa atau anda ingin mengubah diet biasa anda, kerana ini mungkin akan menjejaskan paras gula darah anda.
- **Jika anda sakit** teruskan ambil insulin anda dan jumpa dengan doktor anda.
- **Jika anda akan ke luar negara**, perjalanan ke zon-zon masa yang berlainan mungkin akan menjejaskan keperluan insulin anda dan masa suntikan anda diberikan. Berjumpa dengan doktor anda jika anda berancang untuk mengambil perjalanan yang sedemikian.

Kehamilan dan menyusui

Tidak ada sekatan terhadap rawatan dengan Actrapid® semasa kehamilan atau menyusui, sila hubungi doktor anda untuk mendapatkan nasihat.

Memandu dan menggunakan mesin

Jika anda memandu atau menggunakan mesin, perhatikan tanda-tanda *hypo*. Keupayaan anda untuk menumpukan perhatian atau bertindak balas akan kurang semasa *hypo*. Jangan sekali-kali memandu atau menggunakan mesin jika anda rasa *hypo* datang. Bincang dengan doktor anda sama ada anda boleh memandu atau menggunakan mesin sama sekali, jika anda mempunyai banyak *hypo* atau jika anda merasa sukar untuk mengenali *hypo*.

Perubahan kulit di tempat suntikan

Tukarkan tempat suntikan setiap hari tetapi masih kawasan suntikan yang sama untuk membantu mencegah perubahan pada tisu lemak di bawah kulit, seperti penebalan kulit, kulit mengecut atau gumpalan di bawah kulit. Insulin mungkin tidak berfungsi dengan baik jika anda menyuntik ke kawasan yang benjol, mengecut atau menebal (lihat bahagian 4. *Cara menggunakan Actrapid®*). Beritahu doktor anda jika anda terlihat ada perubahan kulit di tempat suntikan. Beritahu doktor anda jika anda sedang menyuntik ke kawasan kulit yang terjejas sebelum anda mula menyuntik di kawasan lain. Doktor anda mungkin memberitahu anda untuk memeriksa paras gula darah anda dengan lebih kerap, dan melaraskan dos insulin atau ubat antidiabetik anda yang lain.

6. Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Actrapid® boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Kesan-kesan sampingan mungkin berlaku dengan kekerapan tertentu, yang dijelaskan seperti berikut:

- Sangat biasa: menjejaskan lebih dari 1 dalam 10 pengguna
- Tidak biasa: menjejaskan kurang dari 1 dalam 100 pengguna
- Sangat jarang: menjejaskan kurang dari 1 dalam 10,000 pengguna

Kesan-kesan sampingan yang sangat biasa berlaku

Paras gula darah rendah (hypoglycaemia). Sila lihat nasihat di bahagian 4. *Cara menggunakan Actrapid®* bawah *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*.

Kesan-kesan sampingan yang tidak biasa berlaku

Masalah-masalah penglihatan.

Apabila anda memulakan rawatan insulin anda, ia mungkin mengganggu penglihatan anda, tetapi gangguan ini selalunya sementara.

Perubahan kulit di tempat suntikan.

Sekiranya anda menyuntik insulin di tempat yang sama, tisu lemak boleh mengecut (*lipodatrophy*) atau menebal (*lipohypertrophy*) (boleh menjejaskan kurang daripada 1 dalam 100 pengguna). Gumpalan bawah kulit juga mungkin disebabkan oleh pengumpulan protein amiloid (amiloidosis kulit; kekerapan kejadian ini tidak diketahui). Insulin mungkin tidak berfungsi dengan baik jika anda menyuntik ke kawasan yang kulit yang benjol, mengecut atau menebal. Tukarkan tempat suntikan dengan setiap suntikan untuk membantu mencegah perubahan kulit ini.

Tanda-tanda alahan. Tindak balas (kemerah-merahan, bengkak, gatal-gatal) pada tempat suntikan mungkin berlaku (tindak balas alahan setempat). Ini biasanya hilang selepas beberapa minggu anda mengambil

Actrapid®

100 IU/ml

Cecair suntikan dalam pen, FlexPen®

Insulin human (rDNA)

Risalah Maklumat Ubat Untuk Pengguna (RiMUP)

insulin. Jika ia tidak hilang, jumpa doktor anda.

Dapatkan nasihat perubatan dengan segera:

- ▶ Jika tanda-tanda alahan merebak ke bahagian-bahagian badan lain, atau
- ▶ Jika dengan tiba-tiba anda rasa tidak sihat dan mula berpeluh; mula sakit (muntah-muntah); mengalami kesukaran bernafas, mengalami denyutan jantung pantas; berasa pening.

Kesakitan neuropathy (sakit disebabkan kerosakan saraf). Jika paras gula darah anda bertambah baik dengan cepat, anda mungkin mengalami kesakitan berkaitan saraf, yang dipanggil sebagai kesakitan akut saraf dan selalunya secara sementara.

Sendi-sendi bengkak. Apabila anda mula mengambil insulin, pengumpulan air boleh menyebabkan bengkak di sekeliling buku lali dan sendi-sendi lain. Kebiasaannya ini akan hilang dengan segera.

Kesan-kesan sampingan yang sangat jarang berlaku

Diabetic retinopathy (masalah penglihatan berkaitan kencing manis yang boleh menyebabkan kehilangan penglihatan). Jika anda mengalami *diabetic retinopathy* dan paras gula darah anda bertambah baik sangat cepat, *retinopathy* mungkin menjadi lebih teruk. Tanya doktor anda tentang ini.

Tindak balas alahan teruk kepada Actrapid® atau salah satu kandungannya (dipanggil tindak balas alahan sistemik). Sila lihat amaran di bahagian 3. *Sebelum mengambil Actrapid®.*

Jika sebarang kesan-kesan sampingan ini bertambah teruk, atau anda menyedari kesan-kesan sampingan

yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila maklumkan kepada doktor, jururawat atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

7. Cara penyimpanan dan pelupusan Actrapid®

- Penyimpanan

Jauhkan daripada capaian dan penglihatan kanak-kanak.

Jangan gunakan Actrapid® selepas tarikh luput yang dinyatakan pada label dan karton selepas 'Expiry'. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

Sebelum membuka: Simpan dalam peti sejuk pada 2°C - 8°C, jauh daripada elemen penyejuk. Jangan membekukan ubat ini.

Jika terdapat 6 bulan atau lebih sehingga tarikh luput, produk boleh disimpan di luar peti sejuk (di bawah 30°C) sehingga 4 minggu sebelum is digunakan atau dibawa sebagai ubat simpanan. Produk tidak boleh dikembalikan ke peti sejuk selepas ia disimpan di luar peti sejuk. Sila catatkan permulaan penyimpanan di luar peti sejuk pada kotak produk.

Semasa mengguna atau dibawa sebagai ubat simpanan: Jangan simpan dalam peti sejuk atau membekukan ubat ini. Anda boleh membawanya bersama anda dan simpan pada suhu bilik (di bawah 30°C) hingga selama 6 minggu.

Sentiasa memastikan penutup pen ditutup pada FlexPen® anda apabila

anda tidak menggunakannya untuk melindungi daripada cahaya.

Actrapid® mesti dilindungi daripada haba dan cahaya berlebihan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dibuang melalui air kumbahan atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi bagaimana untuk membuang ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Cara-cara ini akan membantu melindungi persekitaran.

8. Maklumat lanjut

- Rupa and warna produk

Larutan bagi suntikan ini adalah larutan jelas, tidak berwarna dan cecair.

Ia dibekalkan dalam pek 1, 5 atau 10 pen dengan isi kandungan 3 ml (bukan semua saiz pek akan dipasarkan).

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Insulin human, dibuat daripada bioteknologi rekombinan. 1 ml mengandungi 100 IU insulin manusia. 1 pen mengandungi 3 ml bersamaan dengan 300 IU.

- Bahan tidak aktif

Zink klorida, gliserol, *metacresol*, natrium hidroksida, asid hidroklorik, dan air bagi suntikan.

- Nombor MAL

MAL13115136ASZ

MAL19986462AZ

MAL21066007ASZ

Actrapid®

100 IU/ml

Cecair suntikan dalam pen, FlexPen®

Insulin human (rDNA)

Risalah Maklumat Ubat Untuk Pengguna (RiMUP)

9. Pengilang

- MAL13115136ASZ

Novo Nordisk A/S
Novo Allé, DK-2880,
Bagsværd, Denmark.

- MAL19986462AZ

Novo Nordisk Produção Farmacêutica
do Brasil Ltda.
Avenida C, 1413, Distrito Industrial
Montes Claros - Minas Gerais Brazil
39404-004

- MAL21066007ASZ

Novo Nordisk Production SAS
45 Avenue d'Orléans, F-28000
Chartres, France

10. Pemegang Pendaftaran Produk

Novo Nordisk Pharma (Malaysia)
Sdn. Bhd.
Menara 1 Sentrum, Level 16
No. 201 Jalan Tun Sambanthan
50470 Kuala Lumpur
Malaysia

11. Tarikh kemaskini RiMUP

23 Disember 2024

Nombor Siri

NPRA (R3/01)15122023/0280

Actrapid®

100 IU/ml

Cecair suntikan dalam pen, FlexPen®


Insulin human (rDNA)

Risalah Maklumat Ubat Untuk Pengguna (RiMUP)

Arahan tentang cara menggunakan larutan Actrapid® untuk suntikan dalam FlexPen®

Sila baca arahan berikut dengan teliti sebelum menggunakan FlexPen® anda. Sekiranya anda tidak mematuhi arahan dengan teliti, anda mungkin mendapat terlalu sedikit atau terlalu banyak insulin, yang boleh menyebabkan paras gula darah terlalu tinggi atau terlalu rendah.

FlexPen® anda adalah pen insulin dial-a-dos yang telah dipenuhi. Anda boleh memilih dos dari 1 hingga 60 unit dalam peningkatan 1 unit. FlexPen® direka untuk digunakan dengan jarum pakai buang NovoFine® atau NovoTwist® sehingga 8 mm panjang. Sebagai langkah berjaga-jaga, sentiasa membawa peranti penghantaran insulin gantian sekiranya FlexPen® anda hilang atau rosak.



Menjaga pen anda

FlexPen® anda mesti ditangani dengan berhati-hati. Sekiranya ia jatuh, rosak atau hancur, terdapat risiko kebocoran insulin. Ini boleh menyebabkan dos yang tidak tepat, yang boleh menyebabkan paras gula darah terlalu tinggi atau terlalu rendah.


Anda boleh membersihkan bahagian luar FlexPen® anda dengan mengelapkannya dengan kapas

berubat. Jangan merendamnya, membasuh atau melincirkannya kerana ia mungkin merosakkan pen. Jangan mengisi semula FlexPen® anda. Setelah kosong, ia mesti dilupuskan.

Menyediakan Actrapid® FlexPen® anda

Semak nama dan label berwarna pen anda untuk memastikan ia mengandungi jenis insulin yang betul. Ini amat penting jika anda mengambil lebih daripada satu jenis insulin. Jika anda mengambil jenis insulin yang salah, paras gula darah anda mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah.

A Tarik penutup pen (lihat A).




B Buangkan tab kertas daripada jarum pakai buang yang baru.

Skrukan jarum pada FlexPen® anda dengan lurus dan ketat.




C Tanggalkan penutup luar jarum dan simpankan untuk kemudian.



D Tanggalkan penutup dalam jarum dan buangkannya.

Jangan sekali-kali cuba meletakkan penutup dalam jarum pada jarum. Anda boleh terkena cucukan jarum.



⚠ Sentiasa guna jarum baru untuk setiap suntikan. Ini mengurangkan risiko pencemaran, jangkitan, kebocoran insulin, jarum yang disekat dan dos yang tidak tepat.

⚠ Berhati-hati supaya tidak membengkokkan atau merosakkan jarum sebelum digunakan.

Menyemakkan saluran insulin

E Sebelum setiap suntikan, sedikit udara mungkin akan berkumpul di dalam kartrij semasa penggunaan biasa. Untuk mengelakkan menyuntik udara dan memastikan dos yang betul:

Putarkan pemilih dos untuk memilih 2 unit.

Actrapid®

100 IU/ml

Cecair suntikan dalam pen, FlexPen®


Insulin human (rDNA)

Risalah Maklumat Ubat Untuk Pengguna (RiMUP)



F

Pegang FlexPen® anda dengan jarum menuju ke atas dan ketuk kartrij dengan lembut menggunakan jari anda beberapa kali supaya sebarang buih udara yang ada akan berkumpul di bahagian atas kartrij.



G

Sambil mengarahkan jarum ke atas, tekan butang tolak sampai habis. Pemilih dos kembali ke 0.

Satu titik insulin harus muncul pada hujung jarum. Jika tidak, tukarkan jarum dan ulangkan prosedur tidak lebih daripada 6 kali.

Jika setitik insulin masih tidak muncul, pen itu rosak, dan anda mesti gunakan yang baru.



Sentiasa pastikan bahawa titisan muncul pada hujung jarum sebelum anda menyuntik. Ini memastikan aliran insulin. Sekiranya tiada titisan muncul, anda tidak akan menyuntik sebarang insulin, walaupun pemilih dos mungkin bergerak. Ini mungkin menunjukkan jarum yang disekat atau rosak.



Sentiasa periksa aliran sebelum anda menyuntik. Jika anda tidak memeriksa aliran, anda mungkin mendapat sedikit insulin atau tidak ada insulin sama sekali. Ini boleh mengakibatkan paras gula darah yang terlalu tinggi.

Memilih dos anda

H

Semak bahawa pemilih dos ditetapkan pada 0.

Putarkan pemilih dos untuk memilih bilangan unit yang anda perlu suntik.

Dos boleh dibetulkan sama ada naik atau turun dengan memutar pemilih dos dalam mana-mana arah sehingga sukatan betul berbaris dengan penunjuk. Apabila memutar pemilih dos, berhati-hati supaya tidak menekan butang tolak kerana insulin akan terkeluar.

Anda tidak boleh memilih dos yang

lebih besar daripada bilangan unit yang tertinggal dalam kartrij.



Sentiasa gunakan pemilih dos dan penunjuk untuk melihat berapa unit yang telah anda pilih sebelum menyuntik insulin.



Jangan mengira klik pen. Jika anda memilih dan menyuntikkan dos yang salah, paras gula darah anda mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jangan gunakan skala sisa, ia hanya menunjukkan kira-kira berapa banyak insulin yang ditinggal dalam pen anda.

Membuat suntikan

I

Masukkan jarum ke dalam kulit anda. Gunakan teknik suntikan yang ditunjuk oleh doktor atau jururawat anda.

Suntikkan dos dengan menekan butang tolak sampai habis sehingga 0 berbaris dengan penunjuk. Berhati-hati untuk menolak butang tolak hanya semasa anda membuat suntikan.

Memutar pemilih dos tidak akan mengeluarkan insulin.

Actrapid®

100 IU/ml

Cecair suntikan dalam pen, FlexPen®

Insulin human (rDNA)

Risalah Maklumat Ubat Untuk Pengguna (RiMUP)




J

Pastikan butang tolak ditekan sampai habis dan biarkan jarum kekal di bawah kulit selama sekurang-kurangnya 6 saat. Ini akan memastikan anda mendapat dos penuh.

Keluarkan jarum daripada kulit, kemudian lepaskan tekanan pada butang tolak.


Sentiasa pastikan pemilih dos kembali ke 0 selepas suntikan. Sekiranya pemilih dos berhenti sebelum ia kembali ke 0, dos penuh tidak disampaikan, yang mungkin mengakibatkan paras gula darah terlalu tinggi.



K

Masukkan jarum ke dalam penutup luar jarum tanpa menyentuhnya. Setelah jarum ditutupkan, tolak penutup luar jarum untuk rapatkannya dengan berhati-hati, kemudian tanggalkan jarum.

Buangkan jarum tersebut dengan berhati-hati dan tutupkan pen dengan penutupnya.



- ⚠ Sentiasa tanggalkan jarum selepas setiap suntikan dan simpankan FlexPen® anda tanpa jarum disambungkan. Ini mengurangkan risiko pencemaran, jangkitan, kebocoran insulin, jarum yang disekat dan dos yang tidak tepat.

Maklumat Lanjut

- ⚠ Pengasuh mestilah amat berhati-hati apabila mengendalikan jarum yang terpakai untuk mengurangkan risiko terkena cucukan jarum dan jangkitan silang.
- ⚠ Buangkan FlexPen® anda yang telah habis diguna tanpa jarum disambungkan.
- ⚠ Jangan berkongsi pen atau jarum anda dengan orang lain. Ia mungkin membawa kepada jangkitan silang.
- ⚠ Jangan berkongsi pen anda dengan orang lain. Ubat anda mungkin membahayakan kesihatan mereka.
- ⚠ Sentiasa jaga pen dan jarum anda daripada pandangan dan capaian orang lain, terutamanya kanak-kanak.