

Hamol 500 (Paracetamol Tablets BP 500mg)

Paracetamol (500mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Hamol 500
2. Bagaimana Hamol 500 berfungsi
3. Sebelum menggunakan Hamol 500
4. Cara menggunakan Hamol 500
5. Semasa menggunakan Hamol 500
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan Hamol 500
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Hamol 500

Untuk melegakan kesakitan ringan hingga sederhana dan melegakan demam.

Bagaimana Hamol 500 berfungsi

Paracetamol berfungsi dengan menghalang penghasilan *prostaglandin* (bahan kimia) di dalam badan yang menyebabkan demam dan kesakitan. Tindakan ini dapat mengurangkan kesakitan dan demam.

Sebelum menggunakan Hamol 500

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Hamol 500

- sekiranya anda mempunyai alahan terhadap paracetamol atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut).

Berhenti mengambil ubat ini dan rujuk kepada doktor anda dengan segera jika anda pernah mengalami kesukaran bernafas dengan aspirin atau ubat-ubatan anti-radang yang lain dan mengalami reaksi serupa dengan ubat ini.

- Sebelum menggunakan Hamol 500

Jangan ambil lebih daripada dos yang disyorkan kerana ianya boleh memudaratkan hati anda.

Ubat ini mengandungi paracetamol. Jangan mengambil ubat lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama.

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- mempunyai kerosakan hati atau buah pinggang.
- Mempunyai jangkitan, kekurangan zat makanan, kekurangan berat badan yang teruk, atau mengambil alkohol secara berlebihan dan berterusan. Ia boleh meningkatkan risiko asidosis metabolik. Tanda-tanda asidosis metabolik adalah termasuk: bernafas dengan mendalam, cepat dan sukar, mual, muntah, hilang selera makan. Sila rujuk kepada doktor anda dengan segera jika anda mempunyai gejala-gejala ini.
- mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusu bayi.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

- Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anak anda sedang mengambil warfarin atau ubat cair darah lain. Penggunaan paracetamol dengan ubat cair darah secara berpanjangan mungkin meningkatkan risiko pendarahan.

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Hamol 500

- Berapa banyak harus digunakan

- Dewasa (termasuk warga tua) dan kanak-kanak berusia 12 tahun ke atas: Ambil 1-2 biji.

Dos maksimum harian:

4000mg (8 biji)

- Ubat ini adalah untuk dimakan sahaja.
- Jangan gunakan untuk kanak-kanak di bawah umur 12 tahun.
- Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ambil setiap 4 - 6 jam bila perlu. Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

- Jangan mengambil ubat secara berpanjangan tanpa nasihat doktor atau ahli farmasi anda.
- Sila jumpa doktor jika gejala anda tidak bertambah baik.

- Jika terlupa menggunakan Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa kerana anda mungkin berisiko mengalami kegagalan hati. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Hamol 500

- Perkara yang perlu dilakukan

Hamol 500 (Paracetamol Tablets BP 500mg)

Paracetamol (500mg)

- Guna ubat mengikut arahan doktor atau maklumat pada kotak ubat.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Hamol 500

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandung semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan melebihi dos yang disyorkan.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan memberi Hamol 500 kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

AMARAN ALAHAN: Paracetamol boleh menyebabkan alahan kulit yang teruk. Gejala adalah seperti kemerahan kulit, lepuh dan ruam. Ini mungkin tanda-tanda keadaan serius. Jika tindak balas ini berlaku, berhenti menggunakan ubat ini dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Hamol 500 besar kemungkinan tidak akan mengganggu keupayaan anda memandu dan mengendalikan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Hentikan pengambilan ubat ini dan beritahu doktor serta-merta jika anda:

- mengalami reaksi alahan seperti ruam kulit atau rasa gatal, masalah pernafasan, bengkak

bibir, lidah, tekak atau muka

- mengalami pengelupasan kulit atau ulser dalam mulut
- mengalami lebam atau pendarahan yang tidak diketahui puncanya

Reaksi-reaksi ini jarang berlaku. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers

→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Hamol 500

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Deskripsi produk

- Rupa dan warna produk

Tablet berwarna putih hingga putih pudar, bulat, dwicembung, tidak bersalut dengan garis putus pada satu sisi dan timbul dengan 'H' di sebelah yang lain

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

Setiap pil mengandungi: Paracetamol 500mg.

Bahan-bahan tidak aktif:

- Pregelatinised Starch
- Magnesium Sterate

- Povidone K-30
- Purified water
- Colloidal anhydrous silica
- Purified talc

- Nombor MAL

MALXXXXXXX

Pengilang

RV Lifesciences Limited

Plot No. H-19, MIDC, Waluj,

Aurangabad, 431133 Maharashtra, India

Pemegang Pendaftaran Produk

V Care Pharmaceuticals PLT,

Suite 33-01, 33rd floor, Menara keck seng, 203, Jalan bukit bintang, 55100 kuala lumpur

10. Tarikh kemaskini RIMUP

29/06/2024

Nombor Siri: NPRA (R2) 24/082