

Rinsa CGC 15

Chlorhexidine Gluconate 0.015% w/v and Cetrimide 0.15% w/v Irrigation Solution

Rinsa CGC 50

Chlorhexidine Gluconate 0.05% w/v and Cetrimide 0.5% w/v Irrigation Solution

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Rinsa CGC
2. Bagaimana Rinsa CGC berfungsi
3. Sebelum menggunakan Rinsa CGC
4. Cara menggunakan Rinsa CGC
5. Semasa menggunakan Rinsa CGC
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Rinsa CGC
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

APAKAH KEGUNAAN Rinsa CGC?

Rinsa CGC adalah larutan antiseptik yang digunakan untuk pembersihan dan irigasi kulit dan luka.

BAGAIMANA Rinsa CGC BERFUNGSI

Rinsa CGC adalah ejen untuk membunuh mikroorganisma melalui sentuhan. Ia digunakan untuk menghalang jangkitan dengan cara memusnahkan mikroorganisma pada kulit. Ia bertindak dengan cara membunuh mikroorganisma yang menyebabkan jangkitan.

SEBELUM MENGAMBIL Rinsa CGC

Bila tidak boleh menggunakan Rinsa CGC

Jika anda mempunyai alahan kepada *Chlorhexidine Gluconate* atau *Cetrimide* atau bahan-bahan lain seperti yang tersenarai dalam bahagian Maklumat Lanjut.

Sebelum mula menggunakan Rinsa CGC

Rinsa CGC adalah untuk kegunaan luar sahaja. Jangan gunakan untuk suntikan.

Rinsa CGC hanya boleh digunakan pada

kulit dengan lembut. Apabila larutan tersebut digunakan secara kasar pada kulit yang sensitif atau selepas penggunaan yang berulang-ulang, ruam, keradangan, gatal-gatal, kulit kering dan mengelupas serta rasa sakit boleh berlaku. Jika anda mengalami tanda-tanda tersebut, penggunaan Rinsa CGC hendaklah dihentikan.

Kehamilan

Chlorhexidine telah digunakan oleh sebilangan besar ibu mengandung dan wanita dewasa yang subur dengan kerap namun tiada kajian yang dapat membuktikan terdapat kerosakan atau kesan berbahaya penggunaan *chlorhexidine* secara langsung atau tidak langsung pada janin.

Berdasarkan penyerapan secara topikal dan kesan sampingan yang dilaporkan ketika digunakan semasa kehamilan, *chlorhexidine* didapati tidak menimbulkan risiko kepada ibu mengandung.

Tiada langkah berjaga-jaga yang khusus atau perubahan dalam kaedah penggunaan atau penggunaan *chlorhexidine* diperlukan untuk ibu menagandung.

Penyusuan

Rinsa CGC selamat digunakan semasa menyusukan bayi.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau jururawat jika anda pernah mengambil vaksin atau suntikan ujian kulit (ujian tampalan untuk menguji alahan).

Garam *chlorhexidine* dan *cetrimide* tidak sesuai dengan sabun dan bahan anionik yang lain.

CARA MENGGUNAKAN Rinsa CGC

Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ianya mungkin berbeza daripada maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada

label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Ampul sekali guna ini hanya untuk tujuan irigasi dan tidak boleh diambil secara mulut atau diberikan secara *parenteral*.

Bilas kawasan jangkitan dengan air bersih. Basuh dengan lembut pada kawasan tersebut dengan jumlah Rinsa CGC yang minimum. Selepas membilas dengan Rinsa CGC, bilas kawasan tersebut dengan air bersih sekali lagi.

Cadangan dos:

Bilas kawasan jangkitan dengan air bersih. Basuh dengan lembut pada kawasan tersebut dengan jumlah Rinsa CGC yang minimum sekadar untuk mencuci luka dan basuh secara perlahan. Buang baki cecair selepas digunakan.

Bila dan berapa lama Rinsa CGC perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda. Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Jika terlupa menggunakan Rinsa CGC

Gunakan dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Langkau dos yang terlepas jika sudah hampir masa untuk dos yang seterusnya. Jangan gunakan ubat tambahan untuk menggantikan dos yang terlepas.

Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya berlaku keracunan mulut yang tidak sengaja atau sengaja, *chlorhexidine* yang diambil melalui mulut adalah kurang diserap. Anda disyorkan untuk mencairkan cecair yang masuk ke dalam mulut dengan segera dengan mengambil air (120 - 240mL) atau susu (tidak melebihi 15mL / kg pada kanak-kanak). Langkah-langkah sokongan juga adalah disyorkan.

Sekiranya cecair ini diberikan secara tidak sengaja melalui intravena, pemindahan darah mungkin diperlukan untuk mengatasi hemolisis.

Rinsa CGC 15

Chlorhexidine Gluconate 0.015% w/v and Cetrimide 0.15% w/v Irrigation Solution

Rinsa CGC 50

Chlorhexidine Gluconate 0.05% w/v and Cetrimide 0.5% w/v Irrigation Solution

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

SEMASA MENGGUNAKAN Rinsa CGC

Perkara yang perlu dilakukan:

1. Keluarkan ampul daripada kotak dan pastikan ianya bersih.
2. Ceraikan ampul dari blok dengan hati-hati. Jangan gunakan ubat yang terbuka atau berubah warna.
3. Pegang ampul secara menegak dan putar penutup tersebut untuk membukanya.
4. Buang ampul yang telah kosong. Buang baki cecair selepas digunakan.
5. Sebelum menggunakan Rinsa CGC, basuh kawasan jangkitan dengan air bersih. Tuang Rinsa CGC dengan jumlah yang minimum ke kawasan jangkitan dan basuh dengan lemah lembut.
6. Setelah selesai membersihkan kawasan jangkitan dengan Rinsa CGC, bilas semula dengan air bersih.

Perkara yang tidak boleh dilakukan dan perlu diberi perhatian:

1. Jangan gunakan Rinsa CGC jika ada kerosakan pada ampul.
2. Jangan gunakan berdekatan mata atau membran mukus kerana ia akan menyebabkan keradangan. Jika larutan tersebut terkena pada mata atau membran mukus, ia perlu dibasuh secepat mungkin dengan menggunakan air yang banyak.
3. Jangan guna pada luka yang terdedah atau kulit rosak.
4. Rinsa CGC tidak boleh digunakan pada bahagian otak, *meninges*, mata atau gegendang telinga yang berlubang.
5. Ianya juga tidak harus digunakan pada rongga badan atau sebagai *enema*.
6. Jangan gunakan larutan ini secara kasar pada kawasan kulit yang sensitif. Selepas penggunaan berulang kali, tindak balas pada kulit akan terjadi seperti kemerahan atau keradangan, gatal-gatal, kering dan/atau kulit mengelupas dan sakit pada kawasan jangkitan. Sekiranya, pengguna mengalami tanda-tanda seperti di atas, hentikan penggunaan Rinsa CGC.

7. Jangan suntik atau minum Rinsa CGC. Jika anda terminum atau tersuntik Rinsa CGC, sila rujuk doktor anda.

Jangan memberi Rinsa CGC kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

KESAN-KESAN SAMPINGAN

Kerengsaan kulit dan hipersensitiviti terhadap *chlorhexidine* telah dilaporkan.

Hentikan penggunaan Rinsa CGC sekiranya mengalami tanda-tanda seperti di atas.

Chlorhexidine boleh menyebabkan *anaphylaxis*.

Cetrimide mungkin memiliki efek yang berpanjangan kepada proses penyembuhan luka.

Gangguan sistem imunisasi

Kekerapan tidak diketahui: Hipersensitiviti termasuk *anaphylactic shock*.

Sekiranya kesan sampingan semakin serius, atau jika anda mendapati kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas, sila maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin.

Rinsa CGC mengandungi *chlorhexidine*. Sila maklumkan kepada pegawai kesihatan yang merawat sekiranya anda mempunyai alahan terhadap *chlorhexidine*.

Berhenti menggunakan produk ini dan dapatkan bantuan rawatan dengan segera jika anda mengalami ruam, gatal-gatal, bengkak, kesukaran untuk bernafas, pening, atau degupan jantung laju.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)* or *Vaccines (AEFI)*].

CARA PENYIMPANAN DAN PELUPUSAN Rinsa CGC

Penyimpanan

- Jangan simpan pada suhu melebihi 30°C.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.
- Jauhkan dari cahaya.

Pelupusan

- Rinsa CGC adalah ampul sekali guna. Buang semua kandungan yang tidak digunakan
- Jangan gunakan Rinsa CGC selepas tarikh luput yang dinyatakan pada ampul dan kotak.
- Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

MAKLUMAT LANJUT

Rupa dan warna produk

Rinsa CGC adalah cecair irrigasi jernih, berwarna oren dan steril yang dibekalkan dalam pek yang mengandungi 20 ampul 30 mL plastik ampul LDPE.

Bahan-bahan kandungan

- **Bahan aktif**
 1. *Chlorhexidine Gluconate*
 2. *Cetrimide*
- **Bahan tidak aktif**
 1. *Sunset Yellow FCF*
 2. Air suntikan

Nombor MAL

MALxxxxxxxxXZ

RinsA CGC 15

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Chlorhexidine Gluconate 0.015% w/v and Cetrimide 0.15% w/v Irrigation Solution

RinsA CGC 50

Chlorhexidine Gluconate 0.05% w/v and Cetrimide 0.5% w/v Irrigation Solution

PENGILANG/PEMEGANG LESEN PRODUK



AIN MEDICARE SDN. BHD.

Lot 4933, 4934 & PT2464, Jalan 6/44,
Kawasan Perindustrian Pengkalan Chepa
2, 16100 Kota Bharu, Kelantan,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

24/12/2020

Nombor Siri

NPRA (2)20/101