

# RinsCap® CIPA

Chlorhexidine Gluconate 2% w/v and Isopropyl Alcohol 70% v/v

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan RinsCap® CIPA
2. Bagaimana RinsCap® CIPA berfungsi
3. Sebelum menggunakan RinsCap® CIPA
4. Cara menggunakan RinsCap® CIPA
5. Semasa menggunakan RinsCap® CIPA
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan RinsCap® CIPA
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## APAKAH KEGUNAAN

### RinsCap® CIPA

RinsCap® CIPA adalah larutan biru jernih untuk kulit yang mengandungi kombinasi *Chlorhexidine Gluconate* 2% w/v dan *Isopropyl Alcohol* 70% v/v yang digunakan untuk tujuan antiseptik pada kulit sebelum prosedur invasif.

## BAGAIMANA RinsCap® CIPA

### BERFUNGSI

RinsCap® CIPA adalah larutan biru jernih untuk kulit yang mengandungi kombinasi *Chlorhexidine Gluconate* 2% w/v dan *Isopropyl Alcohol* 70% v/v.

*Chlorhexidine Gluconate* ialah *bisbiguanide*, antiseptik dan berfungsi sebagai pembasmi kuman dengan sifat bakteristatik atau bakterisida. *Chlorhexidine* juga menghalang beberapa jenis virus dan aktif terhadap beberapa kulat.

Isopropil alkohol adalah antiseptik yang terkenal dengan sifat bakterisida. Pada kepekatan 70% v/v, ia merupakan pengawet antibakteria yang lebih berkesan daripada etanol (95%).

## SEBELUM MENGGUNAKAN

### RinsCap® CIPA

#### Bila tidak boleh menggunakan

#### RinsCap® CIPA

Jika anda mempunyai alahan kepada *Chlorhexidine Gluconate*, *Isopropyl Alcohol* atau bahan-bahan lain seperti yang tersenarai dalam bahagian Maklumat Lanjut.

#### Sebelum mula menggunakan

#### RinsCap® CIPA

RinsCap® CIPA adalah untuk kegunaan luar sahaja. Jangan gunakan untuk suntikan. Produk ini tidak steril, oleh itu tidak boleh dikenalkan pada medan steril tanpa langkah berjaga-jaga yang sewajarnya.

#### Wanita hamil dan ibu menyusu

Tiada kesan yang dijangkakan semasa kehamilan dan penyusuan.

#### Jika mengambil ubat-ubat lain

- Maklumkan kepada doktor atau jururawat jika anda pernah mengambil vaksin atau suntikan ujian kulit (ujian tampalan untuk menguji alahan).
- Alkohol tidak boleh mempunyai kontak dengan beberapa vaksin dan suntikan ujian kulit (ujian tampalan). Jika ragu-ragu, sila rujuk literatur pengeluaran vaksin.
- Garam klorheksidin tidak sesuai dengan sabun dan bahan anionik lain.
- Aktiviti boleh dikurangkan dengan kehadiran agen *suspension* seperti alginat dan tragacanth, serbuk tidak larut seperti kaolin, dan sebatian kalsium, magnesium dan zink.
- Isopropil alkohol tidak sesuai dengan agen pengoksidaan seperti hidrogen peroksida dan asid nitrik.

## CARA MENGGUNAKAN

### RinsCap® CIPA

#### Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa gunakan RinsCap® CIPA seperti yang ditetapkan oleh doktor anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika tidak pasti.

#### Cadangan dos

Bilas kawasan sasaran dengan air bersih. Basuh kawasan tersebut dengan jumlah minimum RinsCap® CIPA dan biarkan kering. Produk harus digunakan tanpa proses pencairan.

#### Bila dan berapa lama RinsCap® CIPA perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda dan sekiranya gejala berterusan, dapatkan nasihat daripada doktor anda.

#### Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa telah terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

## SEMASA MENGGUNAKAN

### RinsCap® CIPA

#### Perkara yang perlu dilakukan:

Untuk kegunaan pada kulit. Untuk kegunaan luar sahaja.

1. Keluarkan botol daripada kotak dan pastikan ianya bersih.
2. Jangan sesekali menggunakan botol yang telah dibuka atau jika larutannya berubah warna.
3. Basahkan tangan dengan jumlah larutan RinsCap® CIPA yang mencukupi dan sapu pada bahagian yang berkenaan selama 30 saat dan teruskan sehingga tangan kering.
4. Gunakan produk ini seperti yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.

#### Perkara yang tidak boleh dilakukan:

1. Jangan gunakan RinsCap® CIPA jika ada kerosakan pada botol.
2. Jangan menggunakan dos lebih daripada yang disarankan melainkan diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.
3. Jangan ambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
4. Jangan berikan RinsCap® CIPA kepada orang lain walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.
5. Jangan berikan RinsCap® CIPA kepada sesiapa yang mungkin mempunyai sejarah reaksi alergi terhadap *Chlorhexidine*.
6. Jangan gunakan berdekatan mata atau membran mukus kerana ia akan menyebabkan keradangan. Jika larutan tersebut terkena pada mata atau membran mukus, ia perlu dibasuh secepat mungkin dengan menggunakan air yang banyak.
7. Jangan gunakan pada kulit yang terbuka, luka atau kulit yang rosak, atau pada kanak-kanak yang berumur kurang dari 2 bulan.
8. Jangan gunakan dengan prosedur *electrocautery* sehingga kering. Tanggalkan bahan, tirai dan gaun yang direndam sebelum meneruskannya.
9. Jangan biarkan produk bersentuh dengan lama dengan kulit kerana produk ini mengandungi alkohol.
10. Jangan campurkan dengan *detergen* atau bahan kimia lain.
11. Produk ini tidak steril, oleh itu tidak boleh dikenalkan pada medan steril tanpa langkah berjaga-jaga yang sewajarnya.

## KESAN-KESAN SAMPINGAN

Seperti ubat-ubatan lain, RinsCap® CIPA juga boleh menyebabkan kesan sampingan. Walaupun bukan semua pengguna mengalaminya.

Alahan dan keradangan kulit disebabkan kandungan bahan dalam RinsCap® CIPA (*Chlorhexidine Gluconate* atau *Isopropyl Alcohol*) sangat jarang dilaporkan.

Sekiranya kesan sampingan semakin serius, atau jika anda mendapati kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas, sila maklumkan kepada doktor atau jururawat anda secepat mungkin.

RinsCap® CIPA mengandungi *Chlorhexidine*. *Chlorhexidine* diketahui menyebabkan hipersensitiviti, termasuk tindak balas alahan menyeluruh dan kejutan anafilaksis. Penyebaran hipersensitiviti *Chlorhexidine* tidak diketahui, tetapi kajian sedia ada menunjukkan ia jarang sekali berlaku. RinsCap® CIPA hendaklah tidak boleh diberikan kepada sesiapa yang berkemungkinan mempunyai sejarah tindak balas alahan terhadap *Chlorhexidine*.

Jika terdapat tanda-tanda atau simptom tindak balas hipersensitiviti yang disyaki seperti kegatalan, ruam, kulit kemerahan, bengkak, kesukaran untuk bernafas, sakit kepala yang ringan dan berlaku kadar degupan jantung yang pantas, hentikan penggunaan produk ini dengan segera. Langkah balas terapeutik yang sewajarnya hendaklah dimulakan sebagaimana dinyatakan secara klinikal

## Gangguan sistem imun

Kekerapan tidak diketahui:

Hipersensitiviti termasuk kejutan anafilaksis.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npa.gov.my](http://npa.gov.my) [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

## CARA PENYIMPANAN DAN PELUPUSAN RinsCap® CIPA

### Penyimpanan

- Jauhkan daripada kanak-kanak
- Jangan simpan pada suhu melebihi 30°C.
- Jangan bekukan.
- Jauhkan dari cahaya.

## Pelupusan

- Jangan gunakan RinsCap® CIPA selepas tarikh luput yang dinyatakan pada botol dan kotak.
- Jauhkan dari sumber api. Jangan gunakan dengan sumber pencucuhan, elakkan larut ke kawasan yang berbulu.
- Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

## MAKLUMAT LANJUT

### Rupa dan warna produk

RinsCap® CIPA adalah cecair biru jernih untuk kegunaan kulit.

### Pembungkusan Tersedia:

- 60 mL x 40 dalam penutup skrew HDPE botol sekotak.
- 500 mL x 20 dalam penutup skrew PP botol sekotak.

### Bahan-bahan kandungan

- **Bahan Aktif**
  1. *Chlorhexidine Gluconate*
  2. *Isopropyl Alcohol*
- **Bahan Tidak Aktif**
  1. *Methylene Blue*
  2. *Water for Injections*

### Nombor MAL

MAL11085007XZ

## PENGILANG/PEMEGANG PENDAFTARAN PRODUK:



AIN MEDICARE SDN. BHD.

Lot 4933, 4934 & PT2464, Jalan 6/44, Kawasan Perindustrian Pengkalan Chepa 2, 16100 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.

### Tarikh Kemaskini RiMUP

01/03/2024

### Nombor Siri

NPRA(R2/1)240506/1266