

TIMOLAIN

Timolol Maleate Ophthalmic Solution USP (Timolol 0.5%)

WHAT IS IN THIS LEAFLET

1. What TIMOLAIN is used for
2. How TIMOLAIN works
3. Before you use TIMOLAIN
4. How to use TIMOLAIN
5. While you are using it
6. Side effects
7. Storage and Disposal of TIMOLAIN
8. Product Description

WHAT TIMOLAIN IS USED FOR

It is used to treat glaucoma, when the pressure in the eye is raised.

HOW TIMOLAIN WORKS

TIMOLAIN contains a substance called timolol which belongs to a group of medicines known as beta-blockers. Timolol works by lowering the pressure in your eye(s).

BEFORE YOU USE TIMOLAIN

• *When you must not use it;*

Do not use TIMOLAIN

- If you are allergic (hypersensitive) to timolol, beta-blocker or any of the other ingredients of TIMOLAIN as listed in Product Description Section.
- If you have now or have had in the past respiratory problems such as asthma, severe chronic obstructive bronchitis (severe lung disease which may cause wheeziness, difficulty in breathing and/or long-standing cough).
- If you have heart problems.
- If you have slow heartbeat.
- If you have disorders of heart rhythm (irregular heartbeat).
- If you have heart failure: "Cardiogenic Shock" – a serious heart condition caused by very low blood pressure, which may result in the following symptoms: dizziness and lightheadedness, fast pulse rate, white skin, sweating, restlessness and loss of consciousness.

Do not use TIMOLAIN if you are pregnant unless your doctor considers it necessary.

Do not use TIMOLAIN if you are breast-feeding. Timolol may get into your milk. Ask your doctor for advice

before taking any medicine during breast-feeding.

• *Before you start to use it;*

Before you use this medicine tell your doctor if you have now or have had in the past:

- coronary heart disease (symptoms can include chest pain or tightness, breathlessness or choking).
- heart failure.
- low blood pressure.
- disturbances of heart rate such as slow heartbeat.
- breathing problems, asthma or chronic obstructive pulmonary disease.
- poor blood circulation disease (such as Raynaud's disease or Raynaud's syndrome).
- diabetes as timolol may mask signs and symptoms of low blood sugar.
- overactivity of the thyroid gland as timolol may mask signs and symptoms.
- you wear soft contact lenses.

• *Taking other medicines;*

TIMOLAIN can affect or be affected by other medicines you are using, including other eye drops for the treatment of glaucoma. Tell your doctor if you are using or intend to use medicines to lower blood pressure, heart medicine or medicines to treat diabetes. Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including other eye drops or medicines obtained without a prescription. It is important to tell your doctor before using TIMOLAIN if you are taking one or more of the following medicines:

- A calcium antagonist, such as nifedipine, verapamil or diltiazem, often used to treat high blood pressure, angina, an abnormal heartbeat or Raynaud's syndrome.
- Digoxin, a medicine used to relieve heart failure or treat abnormal heartbeat.
- Medicines known as catecholamine-depleting agents, such as rauwolfia alkaloids/reserpine used for high blood pressure.

- Medicines called pressor amines, such as adrenaline used to treat severe allergic reaction.
- Quinidine (used to treat heart conditions and some types of malaria).
- Antidepressants known as fluoxetine and paroxetine.
- Clonidine, a medicine used to treat high blood pressure.
- Other beta-blockers taken by mouth or used as eye drops, because they belong to the same group of medicines as TIMOLAIN and could have an additive effect.

HOW TO USE TIMOLAIN

• *How much to use;*

Always use TIMOLAIN exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure. The doctor will decide how many drops you should take each day and how long you should use them. The usual dose is one drop in the affected eye(s) twice each day:

- One in the morning
- One in the evening

• *When to use it;*

Take TIMOLAIN as prescribed by your doctor.

• *How long to use it;*

Your doctor will decide for how long the eye drops will be needed.

• *If you forget to use it;*

It is important to take TIMOLAIN as prescribed by your doctor.

- If you miss a dose, use the drops as soon as possible.
- If it is almost time for the next dose, skip the missed dose and take the next dose at the usual time.
- Do not take a double dose to make up for the forgotten dose.

• *If you use too much (overdose);*

If you put too many drops in your eye or swallow any of the drops, you may:

- Have a headache.
- Feel dizzy or light-headed.
- Have difficulty breathing.
- Chest pain.

Timolol Maleate Ophthalmic Solution USP (Timolol 0.5%)

- Feel that your heart rate has slowed down.

If this happens, contact your doctor immediately.

• **Instruction for Use;**

To instill the eye drops, follow these steps:

1. Wash your hands thoroughly with soap and water before and after using TIMOLAIN.
2. Check the dropper tip to make sure that it is not chipped or cracked.
3. Avoid touching the dropper tip against your eye or anything else; eye drops and droppers must be kept clean.
4. While tilting your head back, pull down the lower lid of your eye with your index finger to form a pocket.
5. Hold the dropper (tip down) with the other hand, as close to the eye as possible without touching it.
6. Close your eye for 2 to 3 minutes and tip your head down as though looking at the floor. Try not to blink or squeeze your eyelids.
7. Place a finger on the tear duct and apply gentle pressure.
8. Wipe any excess liquid from your face with a tissue.
9. If you are to use more than one drop in the same eye, wait at least 10 minutes before instilling the next drop.
10. Replace and tighten the cap on the dropper bottle. Do not wipe or rinse the dropper tip.

WHILE YOU ARE USING IT

• **Things you must do:**

Tell your doctor before you have an operation that you are using TIMOLAIN as timolol may change effects of some medicines used during anaesthesia.

Tell your doctor if:

- you get an eye infection.
- you injure your eye or have an operation on it.
- your eye problems get worse or you get any new symptoms.

• **Things you must not do;**

- Do not change the dose of this medicine without talking to your doctor.
- Do not allow the tip of the container to touch the eye or areas around the eye. It may become contaminated with bacteria that can cause eye infection leading to serious damage of the eye, even loss of vision. To avoid possible contamination of the container, keep the tip of the container away from contact with any surface.

• **Things to be careful of;**

If your eye becomes irritated or any new eye problems come on, talk to your doctor straight away. Eye problems could include redness of the eye or swelling of the eyelids.

If you suspect that TIMOLAIN is causing an allergic reaction or hypersensitivity (for example, skin rash, or redness and itching of the eye), stop using TIMOLAIN and contact your doctor immediately.

SIDE EFFECTS

Like all medicines, TIMOLAIN can cause side effects, although not everybody gets them. You can usually carry on taking the drops, unless the effects are serious. If you are worried, talk to a doctor or pharmacist. Do not stop using TIMOLAIN without speaking to your doctor. Like other medicines applied into eyes, timolol is absorbed into the blood. This may cause similar side effects as seen with intravenous and/or oral beta-blocking agents. Incidence of side effects after topical ophthalmic administration is lower than when medicines are, for example taken by mouth or injected. Listed side effects include reactions seen within the class of beta-blockers when used for treating eye conditions.

- If you develop allergic reactions including swelling beneath the skin that can occur in areas such as the face and limbs, and can obstruct the airway which may cause difficulty swallowing or breathing, hives or itchy rash, localized and generalized rash, itchiness, severe sudden life-threatening allergic reaction, stop taking your eyes drops and seek medical attention immediately.
- Low blood glucose levels.

- Difficulty sleeping (insomnia), depression, nightmares, memory loss.
- Fainting, stroke, reduced blood supply to the brain, increases in signs and symptoms of myasthenia gravis (muscle disorder), dizziness, unusual sensations like tingling or pins and needles, and headache.
- Ringing sound in the ears.
- Slow heart rate, chest pain, palpitations, oedema (fluid build up), changes in the rhythm or speed of the heartbeat, congestive heart failure (heart disease with shortness of breath and swelling of the feet and legs due to fluid build up), a type of heart rhythm disorder, heart attack, heart failure.
- Low blood pressure, fainting, interference with the blood supply to the brain which may lead to a stroke, Raynaud's phenomenon, cold hands and feet, limping because there is a reduced blood supply to your legs.
- Constriction of the airways in the lungs (predominantly in patients with pre-existing disease), difficulty breathing, shortness of breath, wheezing, cough.
- Taste disturbances, nausea, indigestion, diarrhoea, dry mouth, abdominal pain, vomiting.
- Sexual dysfunction, decreased sex drive, decreased libido. In men a condition which affects your penis called Peyronie's disease. The signs may be abnormal curve, pain or hardening of the tissue of your penis.
- Hair loss, skin rash with white silvery coloured appearance (psoriasiform rash) or worsening of psoriasis, skin rash, itching.
- Muscle weakness/tiredness, muscle pain not caused by exercise.
- A condition called lupus (*systemic lupus erythematosus*).

Ask your doctor or pharmacist for more information about the side effects. Both have a more complete list of side effects. If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

You may report any side effects or adverse drug reactions directly to the National Centre for Adverse Drug

TIMOLAIN

Consumer Medication Information Leaflet (RiMUP)

Timolol Maleate Ophthalmic Solution USP (Timolol 0.5%)

Reaction Monitoring by calling Tel: 03-78835550, or visiting the website portal.bpfk.gov.my (Consumers → Reporting)

SERIAL NUMBER
BPFK(Rx)XXXXXX/XXXXX

STORAGE AND DISPOSAL OF TIMOLAIN

• **Storage;**

- Keep out of the reach of children.
- Do not store above 30°C.
- Protect from light
- Keep the bottle tightly closed.

• **Disposal;**

- Do not use the drops after the expiry date (marked 'Exp') on the bottle and the carton.
- Stop using the bottle 28 days after first opening, to prevent infections.
- Medicines should not be disposed of via waste water or household waste. Ask your doctor or pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

PRODUCT DESCRIPTION

• **What it looks like;**

TIMOLAIN is a clear, colourless to light yellow solution supplied in a pack containing 1 bottle of 5 mL LDPE plastic bottle with a screw cap.

• **Ingredients;**

- The active substance is Timolol as Timolol Maleate 0.68 mg/mL
- The other ingredients are benzalkonium chloride, monobasic sodium phosphate dehydrate, dibasic sodium phosphate dodecahydrate, sodium hydroxide (to adjust pH) and water for injections.

• **MAL number;**

MALXXXXXXXXXA

MANUFACTURER AND PRODUCT REGISTRATION HOLDER:

 **AIN MEDICARE SDN. BHD.**
Jalan 6/44, Kawasan Perindustrian
Pengkalan Chepa 2, 16100 Kota
Bharu, Kelantan, Malaysia.

DATE OF REVISION

20/07/2016

Timolol Maleate Ophthalmic Solution USP (Timolol 0.5%)

KANDUNGAN RISALAH

1. Apakah kegunaan TIMOLAIN
2. Bagaimana TIMOLAIN berfungsi
3. Sebelum mengambil TIMOLAIN
4. Cara menggunakan TIMOLAIN
5. Semasa menggunakan TIMOLAIN
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan TIMOLAIN
8. Deskripsi produk

APAKAH KEGUNAAN TIMOLAIN

Ubat ini digunakan untuk merawat glaukoma, iaitu apabila tekanan dalam mata meningkat.

BAGAIMANA TIMOLAIN BERFUNGSI

TIMOLAIN mengandungi satu bahan yang dipanggil sebagai timolol yang tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dikenali sebagai *beta-blocker*. Timolol bertindak dengan menurunkan tekanan dalam mata anda.

SEBELUM MENGAMBIL TIMOLAIN

• *Bila tidak boleh mengambil;*

Jangan mengambil TIMOLAIN

- Jika anda mempunyai alahan kepada timolol atau bahan-bahan lain seperti yang disenaraikan dalam Seksyen Maklumat Lanjut.
- Jika anda mempunyai atau pernah mempunyai pengalaman dalam masalah pernafasan seperti asma, penyakit paru-paru obstruktif kronik yang teruk (penyakit paru-paru yang menyebabkan termengah/tercungap-cungap, kesukaran bernafas dan/atau batuk yang berpanjangan).
- Jika anda mempunyai masalah jantung.
- Jika anda mempunyai degupan jantung yang perlahan.
- Jika anda mempunyai gangguan degupan jantung (degupan jantung yang tidak normal).
- Jika anda mempunyai masalah jantung gagal untuk berfungsi: "Kejut Kardiogenik" – suatu keadaan jantung yang serius disebabkan oleh tekanan darah yang rendah yang boleh mengakibatkan beberapa

simptom: pening, kadar nadi yang laju, kulit bertukar putih, berpeluh, kegelisahan dan tidak sedarkan diri.

Jangan guna TIMOLAIN jika anda mengandungi melainkan doktor anda mempertimbangkan yang ia sangat diperlukan.

Jangan guna TIMOLAIN jika anda sedang menyusu. Timolol mungkin terdapat dalam susu. Sila dapatkan nasihat daripada doktor sebelum mengambil apa-apa ubat ketika menyusu.

• *Sebelum mula mengambil;*

Sebelum anda menggunakan ubat ini, sila beritahu kepada doktor anda jika anda mempunyai atau pernah mempunyai:

- Penyakit koronari jantung (simptomnya melibatkan sakit dada atau tekanan pada dada, sukar bernafas atau tercekik).
- Jantung gagal berfungsi.
- Tekanan darah rendah.
- Gangguan pada kadar degupan jantung seperti degupan jantung yang perlahan.
- Masalah pernafasan, asma atau penyakit paru-paru obstruktif yang kronik.
- Penyakit aliran darah yang lemah (seperti penyakit *Raynaud* atau sindrom *Raynaud*).
- Diabetes/kencing manis kerana timolol mungkin menyebabkan tanda-tanda dan simptom kadar gula dalam darah rendah sukar dinilai.
- Kelenjar tiroid terlampau aktif kerana timolol mungkin menyebabkan tanda-tanda dan simptom sukar dinilai.
- Sekiranya anda memakai kanta sentuh lembut.

• *Jika mengambil ubat-ubat lain;*

TIMOLAIN boleh memberi kesan atau terkesan dengan ubat-ubat lain yang anda sedang gunakan, termasuk ubat titis mata yang lain untuk merawat glaukoma (tekanan dalam mata yang tinggi). Beritahu doktor anda jika anda menggunakan atau berniat untuk menggunakan ubat-ubat yang menurunkan tekanan darah, ubat untuk jantung atau ubat-ubat untuk

diabetes/kencing manis. Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil atau baru mengambil ubat-ubat lain, termasuk ubat titis mata yang lain atau ubat-ubat yang didapati tanpa preskripsi ubat. Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil ubatan lain seperti;

- *Calcium antagonist*, seperti *nifedipine*, *verapamil* atau *diltiazem*, yang digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi, *angina*, degupan jantung yang tidak normal atau sindrom *Raynaud*.
- *Digoxin*, ubat yang digunakan untuk merawat kegagalan jantung atau merawat denyutan jantung yang tidak normal.
- Ubat-ubatan yang dikenali sebagai agen *catecholamine-depleting*, seperti *rauwolfia alkaloids/reserpine* yang digunakan untuk tekanan darah tinggi.
- Ubatan *pressor amines*, seperti *adrenaline* yang digunakan untuk merawat reaksi alahan yang teruk
- *Quinidine* (digunakan untuk merawat masalah jantung dan beberapa jenis *malaria*).
- *Antidepressants* yang dikenali sebagai *fluoxetine* dan *paroxetine*
- *Clonidine*, ubat yang digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi.
- *Lain-lain beta-blockers* yang diambil melalui mulut atau yang digunakan sebagai ubat titis mata, kerana mereka tergolong dalam kumpulan ubat yang sama seperti TIMOLAIN dan boleh mempunyai kesan tambahan.

CARA MENGGUNAKAN TIMOLAIN

• *Berapa banyak harus digunakan;*

Gunakan TIMOLAIN seperti yang disarankan oleh doktor anda. Sila rujuk doktor atau ahli farmasi anda jika ragu-ragu. Doktor akan menentukan berapa banyak titis yang anda perlu ambil setiap hari dan berapa lama anda perlu guna. Dos biasa ialah satu titis pada mata yang terjejas dua kali sehari:

- Satu titis pada waktu pagi
- Satu titis pada waktu petang

Timolol Maleate Ophthalmic Solution USP (Timolol 0.5%)

- **Bila perlu digunakan;**

Ambil TIMOLAIN seperti yang ditetapkan oleh doktor anda.

- **Berapa lama perlu digunakan;**

Doktor anda akan menentukan berapa lama ubat titis mata diperlukan.

- **Jika terlupa menggunakan;**

Adalah penting untuk menggunakan TIMOLAIN seperti yang diberikan oleh doktor anda.

- Jika anda tertinggal satu dos, gunakan dengan segera.
- Jika hampir waktu dengan dos seterusnya, tinggalkan dos yang terlepas dan ambil dos seterusnya pada waktu biasa.
- Jangan ambil dos berganda untuk mencukupkan dos yang terlepas.

- **Jika mengambil berlebihan (terlebih dos);**

Jika anda menggunakan terlalu banyak titis ke dalam mata anda atau tertelan mana-mana titisan, anda mungkin:

- Mengalami pening kepala.
- Mengalami kesukaran bernafas.
- Sakit dada.
- Rasa seperti kadar degupan jantung menjadi perlahan.

Jika ini terjadi, hubungi doktor anda dengan kadar yang segera.

- **Arahan penggunaan;**

Langkah-langkah penggunaan:

1. Basuh tangan anda dengan sabun dan air sebelum dan selepas menggunakan TIMOLAIN.
2. Pastikan bahagian hujung botol tidak sumbing atau retak.
3. Elakkan hujung botol dari menyentuh mata atau bahagian-bahagian lain; Ubat titis mata perlu disimpan dalam keadaan bersih.
4. Untuk menitis ubat anda perlu dongakkan kepala ke belakang sedikit dan tarik kelopak bawah mata menggunakan hujung jari untuk membentuk poket.
5. Pegang botol (hujung botol menghalau ke bawah) dengan menggunakan tangan sebelah lagi dan titiskan ubat sedekat mungkin dengan mata tanpa menyentuh hujung botol tersebut.

6. Selepas ubat di titiskan, tutup mata selama 2 hingga 3 minit dan tundukkan kepala anda. Jangan mengelipkan atau mengosok kelopak mata anda.
7. Tekan perlahan-lahan sudut dalam mata.
8. Lap lebihan cairan yang keluar dari mata.
9. Jika perlu menggunakan lebih dari satu jenis ubat titis mata, tunggu 10 minit sebelum menggunakan ubatan seterusnya.
10. Jangan lap atau basuh bahagian atas hujung botol tersebut. Tutup botol kembali selepas digunakan.

SEMASA MENGGUNAKAN TIMOLAIN

- **Perkara yang perlu dilakukan:**

Sila beritahu doktor anda sebelum anda menjalani pembedahan yang ada sedang menggunakan TIMOLAIN kerana timolol boleh menyebabkan perubahan kesan kepada ubat-ubat yang digunakan ketika proses pembiusan.

Beritahu doktor anda jika:

- Anda mendapat jangkitan mata.
- Jika anda mengalami kecederaan mata atau menjalankan pembedahan pada mata.
- Jika masalah mata anda semakin teruk atau mendapat simptom-simptom yang baharu.

- **Perkara yang tidak boleh dilakukan;**

- Jangan tukar dos yang biasa tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Jangan biarkan hujung botol menyentuh mata atau kawasan sekitar mata. Ia akan tercemar dengan bakteria yang boleh menyebabkan jangkitan mata yang akan mengakibatkan bukan sahaja kerosakan yang serius pada mata, malah hilang penglihatan. Jaga hujung botol jauh daripada mana-mana sentuhan untuk mengelakkan dari pencemaran botol.

- **Perkara yang perlu diberi perhatian;**

Jika mata anda mengalami ketidakselesaan atau masalah mata yang baharu, sila berhubung dengan doktor anda. Masalah mata boleh melibatkan

mata kemerahan atau bengkak pada kelopak mata.

Jika anda mengesyaki yang TIMOLAIN menyebabkan anda mengalami alahan atau sensitif (sebagai contoh, ruam kulit, atau merah dan kegatalan mata), berhenti menggunakan TIMOLAIN dan hubungi doktor anda dengan segera.

KESAN-KESAN SAMPINGAN

Seperti semua ubat, TIMOLAIN boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua pesakit akan mengalaminya. Anda boleh teruskan penggunaan ubat titis melainkan kesannya serius. Jika anda risau, bincang dengan doktor atau ahli farmasi. Jangan berhenti menggunakan TIMOLAIN tanpa berbincang dengan doktor anda. Seperti ubat-ubat lain yang digunakan pada mata, timolol diserap masuk ke dalam darah. Ini akan menyebabkan kesan sampingan yang sama sebagaimana yang boleh dihasilkan oleh agen *beta-blocker* yang diambil melalui suntikan dan/atau mulut. Kebarangkalian kesan sampingan selepas penggunaan agen topikal pada mata adalah rendah berbanding melalui mulut atau suntikan. Kesan sampingan yang disenaraikan melibatkan reaksi yang juga boleh dilihat dalam kelas ubat *beta-blockers* yang digunakan untuk rawatan mata.

- Jika anda mengalami alahan termasuklah bengkak pada bawah kulit yang terjadi pada bahagian muka dan anggota badan dan boleh menghalang laluan udara pernafasan yang mungkin menyebabkan kesukaran untuk menelan atau bernafas, gatal-gatal atau gatal ruam, ruam setempat atau umum, kegatalan, alahan yang mengundang maut, berhenti menggunakan ubat titis mata anda dan dapatkan rawatan dengan segera.
- Tahap glukosa (gula) yang rendah dalam darah.
- Kesukaran untuk tidur (insomnia), kemurungan, mimpi ngeri, hilang ingatan.
- Pengsan, strok (angin ahmar), aliran darah yang berkurangan kepada otak, peningkatan tanda-tanda dan simptom *myasthenia gravis* (gangguan otot), pening, deria sentuhan yang tidak

Timolol Maleate Ophthalmic Solution USP (Timolol 0.5%)

normal seperti berduri atau menyucuk dan pening.

- Tanda-tanda dan simptom ketidakselesan mata (seperti terbakar, terkena sengat, gatal, terkoyak, kemerahan), keradangan kelopak mata, keradangan kornea, kabur penglihatan dan tertanggal lapisan bawah retina yang mempunyai salur darah selepas pembedahan yang mungkin mengganggu penglihatan, sensitiviti kornea mata yang berkurangan, mata yang kering, hakisan kornea (kerosakan pada lapisan hadapan bebola mata), kelopak mata yang sedikit terjatuh (menyebabkan mata separuh tertutup), penglihatan berbayang, sensitif kepada cahaya, keluar cecair dari mata, sakit dalam mata.
- Bunyi yang nyaring dalam telinga.
- Kadar degupan jantung yang perlahan, sakit dada, berdebar, sembab (*oedema*/pengumpulan cecair), perubahan degupan jantung, jantung gagal berfungsi (penyakit jantung yang berkait dengan sesak nafas, bengkak kaki disebabkan sembab), sejenis gangguan degupan jantung, serangan jantung, jantung gagal berfungsi.
- Tekanan darah rendah, pengsan, gangguan pada aliran darah kepada otak yang boleh menyebabkan strok (angin ahmar), fenomena *Raynaud*, tangan dan kaki sejuk, tempang disebabkan kekurangan bekalan darah kepada kaki.
- Saluran udara mengecut dalam paru-paru (terutamanya pesakit yang terlebih dahulu mempunyai penyakit), kesukaran bernafas, sesak nafas, termengah/tercungap-cungap, batuk.
- Gangguan deria rasa, loya, senak, cirit-birit, kekeringan mulut, sakit perut, muntah.
- Seksual yang tidak berfungsi, nafsu seks yang berkurang. Bagi lelaki, satu keadaan yang akan memberi kesan kepada zakar yang dipanggil penyakit *Peyronie*. Tanda-tanda mungkin melibatkan lekuk yang tidak normal, sakit atau pengerasan tisu zakar anda.
- Keguguran rambut, ruam kulit berwarna putih berkilau (ruam seperti *psoriasis*) atau lebih teruk dari *psoriasis*, ruam kulit, kegatalan.
- Lemah otot, sakit otot yang tidak disebabkan oleh senaman.

- Satu keadaan yang dipanggil sebagai *lupus* (*systemic lupus erythematosus*).

Sila minta maklumat lanjut berkenaan kesan sampingan dari doktor atau ahli farmasi anda. Mereka mempunyai senarai penuh kesan sampingan.

Jika salah satu kesan sampingan semakin serius, atau kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam helaian ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (Consumers → Reporting)

CARA PENYIMPANAN DAN PELUPUSAN TIMOLAIN

• Penyimpanan;

- Jauhkan daripada kanak-kanak.
- Jangan simpan pada suhu melebihi 30°C.
- Jauhkan dari cahaya.
- Pastikan penutup botol ditutup rapat.

• Pelupusan;

- Jangan gunakan ubat yang melebihi tarikh luput yang tertera pada botol dan kotak.
- Jangan gunakan ubat lebih dari 28 hari selepas tarikh botol dibuka.
- Jangan buang lebihan ubat yang tidak digunakan ke dalam saluran air atau sampah di rumah. Sila rujuk pegawai farmasi cara pembuangan lebihan ubat tersebut. Langkah ini dapat memelihara alam sekitar daripada tercemar.

MAKLUMAT LANJUT

• Rupa dan warna produk;

TIMOLAIN adalah cecair cerah yang tidak berwarna atau sedikit kekuningan yang dibekalkan dalam kotak. Setiap kotak mengandungi 1 botol plastik 5 mL bersama penutup berskru.

• Bahan-bahan kandungan;

- Bahan aktif ialah Timolol sebagai Timolol Maleate 0.68 mg/mL
- Bahan-bahan lain adalah benzalkonium klorida, natrium fosfat dehidrat monobasik, natrium fosfat

dodekahidrat dibasik, natrium hidroksida (untuk selaras pH) dan air untuk suntikan.

• Nombor MAL;

MALXXXXXXXXXA

PENGILANG DAN PEMEGANG PENDAFTARAN PRODUK:

 **AIN MEDICARE SDN. BHD.**
Jalan 6/44, Kawasan Perindustrian Pengkalan Chepa 2, 16100 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.

TARIKH KEMASKINI

20/07/2016

NOMBOR SIRI

BPFK(Rx)XXXXXX/XXXXX