

VIARTRIL[®]-S SACHET

Glucosamine sulphate (1500 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Viartril-S Sachet
2. Bagaimana Viartril-S Sachet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Viartril-S Sachet
4. Cara menggunakan Viartril-S Sachet
5. Semasa menggunakan Viartril-S Sachet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Viartril-S Sachet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Viartril-S Sachet

Viartril-S Sachet digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit *osteoarthritis* (kehilangan tulang rawan pada sendi).

Bagaimana Viartril-S Sachet berfungsi

Viartril-S Sachet mengandungi *crystalline glucosamine sulphate* sebagai bahan aktif. *Crystalline glucosamine sulphate* melegakan penyakit sendi dengan mengurangkan bengkak dan melegakan kesakitan pada sendi.

Sebelum menggunakan Viartril-S Sachet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Viartril-S Sachet sekiranya anda:

- mempunyai alahan terhadap *glucosamine* atau bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (tersenarai dalam

maklumat lanjut)

- menghadapi *phenylketonuria* (PKU) kerana ubat ini mengandungi *aspartame*, sumber *phenylalanine*
- menghidap intoleransi fruktosa keturunan (HFI) kerana ubat ini mengandungi *sorbitol*
- mempunyai alahan terhadap kerang kerana bahan aktifnya diperolehi daripada makanan laut (kerang)

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil Viartril-S Sachet jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung, mungkin mengandung.

Jangan ambil Viartril-S Sachet jika andasedang menyusukan anak.

Kanak-kanak dan remaja

Jangan berikan ubat ini kepada kanak-kanak dan remaja yang berumur bawah 18 tahun kerana keselamatan dan keberkesanannya belum terbukti.

- Sebelum mula menggunakannya

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mempunyai:

- Asma
- Diet garam sodium terkawal
- Masalah hati atau buah pinggang
- Kencing manis atau gangguan toleransi glukosa
- Penyakit sendi lain yang mungkin memerlukan rawatan alternatif.

- Jika ada mengambil ubat-ubat

lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda ada mengambil:

- Ubat cair darah
- Tetracyclines (antibiotik)

Ubat tahan sakit atau anti-radang boleh diambil bersama dengan Viartril-S Sachet.

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Viartril-S Sachet

- Berapa banyak harus digunakan

Ambil satu sachet, larutkan dalam segelas air

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu menggunakannya

Ambil sekali sehari, sebaiknya semasa makan atau ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu menggunakannya

Gunakan Viartril-S Sachet mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda atau ahli farmasi anda.

- Jika anda terlupa mengambilnya

VIARTRIL[®]-S SACHET

Glucosamine sulphate (1500 mg)

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos tertinggal dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika terambil secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Viartril-S Sachet

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor atau ahli farmasi.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Viartril-S Sachet.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh

doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Viartril-S Sachet kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa mengantuk, sakit kepala atau mengganggu penglihatan anda, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Viartril-S Sachet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan-kesan sampingan yang mungkin dialami, termasuklah:

- *Jantung dan saluran darah:* bengkak pada kaki / tangan, degupan jantung laju
- *Sistem saraf pusat:* sakit kepala, mengantuk, kesukaran

untuk tidur

- *Saluran usus dan perut:* loya, muntah, cirit-birit, senak, atau sakit pada bahagian atas perut, buang angin, sembelit, pedih ulu hati, gangguan pemakanan
- *Reaksi kulit:* ruam kulit, kemerahan, kegatalan, keradangan, gegata, eczema
- *Lain-lain:* keguguran rambut, reaksi alahan, gangguan penglihatan, bengkak

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Viartril-S Sachet

- Penyimpanan

Jangan simpan melebihi suhu 30°C.

Jauhi daripada capaian dan pandangan kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah.

Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Setiap sachet mengandungi serbuk

VIARTRIL[®]-S SACHET

Glucosamine sulphate (1500 mg)

putih, kristal yang tidak berbau
yang secukupnya untuk satu dos.

- Bahan-bahan kandungan

Setiap kapsul mengandungi:

- *Bahan aktif*
Crystalline glucosamine
sulphate 1884 mg (bersamaan
1500 mg
glucosamine sulfate and 384
mg sodium chloride)
- *Bahan tidak aktif*
Aspartame, sorbitol, macrogol
4000, citric acid

- Nombor MAL:

MAL20031758XR

Pengilang

Rottapharm Limited
Damastown Industrial Park,
Mulhuddart, Dublin 15 Ireland.

Pemegang Pendaftaran Produk

Mylan Healthcare Sdn Bhd
15-03 & 15-04, Level 15,
Imazium,
No. 8, Jalan SS 21/37, Damansara
Uptown,
47400 Petaling Jaya, Selangor,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

2 May 2024

Nombor siri

NPRA(R2/1)240604/1281

**PIL-VIARTRILS SACHET-
0524**