

HADOL-5 TABLETS

Haloperidol (5mg)

Apakah yang ada pada risalah ini:

- ◆ Apakah kegunaan Hadol-5 Tablets
- ◆ Bagaimana Hadol-5 Tablets berfungsi
- ◆ Sebelum mengambil Hadol-5 Tablets
- ◆ Cara menggunakan Hadol-5 Tablets
- ◆ Semasa menggunakan taking Hadol-5 Tablets
- ◆ Kesan-kesan sampingan
- ◆ Cara penyimpanan dan pelupusan Hadol-5 Tablets
- ◆ Maklumat lanjut
- ◆ Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
- ◆ Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Hadol-5 Tablets

Haloperidol adalah bahan aktif untuk Hadol-5 Tablets. Ia diindikasikan untuk:

- Gangguan psikotik – menguruskan manifestasi gangguan psikotik akut dan kronik termasuklah skizofrenia, keadaan mania, psikosis yang disebabkan oleh ubat seperti psikosis steroid. Ia mungkin berguna dalam pengurusan pesakit agresif dan kerunsingan termasuklah pesakit dengan sindrom otak kronik atau terencat akal.
- Sindrom *Gilles de la Tourette* (suatu keadaan yang menyebabkan seseorang menghasilkan bunyi dan pergerakan pantas secara berulang dan tidak dapat dikawal) – untuk kawalan tics dan suara sindrom *Tourette* kanak-kanak dan orang dewasa.

Bagaimana Hadol-5 Tablets berfungsi

Haloperidol berfungsi pada sistem saraf pusat dengan bertindak ke atas bahan kimia di dalam otak untuk menghasilkan tindakan antipsikotik.

Sebelum mengambil Hadol-5 Tablets

Bila tidak boleh mengambil

- ◆ Sekiranya anda mempunyai depresi Sistem Saraf Pusat dan penyakit Parkinson's.
- ◆ Sekiranya anda mempunyai hipersensitiviti (alergi) terhadap Haloperidol atau sebarang kandungannya.

Sebelum mula mengambil

Anda harus beritahu doktor sekiranya:

- ◆ Anda mempunyai alahan terhadap mana-mana ubat yang telah diambil sebelum ini untuk merawat keadaan semasa anda.
- ◆ Anda hamil, cuba untuk hamil atau sedang menyusukan anak.
- ◆ Jika anda mempunyai penyakit hati atau jantung, konvulsi dan jika anda seorang warga tua.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor dan ahli farmasi anda sekiranya anda sedang mengambil mana-mana ubat lain termasuklah tonik herbal, pelengkap tambahan dan ubat yang dibeli tanpa preskripsi. Ubat-ubat berikut mempunyai interaksi dengan Haloperidol:

- Depresan Sistem Saraf Pusat seperti opiate, ubat tahan sakit, barbiturat, ubat sedatif lain, ubat bius atau alkohol – Hadol akan mempertingkatkan kesan ubat-ubatan ini.
- Lithium – sindrom ensefalopatik akut (gangguan atau penyakit otak) pernah terjadi.
- Phenidione, sejenis ubat pencairan darah – Haloperidol pernah dilaporkan mengurangkan kesan pencairan darah.
- Agen antikolinergik dan antiparkison – meningkatkan tekanan dalam mata.
- Methyldopa – demensia (kehilangan fungsi mental) pernah dilaporkan.

Cara menggunakan Hadol-5 Tablets

Guna ubat ini seperti yang diberitahu oleh doktor anda. Anda harus menyemak dengan doktor atau ahli farmasi sekiranya anda tidak pasti.

Berapa banyak harus digunakan

Orang Dewasa: 1.25mg-2.5mg dua hingga tiga kali sehari pada mulanya, dos diubahsuai dengan perlahan seperti yang diperlu dan ditolerasikan.

Had maksimum : 100mg sehari.

Orang tua/lemah: Pada mulanya, setengah daripada dos orang dewasa, dos ditingkatkan dengan perlahan seperti yang diperlu dan ditolerasikan.

Bila perlu digunakan

Doktor akan menentukan bila adalah sesuai untuk anda menggunakan Hadol-5 Tablet mengikut keadaan anda. Ia hendaklah diambil secara oral dengan segelas air.

Berapa lama perlu digunakan

Terus guna Hadol-5 Tablet sepanjang mana doktor syorkan.

Sekiranya anda TERLUPA UNTUK MENGAMBIL

- Sekiranya anda terlupa satu dos, ambil dos itu dengan segera sebaik sahaja teringat.
- Tetapi, sekiranya telah hampir masa untuk dos berikutnya, abaikan dos yang terlepas.
- Jangan mengambil dos berganda untuk menggantikan dos yang dilupa.

Sekiranya anda mengambil berlebihan (terlebi dos)

Simptom-simptom berlebihan dos mungkin merupakan kesan-kesan sampingan yang diperbesarkan. Anda akan kelihatan koma dengan kesukaran bernafas dan tekanan darah rendah yang cukup serius untuk menghasilkan keadaan serupa kejutan. Pengguna adalah dinasihatkan untuk pergi ke hospital terdekat sekiranya terlebih dos berlaku.

Semasa menggunakan Hadol-5 Tablets

Perkara yang perlu dilakukan

Sekiranya anda hamil semasa mengambil Hadol-5 Tablets, sila beritahu doktor anda.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan beri Hadol-5 Tablets kepada sesiapa pun, walaupun mereka mempunyai keadaan atau simptom yang sama seperti anda. Doktor anda telah mempreskripsikan Hadol-5 Tablets untuk anda dan keadaan anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Elakkan aktiviti yang memerlukan kewaspadaan mental.

Kesan-kesan sampingan

Seperti kebanyakan ubat, Hadol-5 Tablets juga mempunyai kesan sampingan walaupun bukan semua orang yang mengalaminya. Berikut adalah kesan sampingan yang mungkin terjadi:


- Reaksi ekstrapirimal: sering terjadi terutamanya pada beberapa hari pertama terapi. Simptom termasuklah simptom-simptom parkinsonian, kegelisahan, agitasi, pergerakan tidak biasa, seperti tangan dan jari bergetaran dan bergoyang, pergerakan badan yang berpusing.
- Kesan-kesan sistem saraf lain: tidak dapat tidur, gelisah, perasaan amat gembira, agitasi, mengantuk, kurang bersemangat, letih, sakit kepala, keliru, vertigo dan sawan.
- Kesan hematologik/darah: peningkatan atau penurunan bilangan sel darah putih, penurunan bilangan sel darah merah dan jarang berlaku, penurunan bilangan sel darah putih jenis tertentu secara mendadak yang menyebabkan demam tinggi akut.
- Kesan Metabolik dan Endokrin: galaktoria (rembesan susu payudara pada lelaki atau wanita yang tidak menyusukan anak), sakit pada payudara, pembesaran

buah dada yang tidak normal pada lelaki, keinginan seks meningkat, ketidakupayaan untuk berhubungan seks (mati pucuk), paras gula tinggi atau rendah dan paras garam rendah di dalam darah.

- Kesan sampingan lain termasuklah kadar jantung yang cepat, tekanan darah rendah atau tinggi, kekuningan pada kulit dan putih mata (jaundis), reaksi kulit termasuklah ruam dan sensitif terhadap matahari.

Sekiranya mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau anda mempunyai kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda was-was atau untuk maklumat selanjutnya.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (Public  *Reporting Medicinal Problems/ Side Effects/ AEFI/ Vaccine Safety*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Hadol-5 Tablets

Cara penyimpanan

Jangan menggunakan ubat ini selepas tarikh tamat tempoh yang dinyatakan pada bungkusan. Tarikh tamat tempoh merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

Simpan di bawah suhu 30°C dalam bekas yang ditutup rapat. Lindungi daripada cahaya dan kelembapan.

Jauhi dari kanak-kanak.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui sisa air atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda cara-cara pelupusan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna Hadol-5 Tablets

Tablet ini berwarna hijau, berbentuk bulat dan leper, dengan garisan skor, diameter 7mm dengan tanda 'MPI'. Ia dibekalkan dalam pek blister 100 x 10's.

Bahan-bahan kandungan

- ♦ Setiap tablet mengandungi 5mg bahan aktif, *Haloperidol*.
- ♦ Bahan-bahan lain adalah seperti laktosa, kanji jagung, *microcrystalline cellulose pH101*, kanji ubi, *magnesium stearate*, *sodium lauryl sulphate* dan *sodium copper chlorophyllin*.

MAL NO: MAL19985188A

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Malaysian Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.
Plot 14, Lebuhraya Kampung Jawa,
11900 Bayan Lepas, Penang,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

Risalah dikemaskini pada 26/06/2018

Nombor Siri:

BPFK(R4/1)120315/00040