

FOLIO SYRUP

Ivy Leaf Extract Syrup 7mg/ml

Apakah yang ada pada risalah ini:

1. Apakah kegunaan Folio Syrup
2. Bagaimana Folio Syrup berfungsi
3. Sebelum menggunakan Folio Syrup
4. Cara menggunakan Folio Syrup
5. Semasa menggunakan Folio Syrup
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Folio Syrup
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Folio Syrup

Ekstrak *Ivy leaf* adalah kandungan aktif Folio Syrup. Ia adalah suatu produk herbal tradisi digunakan untuk melegakan iritasi kerongkong, batuk dan mengurangkan kahak.

Bagaimana Folio Syrup berfungsi

Mekanisme tindakan Ekstrak *Ivy leaf* (*Hedera Helix*) adalah tidak diketahui..

Sebelum menggunakan Folio Syrup

- Bila tidak boleh menggunakan

Jika anda hipersensitif terhadap *Ivy leaf* atau bahan-bahan lain dalam sirup.

- Sebelum menggunakan Folio Syrup

Tanya doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan .

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Kajian mengenai kesan mengambil Folio Syrup terhadap ubat lain tidak dijalankan.

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil / menggunakan atau baru-baru ini telah mengambil / menggunakan mana-mana ubat lain, termasuk ubat-ubat yang diperolehi tanpa preskripsi.

Mengandung dan menyusu

Tanya doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil sebarang ubat. Keselamatan penggunaan ubat ini semasa mengandung belum dikenalpasti. Ubat ini hanya boleh

digunakan sekiranya potensi manfaat melebihi risiko kepada kandungan.

Cara menggunakan Folio Syrup

Folio Syrup hanya untuk kegunaan oral sahaja. Sentiasa mengambil ubat ini sepertimana yang diberitahu oleh doktor. Anda patut merujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda tidak pasti. Guncang botol sebelum mengguna.

- Berapa banyak harus digunakan

Remaja, Dewasa, Warga tua:

5 ml 3 kali sehari.

Kanak-kanak di antara 6-11 tahun:

2.5 ml 3 kali sehari.

Kanak-kanak di antara 2-5 tahun: 1 tahun ke atas

1.5 ml 3 kali sehari.

Penggunaan pada kanak-kanak di bawah 2 tahun adalah dilarang.

- Bila perlu digunakan

Ubat ini seharusnya digunakan selepas makan. Guncang botol sebelum guna.

- Berapa lama perlu digunakan

Guna seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

- Sekiranya anda terlupa satu dos, ambil dos itu dengan segera sebaik sahaja teringat.
- Tetapi, sekiranya telah hampir masa untuk dos berikutnya, abaikan dos yang tertinggal.
- Jangan mengambil dos berganda untuk menggantikan dos yang dilupa.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Folio Syrup

- Perkara yang perlu dilakukan

Batuk yang berterusan pada kanak-kanak yang berumur di antara 2-4 tahun memerlukan dianogsis perubatan daripada doktor sebelum rawatan dengan Folio Syrup.

Anda perlu berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi anda apabila sesak nafas, demam atau kahak bernanah berlaku.

Hubungi doktor atau ahli farmasi anda jika simptom-simptom telah melarat lebih daripada seminggu semasa penggunaan Folio Syrup. Jika anda hamil pada masa menggunakan Folio Syrup, beritahu doktor anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil Folio Syrup tanpa nasihat perubatan jika anda sedang menggunakan opiate antitussives seperti codeine atau dextromethorphan.

Jangan memberi Folio Syrup kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom-simptom yang sama dengan penyakit anda. Doktor anda telah mempreskrib ubat ini untuk anda sahaja.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Perhatian perlu diambil untuk pesakit yang mempunyai gastrik atau ulser gastrik.

Ini adalah ubat tradisional. Ubat ini seharusnya diambil selepas berjumpa dengan doktor.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Folio Syrup boleh mempunyai kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mendapatnya. Kesan sampingan berikut mungkin terjadi dengan ubat ini:

- Reaksi gastrosus seperti loya, muntah, dan cirit-birit.
- Reaksi alahan termasuk urtikaria, ruam kulit dan sesak nafas.

Sekiranya mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau anda mengalami kesan sampingan yang

tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda was-was atau untuk mendapatkan maklumat selanjutnya.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (Public→Reporting Medical Problems/ Side Effects/ AEFI/ Vaccine Safety)

Jawa, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

10/07/2017

Cara penyimpanan dan pelupusan Folio Syrup

- Penyimpanan

Jangan gunakan selepas tarikh luput yang dinyatakan pada pek. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

Jangan simpan pada suhu melebihi 30°C. Simpan dalam bekas asal dan di tempat yang kering.

Lindungi daripada cahaya.

Jauhkan dari kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubat tidak boleh dibuang melalui air kumbahan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda cara untuk membuang ubat-ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Sirup berwarna perang kehijauan dan berperisa pudina.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Ivy Leaf Extract (Hedera helix)
- Bahan tidak aktif
Propylene Glycol, Xanthan Gum, Citric Acid Hydrous, Sodium Citrate, Sucralose, Methylparaben, Propylparaben, perisa Peppermint .

- Nombor MAL:

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Malaysian Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd. Plot 14, Lebuhraya Kg