

TRIDEX SYRUP

Tripolidine hydrochloride 1.25mg/5ml, Pseudoephedrine hydrochloride 30mg/5ml, Dextromethorphan hydrobromide 15mg/5ml

Apakah yang ada pada risalah ini:

1. Apakah kegunaan Tridex Syrup
2. Bagaimanakah Tridex Syrup berfungsi
3. Sebelum menggunakan Tridex Syrup
4. Cara menggunakan Tridex Syrup
5. Semasa menggunakan Tridex Syrup
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Tridex Syrup
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Tridex Syrup

Ia diindikasikan untuk merawat penyakit batuk kering tanpa kahak, sering berkaitan dengan penyakit selesema dan jangkitan saluran respiratori atas, alergi rinitis (radang pada membran mukus) dan 'hay fever'. Ia membantu untuk mengeringkan selesema dan membukakan *bronchi* yang sempit.

Bagaimana Tridex Syrup berfungsi

Tripolidine Hydrochloride membantu mengurangkan rembesan dalam hidung dengan cara menghalang histamina, sejenis bahan semulajadi yang dihasilkan dalam badan semasa tindak balas alergi.

Dextromethorphan bertindak sebagai agen penahan batuk yang kuat.

Kesan ubat pseudoephedrine boleh melegakan kesesakan nafas.

Sebelum mengambil Tridex Syrup

- Bila tidak boleh menggunakan Tridex Syrup

- ♦ Sekiranya anda mempunyai alahan (hipersensitif) kepada *Tripolidine hydrochloride*, *Pseudoephedrine hydrochloride*, *Dextromethorphan hydrobromide* atau sebarang kandungan dalam produk ini.

- ♦ Jika anda sedang mengambil *monoamine oxidase inhibitors*.
- ♦ Jika anda ada penyakit hati atau asma.
- ♦ Jika anda mempunyai hipertensi atau penyakit arteri koronari yang serius.
- ♦ Jika anda mempunyai batuk yang berterusan atau kronik atau apabila batuk disertai dengan rembesan yang berlebihan selain diarah oleh doktor.

- Sebelum mula menggunakan Tridex Syrup

Anda harus beritahu doktor sekiranya:

- ♦ Anda mempunyai alahan terhadap mana-mana ubat yang telah diambil sebelum ini untuk merawat keadaan semasa anda.
- ♦ Anda mengandung, merancang untuk mengandung atau menyusu.

Mengandung dan menyusu

Keselamatan penggunaan ubat ini semasa mengandung dan menyusu masih tidak diketahui. Wanita yang mengandung dan menyusu perlu merujuk kepada doktor sebelum guna. Ubat ini boleh memasuki susu ibu maka ia tidak boleh diambil oleh wanita yang sedang menyusu kerana kerana bayi mungkin terdedah kepada kesan ubatnya.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda sedang mengambil mana-mana ubat berikut:

- ♦ Ubat untuk penyakit murung, termasuk *barbiturates*, ubat penenang dan arak. Pesakit yang sedang mengambil ubat kemurungan lain (cth: ubat sedatif, ubat penenang) tidak harus mengubati diri dengan antihistamin tanpa merujuk kepada doktor terlebih dahulu.

- ♦ Ubat '*monoamine oxidase (MAO) inhibitors*' yang diguna untuk merawat kemurungan dan penyakit *Parkinson*.

- ♦ Interaksi dengan ubat mungkin akan berlaku seperti ubat *betahistine*, sesetengah ubat hipnosis (ubat tidur) dan anxiolitik (keimbangan), ubat *metoclopramide* dan ubat antiparkinson.

Sila beritahu doktor dan ahli farmasi anda sekiranya anda sedang mengambil mana-mana ubat lain termasuklah tonik herbal, pelengkap tambahan dan ubat yang dibeli tanpa preskripsi.

Cara menggunakan Tridex Syrup

Guna ubat ini seperti yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda. Anda harus menyemak dengan doktor atau ahli farmasi sekiranya anda tidak pasti.

- Berapa banyak harus digunakan

Dos untuk dewasa dan kanak-kanak umur 12 dan ke atas: 10ml sirap, tiga kali sehari

Dos untuk kanak-kanak 6 hingga 12 tahun:

5ml sirap, tiga kali sehari

Dos untuk kanak-kanak 2 hingga 5 tahun :

2.5ml sirap, tiga kali sehari

- Bila perlu digunakan

Gunakan ubat ini sepertimana disarankan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Ubat ini harus diambil melalui mulut.

- Berapa lama perlu digunakan

Ubat ini perlu diteruskan penggunaannya sepertimana disarankan oleh doktor atau ahli farmasi anda tetapi tidak boleh melebihi dos yang disarankan.

- Jika terlupa menggunakan

- ◆ Sekiranya anda terlupa satu dos, ambil dos itu dengan segera sebaik sahaja teringat.
- ◆ Tetapi, sekiranya telah hampir masa untuk dos berikutnya, abaikan dos yang terlepas.
- ◆ Jangan mengambil dos berganda untuk menggantikan dos yang dilupa.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Simptom-simptom terlebih dos termasuklah depresi respiratori (susah nafas), mengantuk, hipotensi (tekanan darah rendah), psikosis paranoid (gangguan mental), khayalan, halusinasi, peningkatan debaran jantung, kegelisahan dan/atau sawan.

Dalam kes terlebih dos, sila mendapatkan rawatan di hospital yang terdekat dengan segera.

Semasa menggunakan Tridex Syrup

- Perkara yang perlu dilakukan
Hubungi doktor anda sekiranya gejala anda bertambah buruk atau tidak nampak sebarang kemajuan dalam tempoh seminggu ataupun disertai dengan demam tinggi.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan beri Tridex Syrup kepada sesiapa pun, walaupun mereka mempunyai gejala yang sama seperti anda. Doktor anda menpreskripsi Tridex Syrup untuk keadaan anda sahaja.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- ◆ Guna dengan berhati-hati pada pesakit yang mempunyai sawan, hipertrofi prostat (penyakit prostat), glaukoma (penyakit mata), penyakit hati, hipertensi (tekanan darah tinggi), penyakit jantung, kencing manis, hipertiroidisme (tiroid terlalu aktif), pesakit peptik ulser (penyakit gastrik), penyakit halangan pyloro-duodenal (penyakit perut) atau masalah

kencing kecuali atas nasihat doktor.

- ◆ Produk ini mungkin menyebabkan mengantuk dan pening. Pesakit yang mengalaminya perlu mengelakkan aktiviti seperti memandu atau mengendali mesin.
- ◆ Pesakit tidak harus mengambil arak bersama produk ini.
- ◆ Ubat ini tidak boleh digunakan untuk kanak-kanak berumur kurang daripada 2 tahun. Guna berhati-hati dan menurut nasihat doktor atau ahli farmasi untuk kanak-kanak yang berumur 2 hingga 6 tahun.

Kesan-kesan sampingan

Seperti kebanyakan ubat, Tridex Syrup juga mempunyai kesan sampingan walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Berikut adalah kesan sampingan yang mungkin terjadi:

- ◆ Pening, mengantuk, dan sembelit.
- ◆ Ketidakelesaan saluran gastro-usus.
- ◆ Hipertensi sementara, mulut kering, insomnia, kelesuan, debaran jantung, reaksi alahan seperti ruam, keketatan dada, rembesan bronkial bertambah lekit, toksik psikosis (sejenis psikosis yang berpunca daripada kesan toksik bahan kimia atau ubat-ubatan, termasuklah bahan kumuhan dari badan) dan dyscrasia darah (penyakit dalam darah, dimana kandungan darah mengandungi unsur sel abnormal yang kekal).

Sekiranya mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau anda mempunyai kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda was-was atau untuk maklumat selanjutnya.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui

laman web npra.gov.my [Consumers→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Tridex Syrup

- Cara penyimpanan

Jangan guna ubat ini selepas tarikh tamat tempoh yang dinyatakan pada bungkusan. Tarikh tamat tempoh merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

Produk ini seharusnya disimpan pada bungkusan asal dan di tempat kering.

Simpan di bawah suhu 30°C dan lindungi daripada cahaya.

Jauhi dari kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui sisa air atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda cara-cara pelupusan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Sirap berwarna jingga dengan perasa tutti-frutti.

Ia mengandungi 90ml sirap, diisi dalam botol plastik gelap.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

Setiap 5ml mengandungi bahan aktif:

- ◆ Triprolidine Hydrochloride 1.25mg
- ◆ Dextromethorphan Hydrobromide 15mg
- ◆ Pseudoephedrine Hydrochloride 30mg

- Bahan tidak aktif:

Alcohol (95%) 5% v/v, glycerin, larutan sorbitol 70%, citric acid hydrous, sodium citrate, sucralose, menthol, perasa tutti-frutti, sunset yellow FCF dan sodium benzoate 0.2% w/v sebagai pengawet.

- Nombor MAL:
MAL18016144AZ

**Pengilang dan Pemegang Produk
Pendaftaran**

Malaysian Pharmaceutical Industries
Sdn. Bhd.
Plot 14, Lebuhraya Kampung Jawa,
11900 Bayan Lepas, Penang,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

18/05/2022

Nombor Siri:

NPRA(R2/1)220512/885