

# GASCID Chewable Tablets

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Aluminium Hydroxide 250mg + Magnesium Trisilicate 250mg + Simethicone 25mg

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *GASCID*
2. Bagaimana *GASCID* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *GASCID*
4. Cara menggunakan *GASCID*
5. Semasa menggunakan *GASCID*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *GASCID*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

## Apakah kegunaan *GASCID*

*GASCID* mengandungi *Dried Aluminium Hydroxide*, *Magnesium Trisilicate* dan *Simethicone*. Ia digunakan untuk melegakan simptom ketidakhadaman (makanan), pedih ulu hati dan kembung perut.

## Bagaimana *GASCID* berfungsi

*Aluminium hydroxide* dan *magnesium trisilicate* adalah antasid, yang mengurangkan asid yang berlebihan dalam perut dan memberi kelegaan kepada simptom-simptom terlebih asid. *Simethicone* mengurangkan kehadiran angin dalam perut.

## Sebelum menggunakan *GASCID*

### -Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda hipersensitiviti kepada bahan-bahan kandungan produk ini.
- Jika anda mempunyai masalah yang teruk.
- Jika anda mempunyai penyakit kegagalan buah pinggang.
- Jika anda mempunyai masalah keturunan yang tidak ketara dalam intoleransi fruktosa, glukosa-galaktosa malabsorpsi atau kekurangan sucrase-isomaltase.

Jangan gunakan ubat ini jika mana-mana di atas mengalami kepada anda. Jika anda tidak pasti, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan *GASCID*.

## Kehamilan dan Penyusuan

*GASCID* hanya boleh digunakan selepas berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

### -Sebelum menggunakan *GASCID*

Sila pastikan anda memahami penerangan yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini.

### -Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil atau baru-baru mengambil sebarang ubat lain. Ini termasuk ubat-ubatan yang anda beli tanpa preskripsi, ubat herba, suplemen makanan atau vitamin. Ini adalah sangat penting jika anda mengambil salah satu ubat yang berikut:

- *tetracyclines*
- vitamin
- *ciprofloxacin*
- *ketoconazole*
- *hydroxychloroquine*
- *chloroquine*
- *chlorpromazine*
- *rifampicin*
- *cefдинir*
- *cefpodoxime*
- *levothyroxine*
- *rosuvastatin*
- *levothyroxine*
- *polystyrene sulphonate*

## Cara menggunakan *GASCID*

### -Berapa banyak harus digunakan

Ikuti semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan berhati-hati. Mereka mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan bantuan.

Dos yang disyorkan:

Dewasa (termasuk orang tua): 1-2 tablet dikunyah, empat kali sehari, diambil 20 minit hingga 1 jam

selepas makan dan pada waktu tidur, atau seperti yang diperlukan.

Kanak-kanak: Tidak disyorkan.

### -Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

### -Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan *GASCID* untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

### -Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

### -Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda (atau orang lain) secara tidak sengaja mengambil terlalu banyak *GASCID*, anda harus memberitahu doktor anda sekali atau hubungi jabatan kecemasan terdekat.

## Semasa menggunakan *GASCID*

### -Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan *GASCID*.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

### -Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.

# GASCID Chewable Tablets

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Aluminium Hydroxide 250mg + Magnesium Trisilicate 250mg + Simethicone 25mg

Jangan memberi *GASCID* kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

## -Perkara yang perlu diberi perhatian

### Memandu dan menggunakan mesin

Tiada data yang tersedia.

## **Kesan-kesan sampingan**

Seperti semua ubat, *GASCID* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda melihat sebarang kesan sampingan yang berikut:

- tindak balas hipersensitiviti, seperti pruritus, urtikaria, angioedema dan reaksi anaphylactic.
- cirit-birit
- sembelit
- sakit perut
- hipermagnesemia, termasuk pemerhatian selepas pentadbiran magnesium hidroksida yang berpanjangan kepada pesakit dengan kegagalan buah pinggang.
- hiperalbuminemia
- hipofosfatemia, dalam penggunaan yang berpanjangan atau pada dos yang tinggi atau bahkan dos biasa pada pesakit dengan diet rendah fosforus, yang boleh menyebabkan peningkatan penyerapan tulang, hiperkalciuria, osteomalacia.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npra.gov.my](http://npra.gov.my) [Consumers→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

## **Cara penyimpanan dan pelupusan *GASCID***

### -Penyimpanan

Simpan pada suhu tidak melebihi 30 ° C.

### -Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

## **Maklumat lanjut**

### -Rupa dan warna produk

Berwarna pink, bulat, rata, tidak bersalut, tablet boleh dikunyah, debos dengan "*GASCID*" di satu sisi dan kosong di sisi lain.

### -Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif  
*Dried Aluminium Hydroxide*  
*Magnesium Trisilicate*  
*Simethicone*
- Bahan tidak aktif  
*Mannitol*  
*Lactose Monohydrate*  
*Maize Starch*  
*Maize Starch*  
*Refined Sugar*  
*Sodium Methyl Paraben*  
*Sodium Propylparaben*  
*Colour Erythrosine Supra*  
*Aspartame*  
*Menthol*  
*Purified Talc*  
*Colloidal Anhydrous Silica*  
*Magnesium Stearate*  
*Essence peppermint*  
*Maize Starch*  
*Chloroform*  
*Purified Water*

### -Nombor MAL:

## **Pengilang**

XL LABORATORIES PVT. LTD.  
E-1223, Phase-I Extn., (Ghatal)  
RIICO Indl. Area,  
Bhiwadi-301019, Rajasthan, India

## **Pemegang Pendaftaran Produk**

Healol Pharmaceuticals Sdn. Bhd.  
No 74-3, Jalan Wangsa Delima 6,  
KLSC Wangsa Maju,  
53300 Kuala Lumpur, Malaysia.

## **Tarikh kemaskini RiMUP**

17/09/2020

## **Nombor siri**

NPRA (R2) 20/033