

Micromox Eye Drops

Moxifloxacin Ophthalmic Solution 0.5% w/v

Risalah Maklumat untuk Pengguna (RiMUP)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Micromox
2. Bagaimana Micromox berfungsi
3. Sebelum mengambil Micromox
4. Cara menggunakan Micromox
5. Semasa menggunakan Micromox
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Micromox
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Micromox

Titik mata moxifloxacin digunakan untuk rawatan jangkitan mata (konjunktivitis) apabila disebabkan oleh bakteria. Bahan aktif ialah moxifloxacin satu anti-infeksi mata.

Bagaimana Micromox berfungsi

Moxifloxacin, generasi keempat *fluoroquinolone*, menghalang DNA gyrase dan topoisomerase IV yang diperlukan untuk replikasi, pembaikan dan penggabungan semula DNA bakteria.

Sebelum mengambil Micromox

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan gunakan Moxifloxacin

- Jika anda alah (hipersensitif) terhadap moxifloxacin, *quinolone* lain, atau mana-mana daripada ramuan lain ubat ini.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil, baru-baru ini mengambil, atau mungkin mengambil ubat-ubatan lain, termasuk ubat-ubatan diperoleh tanpa preskripsi.

Cara menggunakan Micromox

Sentiasa gunakan ubat ini sama seperti doktor atau ahli farmasi anda memberitahu anda.

Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

-Berapa banyak harus digunakan

Dewasa, termasuk yang orang tua, dan kanak-kanak:

1 titik dalam mata terjejas

-Bila perlu digunakan

3 kali sehari (pada waktu pagi, petang dan waktu malam)

-Berapa lama perlu digunakan

4 hari

-Jika terlupa menggunakan

Sekiranya anda terlupa menggunakan ubat ini, teruskan dengan dos seterusnya seperti yang dirancang. Jangan gunakan dos berganda untuk menggantikan dos terlupa.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda menggunakan lebih banyak ubat daripada anda yang sepatutnya, bilas semuanya keluar dengan air suam.

Jangan letakkan sebarang titisan lanjut sehingga ia masa untuk dos biasa anda yang seterusnya.

Semasa menggunakan Micromox

-Perkara yang perlu dilakukan

Cuci tangan anda

- Putar dan keluarkan topi

- Selepas topi dikeluarkan, jika tamper kolar snap jelas longgar, keluarkan sebelum menggunakan produk

- Pegang botol, menunjuk ke bawah, antara ibu jari dan jari anda

- Condongkan balik kepala anda. Tarik ke bawah kelopak mata anda dengan jari yang bersih, sehingga satu 'poket' antara kelopak mata dan mata anda terwujud. Titik mata akan masuk ke sini

Bawa hujung botol dekat mata. Gunakan cermin jika ia membantu

- Jangan sentuh mata atau kelopak mata anda, kawasan sekitarnya atau permukaan lain dengan penitis itu. Ini boleh menjangkiti titik mata

- Perlahan-lahan tekan bahagian bawah botol untuk melepaskan satu titik ubat pada satu masa

Selepas menggunakan Moxifloxacin, tekan jari ke sudut mata anda, berhampiran dengan hidung selama 2

-3 minit. Ini membantu untuk menghentikan ubat masuk ke seluruh badan dan adalah penting dalam kanak-kanak kecil

Jika anda menggunakan titis di kedua-dua mata, basuh tangan anda sebelum anda mengulangi langkah untuk mata

anda yang lain. Ini akan membantu mencegah jangkitan dari satu mata kepada yang lain.

Tutup penutup botol dengan segera selepas digunakan.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jika anda secara tidak sengaja menelan Moxifloxacin hubungi doktor atau ahli farmasi anda untuk nasihat.

Jika anda menggunakan titisan mata yang lain, biarkannya sekurang-kurangnya 5 minit antara meletakkan Moxifloxacin dan titisan lain.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Sekiranya anda hamil atau menyusu, fikir anda mungkin hamil atau tengah merancang untuk mempunyai bayi, tanya doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan titis mata Moxifloxacin.

Memandu dan menggunakan mesin
Anda mungkin mendapati penglihatan anda kabur untuk masa yang singkat selepas anda menggunakannya Moxifloxacin. Jangan memandu atau gunakan mesin sehingga ini sudah berlalu.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat Moxifloxacin boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun tidak semua orang mendapat mereka.

Anda biasanya boleh terus mengambil titisan ini, kecuali kesannya serius atau jika anda mengalami reaksi alergi yang teruk.

Sekiranya anda mengalami alahan yang teruk reaksi dan mana-mana yang berikut berlaku, berhenti mengambil Moxifloxacin segera dan beritahu doktor anda segera: bengkak tangan, kaki, pergelangan kaki, muka, bibir, mulut atau tekak yang mana boleh menyebabkan kesukaran menelan atau bernafas, ruam atau gatal-gatal, lepuh besar dengan cecair, luka dan ulser.

Moxifloxacin terbukti selamat pada pesakit kanak-kanak, termasuk bayi baru lahir. Jenis dan keparahan reaksi buruk pada populasi pediatrik serupa dengan yang berlaku pada orang dewasa.

Kesan sampingan biasa

Kesan di mata: sakit mata, kerengsaan mata

Micromox Eye Drops

Moxifloxacin Ophthalmic Solution 0.5% w/v

Risalah Maklumat untuk Pengguna (RiMUP)

Kesan sampingan yang luar biasa

Kesan di mata: mata kering, mata gatal, kemerahan mata, keradangan atau parut pada permukaan mata, kepecahan saluran darah dalam mata, sensasi mata yang tidak normal, sensasi kelainan kelopak mata, gatal-gatal, kemerahan atau pembengkakan

Kesan sampingan umum: sakit kepala dan buruk rasa

Kesan sampingan yang jarang berlaku

Kesan di mata: gangguan kornea, penglihatan kabur atau kemerosotan penglihatan, keradangan atau jangkitan konjunktiva, ketegangan mata, bengkak mata

Kesan sampingan umum: muntah, ketidakselesaan hidung, perasaan ketul di dalam tekak, penurunan besi dalam darah, ujian darah hati tidak normal, sensasi kulit tidak normal, sakit, kerengsaan tekak

Tidak diketahui

Kesan di mata: jangkitan di mata, permukaan mata menjadi mendung, kornea bengkak, deposit pada permukaan mata, peningkatan tekanan pada mata, calar pada permukaan mata, alahan mata, pelepasan mata, peningkatan pengeluaran air mata, sensitiviti kepada cahaya

Kesan sampingan umum: sesak nafas, irama jantung yang tidak teratur, pening, peningkatan simptom alergi, gatal-gatal, ruam, kemerahan kulit, mual dan urticaria.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui atau laman web npa.moh.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan

-Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C sebelum dan selepas membuka botol.

Gunakan dalam tempoh 28 hari selepas membuka botol.

Jauhkan ubat ini daripada penglihatan dan jangkauan kanak-kanak.

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dinyatakan pada botol dan kad bod selepas 'Exp'. Tempoh tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan itu.

Ubat ini tidak memerlukan apa-apa syarat penyimpanan yang istimewa.

Berhenti menggunakan botol 4 minggu selepas pembukaan. Ini adalah untuk mengelakkan jangkitan.

-Pelupusan

Jangan buang ubat-ubatan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana membuang ubat-ubatan yang tidak lagi digunakan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi persekitaran.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Larutan yang jelas, hijau-kuning bebas dari partikel.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Moxifloxacin Hydrochloride

- Bahan tidak aktif

Boric Acid, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Hydrochloric Acid

-Nombor MAL

MAL*****

Pengilang

MICRO LABS LIMITED,

Plot No. 113-116, Phase IV, KIADB Industrial Area, Bommasandra Bangalore, 560 099. INDIA

Pemegang Pendaftaran Produk

Healol Pharmaceuticals Sdn Bhd

74-3, Jalan Wangsa Delima 6, KLSC Wangsa Maju, 53300 Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

06/04/2021

Nombor Siri

NPRA (R2) 20/128