

CLOTRISURE (CLOTRIMAZOLE 1% CREAM)

Clotrimazole BP 1% w/w

Risalah Maklumat untuk Pengguna (RiMUP)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan CLOTRISURE
2. Bagaimana CLOTRISURE berfungsi
3. Sebelum mengambil CLOTRISURE
4. Cara menggunakan CLOTRISURE
5. Semasa menggunakan CLOTRISURE
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan CLOTRISURE
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan CLOTRISURE

Bahan aktif adalah clotrimazole.

Clotrimazole tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai imidazoles dan merupakan antikulat yang melawan jangkitan kulat pada kulit.

Clotrimazole digunakan untuk merawat jangkitan kulit kulat seperti kurap, kaki atlet, ruam popok dan ruam peluh. Ia juga digunakan untuk meredakan kerengsaan vulva (sariawan luaran) atau hujung zakar, yang mungkin dikaitkan dengan sariawan.

Bagaimana CLOTRISURE berfungsi

Apabila Clotrimazole digunakan pada kawasan kulit yang dijangkiti, ia berfungsi dengan memusnahkan kulat atau yis yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum mengambil CLOTRISURE

-Bila tidak boleh mengambil

jika anda (atau bayi anda jika merawat ruam popok) alah kepada

clotrimazole atau mana-mana ramuan lain dari ubat ini

-Sebelum mula mengambil

Pastikan anda (atau bayi anda) tiada alahan kepada clotrimazole atau mana-mana ramuan lain dalam ubat ini

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau baru-baru ini mengambil ubat lain, termasuk ubat diperoleh tanpa preskripsi.

Clotrimazole diketahui tidak berinteraksi dengan ubat-ubatan lain

Seperti krim lain, Clotrimazole dapat mengurangkan keberkesanan kontraseptif getah, seperti kondom atau diafragma.

Oleh itu, jika anda menggunakan krim ini pada vulva atau zakar, anda harus menggunakan langkah berjaga-jaga alternatif sekurang-kurangnya lima hari selepas menggunakan produk ini.

Cara menggunakan CLOTRISURE

-Bila perlu digunakan

Sentiasa gunakan ubat ini seperti yang dijelaskan dalam risalah ini atau seperti yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda. Tanyakan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Sekiranya anda membeli produk ini tanpa preskripsi, sila ikuti arahan berikut.

- Sebelum digunakan, tusuk penutup tiub dengan membalikkan penutup pada hujung tiub dan tekan.

- Sekiranya kaki dijangkiti, mereka seharusnya dibasuh dan dikeringkan dengan bersih, terutama di antara jari kaki, sebelum menggunakan krim.

- Sapukan Clotrimazole krim dengan nipis dan rata pada kawasan yang dijangkiti, 2-3 kali sehari.

- Sejalur krim (panjang ½ cm) sudah cukup untuk merawat kawasan yang seukuran tangan.

- Tempoh rawatan bergantung pada jenis jangkitan. Gunakan krim sekurang-kurangnya dua minggu untuk jangkitan candida (thrush) atau sekurang-kurangnya satu bulan untuk jangkitan lain.

- Sekiranya anda mempunyai kaki atlet, boleh juga menggunakan serbuk debu antikulat. Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mengesyorkannya.

-Berapa lama perlu digunakan

Jangan berhenti menggunakan Clotrimazole secara tiba-tiba kerana ini boleh menyebabkan gejala jangkitan kembali.

-Jika terlupa menggunakan

Sapukan krim secepat mungkin, kemudian teruskan rawatan anda seperti biasa.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Seperti semua ubat, sesetengah orang mungkin alah pada krim. Sekiranya anda atau bayi anda alah, reaksi akan berlaku berlaku sebaik sahaja anda mula menggunakannya. Sekiranya anda atau bayi anda mengalami reaksi alahan, hentikan penggunaan Clotrimazole dan beritahu doktor anda dengan segera atau hubungi Jabatan Kemalangan dan Kecemasan hospital terdekat anda. Tanda-tanda reaksi alahan mungkin termasuk:

- Ruam
- Masalah menelan atau bernafas
- Pembengkakan bibir, muka, tekak atau lidah
- Kelemahan, rasa pening atau pengsan
- Loya

Selepas anda menggunakan krim anda mungkin mengalami:

CLOTRISURE (CLOTRIMAZOLE 1% CREAM)

Risalah Maklumat untuk Pengguna (RiMUP)

Clotrimazole BP 1% w/w

• Gatal, ruam, lepuh, terbakar, tidak selesa, bengkak, kerengsaan, kemerahan atau pengelupasan kulit. Ini mungkin bermaksud anda alah pada krim.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan

-Penyimpanan

Jauhkan ubat ini dari pandangan dan jangkauan kanak-kanak.

Simpan di tempat kering yang sejuk.

-Pelupusan

Jangan gunakan krim ini selepas tarikh luput. Tarikh luput merujuk pada yang terakhir hari bulan itu.

Jangan buang ubat ke dalam air sisa atau sampah rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana membuang ubat yang tidak lagi anda gunakan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Clotrimazole Cream 1% adalah krim putih dan terdapat dalam tiub 20g.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
- Bahan aktif adalah clotrimazole. Setiap gram krim mengandungi 10 mg clotrimazole BP (iaitu 1% w/w).
- Bahan tidak aktif
- Bahan lain adalah benzyl alcohol, polysorbate 60, cetyl esters wax, cetostearyl alcohol, octyldodecanol, sorbitan monostearate and purified water.

-Nombor MAL

MALxxxxxxxxxx

Pengilang

ICPA Health Products Ltd,
286/287/288-GIDC, Ankleshwar-
393002, Gujarat, India.Email-

Pemegang Pendaftaran Produk

Healol Pharmaceuticals Sdn Bhd
74-3, Jalan Wangsa Delima 6,
KLSC Wangsa Maju,
53300, Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

15/08/2022

Nombor Siri

NPRA (R2) 22/045