

MUODERM

Mupirocin 2% w/w Ointment

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Muoderm Ointment
2. Bagaimana Muoderm Ointment berfungsi
3. Sebelum mengambil Muoderm Ointment
4. Cara menggunakan Muoderm Ointment
5. Semasa menggunakan Muoderm Ointment
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Muoderm Ointment
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Muoderm Ointment

Muoderm (hanya disebut Muoderm Ointment sepanjang risalah ini) adalah antibiotik. Ia digunakan untuk membunuh bakteria pada jangkitan kulit seperti impetigo (yang mungkin muncul sebagai goresan kecil atau gatal ekzema), folikulitis (pembengkakan kulit di sekitar akar rambut) dan bisul. Muoderm Ointment hanya untuk kegunaan luaran pada kulit anda sahaja.

Bagaimana Muoderm Ointment berfungsi

Muoderm (hanya disebut Muoderm Ointment sepanjang risalah ini) adalah antibiotik. Ia digunakan untuk membunuh bakteria pada jangkitan kulit seperti impetigo (yang mungkin muncul sebagai goresan kecil atau gatal ekzema), folikulitis (pembengkakan kulit di sekitar akar rambut) dan bisul. Muoderm Ointment hanya untuk kegunaan luaran pada kulit anda sahaja.

Sebelum mengambil Muoderm Ointment

-Bila tidak boleh mengambil

Sebelum menggunakan Muoderm Ointment

• jika anda alah kepada Mupirocin atau mana-mana ramuan lain dari ubat ini

• untuk merawat jangkitan pada hidung anda

• untuk merawat jangkitan pada mata anda

• di sekitar tapak kanula intravena ("tetes").

Gejala tindak balas alergi mungkin termasuk ruam kulit yang merah dan kental, sukar bernafas, bengkak muka, mulut, bibir atau kelopak mata, suhu tinggi (demam) yang tidak dapat dijelaskan dan merasa pingsan. Sekiranya bengkak mempengaruhi tekak anda dan membuat sukar bernafas dan menelan, segera ke hospital

-Sebelum mula mengambil

Bercakap dengan doktor, ahli farmasi atau jururawat anda sebelum menggunakan Muoderm Ointment

• jika anda mempunyai masalah dengan buah pinggang anda

• jika anda mempunyai luka terbuka atau kulit yang rosak.

Sekiranya anda menggunakan Muoderm Ointment untuk jangka masa yang panjang, anda mungkin mengalami sariawan (jangkitan yis). Sekiranya ini berlaku, beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Tidak ada interaksi yang diketahui dengan ubat lain. Beritahu doktor, ahli farmasi atau jururawat anda jika anda menggunakan, baru-baru ini menggunakan atau mungkin menggunakan ubat lain.

Cara menggunakan Muoderm Ointment

-Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa gunakan ubat ini sama seperti yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda. Tanyakan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Untuk kegunaan kulit sahaja

• jangan mencampurkan Muoderm Ointment dengan krim atau salap lain di kawasan yang dijangkiti kulit anda, kerana ini boleh mengurangkan keberkesanan Muoderm Ointment

• jika anda menggunakan Muoderm Ointment di wajah anda, anda harus berhati-hati agar tidak terkena mata atau hidung anda.

Sekiranya anda tidak sengaja mendapati Muoderm Ointment di mata anda, basuh dengan air bersih dan hubungi anda doktor atau hospital terdekat Kemalangan dan Kecemasan Jabatan segera

• basuh dan keringkan tangan anda sebelum, dan selepas, anda gunakan Muoderm Ointment.

-Bila perlu digunakan

Orang dewasa, warga tua dan kanak-kanak

• gunakan pada kawasan kulit yang dijangkiti hingga tiga kali sehari

• anda boleh menutup kawasan yang dijangkiti dengan plaster atau pembalut yang sesuai, kecuali jika doktor memberitahu anda untuk membiarkannya tidak ditutup.

• pasang semula penutup pada tiub dan basuh tangan anda

• gunakan Muoderm Ointment selama yang diberitahu oleh doktor anda. Bakteria biasanya dibersihkan dari kulit anda dalam masa 10 hari memulakan rawatan. Jangan gunakan lebih dari 10 hari. Sekiranya gejala anda berterusan, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda

• buang salap yang tersisa.

-Berapa lama perlu digunakan

Sekiranya anda berhenti menggunakan Muoderm Ointment terlalu awal, tidak semua bakteria, yang menyebabkan jangkitan kulit anda terbunuh, dan jangkitan anda mungkin akan kembali. Tanya doktor ahli farmasi atau jururawat anda bila untuk berhenti menggunakan salap.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lebih lanjut mengenai

MUODERM

Mupirocin 2% w/w Ointment

penggunaan ubat ini, tanyakan kepada doktor, ahli farmasi atau jururawat anda.

-Jika terlupa menggunakan

- jangan risau, gunakan salap apabila anda ingat dan teruskan seperti biasa. Sekiranya dos seterusnya anda jatuh tempoh dalam satu jam, langkakan dos yang terlepas. Jangan gunakan dua kali ganda jumlahnya untuk menebus jumlah yang terlepas.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

- jika anda menggunakan lebih banyak Muoderm Ointment daripada yang ditetapkan oleh doktor anda, beritahu doktor, ahli farmasi atau jururawat anda

- jika anda atau kanak-kanak secara tidak sengaja menelan Muoderm Ointment, anda harus menghubungi doktor atau hospital terdekat Jabatan Kemalangan dan Kecemasan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Sangat jarang berlaku (boleh mempengaruhi sehingga 1 dari 10,000 orang)

Sekiranya anda mempunyai kesan sampingan yang sangat jarang berikut semasa menggunakan ubat anda, bilas produk dari kulit anda dan beritahu doktor anda dengan segera atau segera ke hospital:

- reaksi alergi yang teruk yang mungkin termasuk ruam kulit yang merah dan kental, sukar bernafas, bengkak muka, mulut, bibir atau kelopak mata, suhu tinggi (demam) dan perasaan pengsan yang tidak dapat dijelaskan. Sekiranya bengkak mempengaruhi tekak anda dan sukar bernafas dan menelan, segera pergi ke hospital

- radang usus besar (usus besar), menyebabkan cirit-birit, biasanya dengan darah dan lendir, sakit perut, demam (kolitis pseudomembran).

Biasa (boleh mempengaruhi sehingga 1 dari 10 orang)

- sensasi terbakar di mana anda telah menggunakan salap.

Tidak biasa (boleh mempengaruhi sehingga 1 dari 100 orang)

- gatal, kemerahan, menyengat dan kering di mana anda berada memakai salap

- ruam alergi, kemerahan atau sakit kulit pada wajah, tangan atau badan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nptra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan

-Penyimpanan

Jauhkan ubat ini dari pandangan dan jangkauan kanak-kanak. Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dinyatakan pada kad bod selepas EXP:. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan itu.

Jangan simpan di atas 30°C. Jangan bekukan, gantikan penutup dengan ketat selepas digunakan.

-Pelupusan

Jangan gunakan ubat ini jika anda melihat tanda-tanda kerosakan atau kerosakan pada tiub atau produk. Kembalikan kepada ahli farmasi anda.

Jangan buang ubat-ubatan melalui air buangan atau sampah isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana membuang ubat yang tidak lagi anda gunakan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Muoderm Ointment adalah salap putih atau hampir putih.

Setiap tiub Muoderm Ointment mengandungi 15g salap.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
- bahan aktifnya adalah mupirocin. Setiap gram salap mengandungi 20mg mupirocin
- Bahan tidak aktif
Macrogol 400 and Macrogol 3350

-Nombor MAL

MAL23036019AZ

Pengilang

ICPA Health Products Ltd,
286/287/288-GIDC, Ankleshwar-
393002, Gujarat, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

Healol Pharmaceuticals Sdn Bhd

74-3, Jalan Wangsa Delima 6, KLSC
Wangsa Maju, 53300, Kuala Lumpur,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

03/09/2025

Nombor Siri

NPRA(R2)22/080