

CLOTRILIN (CLOTRIMAZOLE CREAM BP 1% W/W)

Clotrimazole (1 %w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan CLOTRILIN (CLOTRIMAZOLE CREAM BP 1% W/W)
2. Bagaimana CLOTRILIN (CLOTRIMAZOLE CREAM BP 1% W/W) berfungsi
3. Sebelum mengambil CLOTRILIN (CLOTRIMAZOLE CREAM BP 1% W/W)
4. Cara menggunakan CLOTRILIN (CLOTRIMAZOLE CREAM BP 1% W/W)
5. Semasa menggunakan CLOTRILIN (CLOTRIMAZOLE CREAM BP 1% W/W)
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan CLOTRILIN (CLOTRIMAZOLE CREAM BP 1% W/W)
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan CLOTRILIN (CLOTRIMAZOLE CREAM BP 1% W/W)

Bahan aktif adalah *clotrimazole*. *Clotrimazole* tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai imidazoles dan merupakan antikulat yang melawan jangkitan kulat pada kulit.

Clotrimazole digunakan untuk merawat jangkitan kulit kulat seperti kurap, kaki atlet, ruam lampin dan ruam peluh. Ia juga digunakan untuk meredakan kerengsaan vulva (seriawan luaran) atau hujung zakar, yang mungkin dikaitkan dengan seriawan.

Bagaimana CLOTRILIN (CLOTRIMAZOLE CREAM BP 1% W/W) berfungsi

Apabila *Clotrimazole* digunakan pada kawasan kulit yang dijangkiti, ia berfungsi dengan memusnahkan kulat atau yis yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum mengambil CLOTRILIN (CLOTRIMAZOLE CREAM BP 1% W/W)

-Bila tidak boleh mengambil

jika anda (atau bayi anda jika merawat ruam lampin) alah kepada *clotrimazole* atau mana-mana ramuan lain dari ubat ini

-Sebelum mula mengambil

Pastikan anda (atau bayi anda) tiada alahan kepada *clotrimazole* atau mana-mana ramuan lain dalam ubat ini

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau baru-baru ini mengambil ubat lain, termasuk ubat diperoleh tanpa preskripsi.

Clotrimazole diketahui tidak berinteraksi dengan ubat-ubatan lain

Seperti krim lain, *Clotrimazole* dapat mengurangkan keberkesanan kontraseptif getah, seperti kondom atau diafragma.

Oleh itu, jika anda menggunakan krim ini pada vulva atau zakar, anda harus menggunakan langkah berjaga-jaga alternatif sekurang-kurangnya lima hari selepas menggunakan produk ini.

Cara menggunakan CLOTRILIN (CLOTRIMAZOLE CREAM BP 1% W/W)

-Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa gunakan ubat ini seperti yang dijelaskan dalam risalah ini atau seperti yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda. Tanyakan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Sekiranya anda membeli produk ini tanpa preskripsi, sila ikuti arahan berikut.

- Sebelum digunakan, tusuk penutup tiub dengan membalikkan penutup pada hujung tiub dan tekan.
- Sekiranya kaki dijangkiti, mereka seharusnya dibasuh dan dikeringkan dengan bersih, terutama di antara jari kaki, sebelum menggunakan krim.
- Sapukan *Clotrimazole* krim dengan nipis dan rata pada kawasan yang dijangkiti, 2-3 kali sehari.
- Sejalur krim (panjang ½ cm) sudah cukup untuk merawat kawasan yang seukuran tangan.
- Tempoh rawatan bergantung pada jenis jangkitan. Gunakan krim sekurang-kurangnya dua minggu untuk jangkitan candida (thrush) atau sekurang-kurangnya satu bulan untuk jangkitan lain.
- Sekiranya anda mempunyai kaki atlet, boleh juga menggunakan serbuk debu antikulat. Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mengesyorkannya.

-Bila perlu digunakan

Sentiasa gunakan ubat ini seperti yang dijelaskan dalam risalah ini atau seperti yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda. Tanyakan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

-Berapa lama perlu digunakan

Jangan berhenti menggunakan *Clotrimazole* secara tiba-tiba kerana ini boleh menyebabkan gejala jangkitan kembali.

-Jika terlupa menggunakan

Sapukan krim secepat mungkin, kemudian teruskan rawatan anda seperti biasa.

-Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

CLOTRILIN (CLOTRIMAZOLE CREAM BP 1% W/W)

Clotrimazole (1 %w/w)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Gejala terlebih dos seperti pening, loya, atau muntah mungkin berlaku.

Semasa menggunakan CLOTRILIN (CLOTRIMAZOLE CREAM BP 1% W/W)

-Perkara yang perlu dilakukan

- Guna ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan CLOTRILIN (CLOTRIMAZOLE CREAM BP 1% W/W).
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.
- Hubungi doktor anda jika gejala anda bertambah teruk atau tiada perubahan selepas 4 minggu rawatan.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan memberi CLOTRILIN (CLOTRIMAZOLE CREAM BP 1% W/W) kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Untuk kegunaan luar. Jangan menelannya.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Seperti semua ubat, sesetengah orang mungkin alah pada krim. Sekiranya anda atau bayi anda alah, reaksi akan berlaku berlaku sebaik sahaja anda mula menggunakannya. Sekiranya anda atau bayi anda mengalami reaksi alahan, hentikan penggunaan Clotrimazole dan beritahu doktor anda dengan segera atau hubungi Jabatan Kemalangan dan Kecemasan hospital terdekat anda. Tanda-tanda reaksi alahan mungkin termasuk:

- Ruam
- Masalah menelan atau bernafas
- Pembengkakan bibir, muka, tekak atau lidah
- Kelemahan, rasa pening atau pengsan
- Loya

Selepas anda menggunakan krim anda mungkin mengalami:

- Gatal, ruam, lepuh, terbakar, tidak selesa, bengkak, kerengsaan, kemerahan atau pengelupasan kulit. Ini mungkin bermaksud anda alah pada krim.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan

-Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya. Jangan beku.

-Pelupusan

Jangan gunakan krim ini selepas tarikh luput. Tarikh luput merujuk pada yang terakhir hari bulan itu.

Jangan buang ubat ke dalam air sisa atau sampah rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana membuang ubat yang tidak lagi anda gunakan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Clotrimazole Cream 1% adalah krim putih dan terdapat dalam tiub 15g.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Clotrimazole BP
- Bahan tidak aktif
Methyl Hydroxy benzoate BP,
Propyl Hydroxy benzoate BP, Cetosteryl Alcohol, Cetomacrogol 1000, Light Liquid Paraffin BP, White Soft Paraffin BP, Phosphoric Acid BP, Sodium Hydroxide BP, Purified Water BP

-Nombor MAL

MAL24096075XZ

Pengilang

Lincoln Pharmaceuticals Ltd.,
Trimul Estate, Khatraj, Tal-Kalol
382721 Gandhinagar, Gujarat, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

Healol Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
74, 74-1, 74-2, 74-3, Pusat Bandar
Wangsa Maju, Jalan Wangsa Delima 6
(1/27F), Seksyen 5 Wangsa Maju,
53300 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

-11/09/2026

Nombor Siri

NPRA (R2) 23/232