

GASCID SUSPENSION

Sodium Alginate 500 mg/10 ml, Sodium Bicarbonate 213 mg/ 10 ml, Calcium Carbonate 325 mg/ 10 ml

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan GASCID
2. Bagaimana GASCID berfungsi
3. Sebelum mengambil GASCID
4. Cara menggunakan GASCID
5. Semasa menggunakan GASCID
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan GASCID
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan GASCID

GASCID digunakan untuk refluks gastro-esophageal seperti regurgitasi asid, pedih ulu hati dan senak dan untuk gejala perut berlebihan

Bagaimana GASCID berfungsi

GASCID ialah gabungan dua antasid (kalsium karbonat dan natrium bikarbonat) dan alginat dan berfungsi dalam dua cara.

- 1) Meneutralkan asid perut yang berlebihan untuk melegakan kesakitan dan ketidakselesaan.
- 2) Membentuk asid pelindung (*hyperacidity*).

Sebelum mengambil GASCID

-Bila tidak boleh mengambil

Jika anda alah kepada mana-mana ramuan (lihat senarai ramuan penuh)

-Sebelum mula mengambil

Berhati-hati sebelum rawatan dengan GASCID

Sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda,

- Jika anda menderita atau mengalami penyakit buah pinggang atau jantung yang ketara, kerana garam tertentu boleh mengganggu penyakit ini.

- Jika anda adalah pesakit Hiperkalsemia, efrokalsinosis atau

kalsium berulang yang mengandungi batu ginjal

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Oleh kerana kehadiran kalsium dan karbonat yang bertindak sebagai antasid, selang masa 2 jam harus dipertimbangkan antara pengambilan produk ini dan pengambilan produk perubatan lain, terutamanya *H2-antihistaminics*, *tetracyclines*, *digoxine*, *fluoroquinolones*, garam besi, hormon tiroid, *ketoconazole*, neuroleptik, *thyroxine*, *penicillamine*, penyekat beta (*atenolol*, *metoprolol*, *propranolol*), *glucocorticoid*, *chloroquine*, *diphosphonates*, dan *estramustine*.

Cara menggunakan GASCID

-Berapa banyak harus digunakan

Untuk pengambilan secara mulut

Dewasa dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas : ambil 1~2 kantung (10~20mL), 4 kali sehari (selepas makan dan sebelum tidur)

GASCID hanya boleh diambil atas nasihat perubatan doktor untuk kanak-kanak di bawah umur 12 tahun.

Mengambil dos kalsium karbonat yang besar setiap hari untuk tempoh yang berpanjangan boleh menyebabkan tahap kalsium yang tinggi dalam darah.

-Bila perlu digunakan

4 kali sehari (selepas makan dan sebelum tidur)

-Berapa lama perlu digunakan

Rujuk doktor anda jika gejala berterusan, atau rawatan diperlukan selama lebih daripada tujuh hari secara berterusan

-Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda mengingatinya. Walau bagaimanapun, jika hampir tiba masanya untuk dos seterusnya, langkau dos yang terlepas dan teruskan jadual dos biasa anda. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya berlaku terlebih dos, langkah-langkah simptomatik dan sokongan am ditunjukkan seperti yang diperlukan.

Semasa menggunakan GASCID

-Perkara yang perlu dilakukan

Sekiranya berlaku terlebih dos rawatan simptomatik perlu diberikan.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil produk ini dalam masa dua jam selepas mengambil ubat lain, kerana ia boleh mengganggu tindakan beberapa ubat lain. (terutama *H2-antihistaminics*, *tetracyclines*, *digoxine*, *fluoroquinolones*, garam besi, hormon tiroid, *ketoconazole*, neuroleptics, *thyroxine*, *penicillamine*, penyekat beta (*atenolol*, *metoprolol*, *propranolol*), *glucocorticoid*, *chloroquine*, dan *diphosphonates*)

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Anda boleh mengambil produk ini jika anda hamil atau menyusui. Seperti semua ubat, tempoh rawatan harus dihadkan sebanyak mungkin.

Kesan-kesan sampingan

- Sangat jarang (kurang daripada 1 dalam 10,000 pesakit yang dirawat) terdapat kemungkinan tindak balas alahan seperti Pruritus(Gatal-gatal), bronkokonstriksi, atau tindak balas anafilaksis.

- Jika mengambil dos kalsium karbonat yang besar, Alkalosis, pemulihan asid, Hiperkalsemia, Sindrom Susu-alkali dan Sembelit (ini berlaku mengambil produk melebihi dos yang disyorkan)

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

GASCID SUSPENSION

Sodium Alginate 500 mg/10 ml, Sodium Bicarbonate 213 mg/ 10 ml, Calcium Carbonate 325 mg/ 10 ml

Cara penyimpanan dan pelupusan

-Penyimpanan

- Jauhkan ubat ini daripada pandangan dan capaian kanak-kanak.
- Simpan di bawah 30°C (jangka hayat 36 bulan)
- Simpan dalam bungkusan asal.

-Pelupusan

Sebarang produk perubatan atau bahan buangan yang tidak digunakan hendaklah dilupuskan mengikut keperluan tempatan.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

GASCID adalah suspensi oral berwarna kuning pucat hingga krim dengan rasa pudina dan ia dibungkus kantung aluminium.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
 - Sodium Alginate*
 - Sodium Bicarbonate*
 - Calcium Carbonate*
- Bahan tidak aktif
 - D-Sorbitol Solution,*
 - Saccharin Sodium Hydrate,*
 - Enzymatically Modified*
 - Stevia, Steviol glucoside,*
 - Carbomer 934P, Sodium*
 - Hydroxide, Methylparaben,*
 - Propylparaben, Citrus*
 - flavor 91069, Peppermint*
 - Oil, Purified Water*

-Nombor MAL

MALXXXXXXXXX

Pengilang

GENUONE SCIENCES Inc.

245 Sandangil, Jeoneui-myeon,
Sejong-si, Republic of Korea

Pemegang Pendaftaran Produk

Healol Pharmaceuticals Sdn Bhd
74-3, Jalan Wangsa Delima 6,
KLSC Wangsa Maju,
53300 Kuala Lumpur.

Tarikh kemaskini RiMUP

29/04/2026

Nombor Siri

NPRA (R2) 26/072