

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Venafix DS
2. Bagaimana Venafix DS berfungsi
3. Sebelum menggunakan Venafix DS
4. Cara menggunakan Venafix DS
5. Semasa menggunakan Venafix DS
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Venafix DS
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Venafix DS

Ia disyorkan untuk:

-merawat simptom-simptom seperti kaki berasa berat, sakit, perasaan kaki tidak selesa pada awal pagi akibat penyakit vena kronik

-merawat simptom-simptom akibat serangan haemorrhoidal akut.

Jika masalah haemorrhoidal berterusan lebih dari 15 hari, ia adalah penting anda berjumpa dengan doktor anda.

Bagaimana Venafix DS berfungsi

Ubat ini adalah *venotonic* (ia meningkatkan *venous tone*) dan *vasculoprotector* (ia meningkatkan rintangan dalam saluran darah kecil).

Sebelum menggunakan Venafix DS

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengguna Venafix DS:

Jika anda alah (hipersensitif) kepada *diosmin* dan *hesperidin*, atau mana-mana bahan lain dalam ubat (tersenarai di *Bahan-bahan kandungan*).

-Sebelum menggunakan Venafix DS

Amaran dan langkah berjaga-jaga:

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengguna ubat ini.

-Jika mengguna ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil, baru-baru ini mengambil atau akan mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi.

Mengandung dan menyusukan anak

Jika anda mengandung atau menyusukan anak, fikir anda mungkin mengandung atau merancang untuk mengandung, sila tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil ubat ini.

Mengandung

Sebagai langkah berjaga-jaga, ia adalah lebih baik untuk mengelak penggunaan Venafix DS semasa kehamilan.

Menyusukan anak

Menyusukan anak tidak digalakkan untuk tempoh rawatan, kerana tiada data tentang ekskresi ubat ini ke dalam susu ibu.

Cara menggunakan Venafix DS

-Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa mengguna Venafix DS seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Semak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

-Bila perlu digunakan

-*Kekurangan Venolymphatic*
Dos biasa adalah 1 tablet setiap hari, pada waktu pagi, semasa bersarapan.

-*Serangan haemorrhoidal akut*
Dos biasa adalah 3 tablet setiap hari (dalam 3 dos berasingan) selama 4 hari dan kemudian 2 tablet setiap hari

(dalam 2 dos berasingan) untuk 3 hari berikutnya, pada waktu makan.

Menelan tablet dengan jumlah air yang mencukupi.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengguna Venafix DS selama doktor anda mengesyorkan.

-Jika terlupa menggunakan

Jangan mengambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa.

Jika anda mempunyai sebarang soalan lanjut mengenai penggunaan ubat ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

-Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jika anda telah mengambil berlebihan Venafix DS daripada yang diarahkan, hubungi doktor atau ahli farmasi anda dengan segera. Pengalaman dos terlebih dengan Venafix DS adalah terhad, tetapi adalah dilaporkan simptom-simptom seperti cirit-birit, mual, sakit perut, pruritus dan ruam.

Semasa menggunakan Venafix DS

-Perkara yang perlu dilakukan

Sentiasa mengguna ubat ini seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengguna Venafix DS.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Ubat ini telah dipreskripsikan untuk anda. Jangan memberi ubat ini kepada orang lain. Ia boleh membahayakan mereka, walaupun simptom-simptom mereka adalah sama seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika mana-mana kesan sampingan bertambah teruk atau berterusan, atau jika anda mengalami kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi.

Venafix DS

Diosmin 900mg and Hesperidin 100mg Tablets

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Venafix DS boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang akan mengalaminya.

Frekuensi kesan-kesan sampingan yang tertera di bawah ditakrifkan mengikut system berikut:

- sangat biasa (boleh menjejaskan lebih daripada 1 dalam 10 orang)
- biasa (boleh menjejaskan 1 sehingga 10 dalam 100 orang)
- luar biasa (boleh menjejaskan 1 sehingga 10 dalam 1000 orang)
- jarang (boleh menjejaskan 1 sehingga 10 dalam 10,000 orang)
- sangat jarang (menjejaskan kurang daripada 1 dalam 10,000 orang)
- frekuensi tidak diketahui (tidak boleh dianggarkan dari data yang sedia ada)

Mereka mungkin termasuk:

Biasa: cirit-birit, dispepsia (pencernaan yang sukar), rasa loya, muntah-muntah.

Luar biasa: *colitis* (keradangan usus besar).

Jarang: rasa pening, sakit kepala, kelesuan, ruam, *pruritus*, *urticaria*.

Frekuensi tidak diketahui: sakit perut, edema (kebengkakan) muka bibir, kelopak mata. *Exceptionally: Quincke's* edema (kebengkakan muka, bibir, mulut, lidah atau tekak yang boleh menyebabkan kesesakan nafas).

Melaporkan kesan sampingan

Jika anda mendapat sebarang kesan sampingan, berbincanglah dengan doktor atau ahli farmasi anda. Ini termasuklah sebarang kesan sampingan yang mungkin tidak disenaraikan di dalam risalah ini. Anda juga boleh melaporkan kesan sampingan melalui sistem pelaporan kebangsaan. Dengan melaporkan kesan sampingan anda boleh

membantu memberi maklumat mengenai keselamatan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF or Vaccines (AEFI))*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Venafix DS

-Penyimpanan

Simpan pada suhu tidak melebihi 30°C.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Berwarna coklat muda, berbentuk bujur, dwicembung, tablet bersalut filem diberi skor di satu sisi & kosong di sisi lain.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Diosmin
Hesperidin
- Bahan tidak aktif
Microcrystalline Cellulose
Povidone (PVPK-30)
Purified Water
Sodium starch glycolate (Type A)
Croscarmellose sodium
Sodium Lauryl Sulphate
Magnesium Stearate

Salut filem:
Hypromellose
PEG 6000 (Macrogol 6000)
Titanium Dioxide
Purified Talc

Colour Iron Oxide Red
Colour Iron Oxide Yellow
Purified Water

-MAL nombor

Pengilang

XL Laboratories Pvt. Ltd.
E-1223, Phase-I Extn., (Ghatal)
RIICO Indl. Area, Bhiwadi-301019,
Rajasthan, India

Pemegang Pendaftaran Produk

Healol Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
74-3, Jalan Wangsa Delima 6,
KLSC Wangsa Maju,
53300 Kuala Lumpur,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

-08/08/2025

Nombor siri

NPRA (R2) 25/129