

M-KAST 4 (Montelukast Chewable Tablets 4mg)

M-KAST 5 (Montelukast Chewable Tablets 5mg)

Montelukast sodium sebagai Montelukast 4mg, Montelukast sodium sebagai Montelukast 5mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan M-KAST
2. Bagaimana M-KAST berfungsi
3. Sebelum mengambil M-KAST
4. Cara menggunakan M-KAST
5. Semasa menggunakan M-KAST
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan M-KAST
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan M-KAST

M-KAST digunakan untuk mencegah dan merawat penyakit lelah kronik pada dewasa dan kanak-kanak berumur 12 bulan keatas.

Ia juga boleh digunakan oleh dewasa dan kanak-kanak berumur 2 tahun keatas untuk melegakan gejala pagi dan malam disebabkan *rhinitis* alahan bermusim.

Bagaimana M-KAST berfungsi

Montelukast ialah bahan aktif dalam M-KAST. Ia mengikat pada reseptor yang khas dijumpai di saluran pernafasan untuk mencegah gejala lelah dan *rhinitis* alahan bermusim.

Sebelum mengambil M-KAST

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan gunakan M-KAST sekiranya anda alah kepada bahan aktifnya atau bahan tidak aktifnya yang tersenarai.

-Sebelum mula mengambil

Jangan gunakan M-KAST untuk merawat semput. Gunakan ubat yang disyorkan doktor atau ahli farmasi anda (biasanya jenis ubat sedut) semasa anda sedang semput.

M-KAST mengandungi sejenis bahan yang bernama *aspartame*. Jangan gunakan produk ini sekiranya

anda mempunyai sejenis penyakit dipanggil *phenylketonuria*. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda kurang pasti.

Memandu dan mengendalikan jentera: *montelukast* tidak mempunyai atau tidak mempengaruhi kebolehan anda memandu atau mengendalikan jentera. Walaubagaimanapun, rasa mengantuk atau pening mungkin berlaku.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil ubat seperti dibawah kerana ia boleh berinteraksi dengan M-KAST.

- Ubat yang digunakan untuk merawat sawan seperti *phenytoin* dan *phenobarbital*
- Antibiotik seperti *rifampicin*

Cara menggunakan M-KAST

-Berapa banyak harus digunakan

Sila ikut arahan yang diberi doktor atau ahli farmasi. Arahan mereka mungkin berbeza dari arahan am yang diberi disini.

M-KAST perlu diambil sekali sehari. Untuk lelah, dos boleh diambil pada waktu petang. Untuk *rhinitis* alahan, masa mengambil M-KAST bergantung kepada nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

Jika anda mempunyai kedua-dua lelah dan *rhinitis* alahan, dos anda boleh diambil pada waktu petang.

Untuk kanak-kanak berumur 2 hingga 5 tahun dengan lelah dan/atau *rhinitis* alahan bermusim: Dos untuk kanak-kanak berumur 2 hingga 5 tahun ialah sebiji tablet kunyah 4mg sehari.

Untuk kanak-kanak berumur 6 hingga 14 tahun dengan lelah

dan/atau *rhinitis* alahan bermusim: Dos untuk kanak-kanak 6 hingga 14 tahun ialah satu tablet kunyah 5mg sehari.

Anda boleh mengambil M-KAST sebelum atau selepas makanan.

-Bila perlu digunakan

Ambil M-KAST seperti yang diarahkan doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Lelah anda dirawat selama anda mengambil M-KAST. Anda dinasihatkan mengambil M-KAST selama disyorkan doktor atau ahli farmasi anda. Jika anda kurang pasti, dapatkan nasihat mereka.

-Jika terlupa menggunakan

Jika terlupa mengambil dos harian M-KAST anda, ambil sebaik anda ingat. Jika masa terlalu dekat dengan dos seterusnya, abaikan dos yang terlupa dan ambil dos seterusnya seperti biasa. Jika anda kurang pasti, dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan gantikan dos M-KAST untuk menggantikan dos yang terlupa.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda terambil terlalu banyak M-KAST secara tidak sengaja atau disyaki mengambil terlalu banyak ubat ini, hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke unit kecemasan hospital terdekat untuk nasihat.

Tanda-tanda terlebih dos termasuk sakit perut, dahaga, sakit kepala, muntah-muntah, mengantuk atau terlampau aktif.

M-KAST 4 (Montelukast Chewable Tablets 4mg)

M-KAST 5 (Montelukast Chewable Tablets 5mg)

Montelukast sodium sebagai Montelukast 4mg, Montelukast sodium sebagai Montelukast 5mg

Semasa menggunakan M-KAST

-Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda rasa kurang sihat atau mempunyai keraguan semasa mengambil M-KAST, dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

Sila ambil ubat ini seperti diarahkan doktor atau ahli farmasi anda, jika anda kurang pasti, dapatkan nasihat mereka.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil M-KAST selepas tamat tarikh luputnya yang tertera pada kotak.

Jangan kongsi ubat ini dengan orang lain yang mempunyai gejala yang sama seperti anda. Ubat ini khas dibekalkan kepada kamu sahaja.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

M-KAST mengandungi sejenis bahan yang bernama *aspartame*. Jangan gunakan produk ini sekiranya anda mempunyai sejenis penyakit dipanggil *phenylketonuria*. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda kurang pasti.

Sekiranya anda mengalami gejala seperti kelenjar limfa bengkak, ruam atau sakit kulit (gejala *Churg-Strauss*), beritahu doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, M-KAST boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Jika anda mengalami kesan sampingan yang disenaraikan dibawah atau kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan, beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Sangat biasa: jangkitan pernafasan

Biasa: cirit-birit, loya, muntah-muntah, peningkatan enzim hati, ruam atau demam

Pengalaman lepas pemasaran:

thrombocytopenia (kekurangan *platelet* dalam darah yang membantu pembekuan darah)

Beritahu pegawai perubatan anda dengan segera jika anda perasan perubahan kelakuan atau mood berikut: simptom obsesif kompulsif.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan M-KAST

-Penyimpanan

Simpan dibawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya dan kelembapan.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak seharusnya dilupuskan melalui sistem kumbahan air atau melalui sisa buangan isi rumah. Dapatkan nasihat ahli farmasi anda bagaimana melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi.

Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

M-KAST 4: Merah jambu, bujur, dwicembung, tidak bersalut dengan tanda "X" pada satu belah dan "52" pada belah yang lain.

M-KAST 5: Merah jambu, bulat, dwicembung, tidak bersalut dengan tanda "X" pada satu belah dan "53" pada belah yang lain.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
M-KAST 4: Montelukast sodium

- M-KAST 5: Montelukast sodium

- Bahan tidak aktif

M-KAST 4:

microcrystalline cellulose PH101, purified water, mannitol, ferric oxide red, croscarmellose sodium,

hydroxypropyl cellulose, microcrystalline cellulose PH102, croscarmellose sodium, aspartame, cherry flavour, magnesium stearate

- M-KAST 5:
microcrystalline cellulose PH101, purified water, mannitol, ferric oxide red, croscarmellose sodium, hydroxypropyl cellulose, microcrystalline cellulose PH102, croscarmellose sodium, aspartame, cherry flavour, magnesium stearate

-Nombor MAL

M-KAST 4: MAL18086138AZ

M-KAST 5: MAL18086121AZ

Pengilang

Aurobindo Pharma Limited

Unit VII, SEZ, TSIIIC, Plot No. S1, Survey Nos: 411/P, 425/P, 434/P, 435/P & 458/P, Green Industrial Park, Polepally Village, Jedcherla Mandal, Mahaboobnagar District, Telangana State, India

Pemegang Pendaftaran Produk

Healol Pharmaceuticals Sdn. Bhd.

74-3, Jalan Wangsa Delima 6, KLSC Wangsa Maju, 53300 Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

-01/06/2020

M-KAST 4 (Montelukast Chewable Tablets 4mg)

M-KAST 5 (Montelukast Chewable Tablets 5mg)

Montelukast sodium sebagai Montelukast 4mg, Montelukast sodium sebagai Montelukast 5mg

Nombor Siri

NPRA(R2/1)200325/405