

Monitazone 50mcg/actuation Nasal Spray

Mometasone Furoate (0.5mg/mL)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Monitazone
2. Bagaimana Monitazone berfungsi
3. Sebelum mengambil Monitazone
4. Cara menggunakan Monitazone
5. Semasa menggunakan Monitazone
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Monitazone
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Monitazone

Monitazone disyorkan pada orang dewasa, remaja dan kanak-kanak di antara umur 3 dan 11 tahun untuk merawat gejala *rhinitis* bermusim atau *perennial* (radang didalam hidung) dan polip hidung (pertumbuhan tisu dalam hidung) pada pesakit berumur 18 tahun ke atas. Monitazone juga disyorkan untuk rawatan gejala rhinosinusitis akut (resdung) pada dewasa dan kanak-kanak berumur 12 tahun keatas.

Bagaimana Monitazone berfungsi

Apabila ubat semburan hidung Monitazone digunakan, bahan aktifnya iaitu mometasone furoate bertindak mengurangkan radang, kegatalan hidung, bersin, hidung tersumbat dan hidung berair

Sebelum mengambil Monitazone

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan guna ubat ini sekiranya anda alah pada bahan aktifnya iaitu *mometasone furoate*

Sekiranya anda sedang mengalami jangkitan hidung, anda perlu tunggu sehingga jangkitan tersebut sembuh dengan sempurna sebelum menggunakan ubat ini.

Sekiranya anda sering mengalami pendarahan hidung.

Jika anda telah menjalani pembedahan hidung atau mengalami kecederaan hidung baru-baru ini.

-Sebelum mula mengambil

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mempunyai masalah kesihatan seperti:

- Pernah mengalami penyakit batuk kering (tibi)
- Jangkitan mata disebabkan virus *Herpes simplex*
- Sekiranya anda sedang mengalami apa-apa jenis jangkitan.
- Sekiranya anda sedang mengambil ubat lain yang tergolong dalam kumpulan *steroid* dalam bentuk pil ataupun suntikan.
- Sekiranya anda telah menjalani pembedahan hidung atau mengalami kecederaan hidung baru-baru ini.

Sila bincangkan situasi seperti yang dinyatakan diatas dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan Monitazone

Jika anda sedang mengambil ubat yang mengandungi *steroid* untuk merawat alahan, doktor mungkin akan menasihatkan anda supaya berhenti mengambilnya sebaik sahaja memulakan rawatan dengan Monitazone. Sekiranya anda mengalami kesan sampingan seperti sakit-sakit sendi, letih dan kemurungan setelah berhenti mengambil ubat *steroid*, sila beritahu doktor anda dengan segera.

Semasa mengandung dan menyusui bayi:

Sekiranya anda hamil, disyaki hamil atau sedang merancang keluarga, sila beritahu doktor anda sebelum mengambil ubat ini. Jangan gunakan ubat ini sekiranya anda menyusukan anak kecuali diarahkan oleh doktor anda

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mengambil sebarang ubat lain termasuk ubat yang diperolehi tanpa preskripsi sebelum menggunakan Monitazone.

Cara menggunakan Monitazone

(a) Goncang botol dengan lembut, keluarkan penutup dan pin keselamatan seperti dibawah.



(b) Apabila anda menggunakan Monitazone untuk kali pertama, sediakan pam dengan menekan kebawah muncung penyembur menggunakan jari telunjuk dan jari tengah sambil memegang pangkal botol dengan ibu jari anda. Tekan dan lepaskan 5 hingga 10 semburan sehingga anda nampak semburan halus. Jika ubat ini tidak digunakan lebih dari 2 minggu, sediakan semula pam ini dengan menekan 2 kali sehingga semburan yang halus keluar.




(c) Hembus nafas anda dengan lembut untuk membersihkan lubang hidung anda. Tutup satu lubang hidung anda dengan jari and masukkan hujung muncung kedalam lubang hidung yang lain.

Monitazone 50mcg/actuation Nasal Spray

Mometasone Furoate (0.5mg/mL)

(d) Condongkan kepala anda sedikit ke hadapan, pastikan botol itu tegak.



(e) Mula tarik nafas secara lembut atau perlahan melalui hidung dan semasa anda menarik nafas, sembur sekali kedalam lubang hidung dengan menekan SEKALI dengan jari anda.

(f) Hembus nafas anda melalui mulut. Ulang langkah (e) untuk semburan kedua pada lubang hidung yang sama jika perlu.

(g) Keluarkan hujung muncung dari lubang hidung ini dan hembus nafas anda melalui mulut.

(h) Ulang langkah (c) ke (g) untuk lubang hidung yang lain. Jangan guna ubat ini lebih daripada yang diarahkan.

Selepas menggunakan ubat ini, lapkan hujung muncung dengan sapu tangan atau tisu yang bersih dan kembalikan penutupnya.

-Berapa banyak harus digunakan

Sila pastikan anda mengambil Monitazone seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat, tolong dapatkan penjelasan dari doktor atau ahli farmasi anda.

-Bila perlu digunakan

Gunalah Monitazone seperti yang diarahkan doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Monitazone perlu digunakan selama cadangan doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Sekiranya anda terlupa menggunakan ubat ini, gunakan sebaik sahaja apabila anda ingat. Jangan gunakan lebih dari arahan doktor anda.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Semasa menggunakan Monitazone

-Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil atau sedang merancang keluarga.

Beritahu doktor anda dengan segera sekiranya anda telah menjalani pembedahan hidung atau mengalami kecederaan hidung baru-baru ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Monitazone adalah untuk kegunaan hidung sahaja. Elakkan semburan ke mata. Jangan gunakan ubat ini untuk merawat penyakit lain kecuali yang diarahkan doktor.

Jangan kongsi Monitazone dengan sesiapa walaupun mereka mempunyai gejala atau penyakit yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Semasa menggunakan Monitazone, elakkan diri daripada terdedah pesakit demam campak atau pesakit cacar air. Sila beritahu doktor anda dengan segera sekiranya anda telah terdedah kepada pesakit tersebut.

Monitazone dijangka tidak akan menjejaskan keupayaan pesakit untuk memandu kereta atau mengendalikan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Monitazone boleh menyebabkan kesan sampingan sungguhpun bukan semua orang mengalaminya.

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius atau jika anda mendapati sebarang kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Kesan sampingan yang jarang seperti alahan mungkin berlaku setelah menggunakan ubat ini. Alahan yang sangat teruk mungkin berlaku tetapi ini adalah sangat jarang. Sekiranya anda mengalami masalah pernafasan atau berdehit, sila dapatkan pertolongan dengan segera.

Kesan sampingan yang sangat kerap berlaku: pendarahan hidung

Kesan sampingan yang kerap berlaku: sakit kepala, kerengsaan hidung dan tekak.

Kesan sampingan glaukoma telah diperhatikan. Walaubagaimanapun, kekerapannya tidak diketahui secara mendalam.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan

-Penyimpanan

Simpan dibawah suhu 30°C. Jauhkan daripada capaian dan penglihatan kanak-kanak.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Monitazone 50mcg/actuation Nasal Spray

Mometasone Furoate (0.5mg/mL)

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Cecair yang berwarna putih atau hampir putih dalam bekas yang dilengkapi dengan pam semburan bermeter.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Mometasone furoate

- Bahan tidak aktif

Microcrystalline cellulose and carboxymethylcellulose sodium (avicel), glycerine, citric acid hydrous, sodium citrate dehydrate, polysorbate 80, benzalkonium chloride and purified water

-Nombor MAL

MAL18046159ACZ

Pengilang

SamChunDang Pharm Co. Ltd.

71, Jeyakongdan 2-gil, Hyangnam-eup, Hwangseong-si, Gyeonggi-do, 18622 South Korea

Pemegang Pendaftaran Produk

Healol Pharmaceuticals Sdn. Bhd.

74-3, Jalan Wangsa Delima 6, KLSC Wangsa Maju, 53300 Kuala Lumpur

Tarikh kemaskini RiMUP

-10/02/2022

Nombor Siri

NPRA(R2/1)220112/823