

INTASZORYL-1, 2,3 & 4

(Tablet Glimepiride 1 mg, 2 mg, 3 mg dan 4 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan tablet Intaszoryl
2. Bagaimana Intaszoryl berfungsi
3. Sebelum mengambil Intaszoryl
4. Cara menggunakan Intaszoryl
5. Semasa menggunakan Intaszoryl
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Intaszoryl
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Intaszoryl tablet

Tablet Intaszoryl digunakan untuk rawatan diabetes bukan bergantung pada insulin (jenis II), di mana tahap gula dalam darah tidak dapat dikawal secukupnya oleh pemakanan, senaman fizikal dan penurunan badan berat.

Intaszoryl juga boleh digunakan dalam kombinasi dengan ubat kencing manis yang lain seperti metformin atau dengan insulin.

Bagaimana Intaszoryl berfungsi

Intaszoryl merangsang pankreas untuk membuat lebih banyak insulin yang membantu mengawal tahap gula dalam darah.

Sebelum mengambil Intaszoryl

-Bila tidak boleh digunakannya

- Anda alah kepada Glimepiride atau mana-mana bahan-bahan lain di dalam tablet Intaszoryl.
- Jika anda mempunyai kencing manis bergantung kepada insulin (jenis I)
- Jika anda pernah mengalami *diabetic coma*
- Jika anda mempunyai *ketoacidosis*
- Jika anda mempunyai masalah hati dan buah pinggang yang serius
- Jika anda hamil atau sedang menyususu

-Sebelum mula menggunakan Intaszoryl

Periksa dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat anda jika:

- Anda baru pulih dari kecederaan, pembedahan, jangkitan dan demam, atau lain-lain bentuk tekanan, maklumkan kepada doktor anda dan mungkin perubahan rawatan diperlukan sementara waktu.

- Anda mempunyai masalah hati atau buah pinggang yang teruk.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau baru-baru ini telah mengambil sebarang ubat-ubatan lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi.

Mengambil Intaszoryl dengan makanan dan minuman:

- Pengambilan alkohol boleh mengganggu fungsi Intaszoryl dalam meningkat dan mengurangkan gula dalam darah dengan tindakan yang tidak diketahui.

Mengandung dan menyusukan anak:

- Intaszoryl tidak digalakkan semasa mengandung dan menyusukan anak.

Cara menggunakan Intaszoryl

-Berapa banyak harus diambil

Dos permulaan biasa ialah 1 mg Intaszoryl sekali sehari. Jika perlu, dos harian boleh ditingkatkan. Sebarang tambahan harus berdasarkan pemantauan gula dalam darah dan perlu dilakukan secara beransur-ansur.

Kanak-kanak dan remaja (bawah 18 tahun)

Intaszoryl tidak boleh digunakan di kalangan kanak-kanak atau remaja.

Orang yang lebih tua (umur 65 tahun dan lebih)

Tiada pelarasan dos diperlukan untuk pesakit tua.

-Bila perlu diambil

Sentiasa mengambil Intaszoryl tepat seperti yang doktor anda telah memberitahu anda.

Mengambil Intaszoryl pada masa yang sama setiap hari akan membantu anda mengingati untuk mengambil tablet anda.

-Berapa lama perlu diambil

Teruskan mengambil Intaszoryl setiap hari selama doktor anda memberitahu anda.

-Jika terlupa mengambil

Jika anda terlepas dos, cuba untuk tidak melepasi.

Elakkan dos yang terlepas jika sudah hampir masa untuk dos yang baru. Jangan ambil ubat yang berlebihan untuk padan dengan dos yang terlepas.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda atau orang lain mengambil terlalu banyak ubat, menghubungi doktor segera atau pergi ke jabatan kecemasan atau hospital terdekat. Anda perlu melakukannya walaupun tiada tanda ketidakselesaian atau keracunan. Anda memerlukan rawatan kecemasan.

Semasa menggunakan Intaszoryl

-Perkara yang perlu dilakukan

Anda tidak sepatutnya mengambil ubat ini semasa anda hamil.

Ikut arahan doktor anda dengan teliti. Jika anda tidak mengikut arahan doktor anda, rawatan anda mungkin tidak berkesan dan anda berkemungkinan mengalami kesan sampingan yang tidak diingini.

Tahap gula dalam darah atau air kencing anda perlu diperiksa secara berkala. Doktor anda juga akan membuat ujian darah untuk memantau tahap bilangan sel darah dan fungsi hati.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan Intaszoryl untuk merawat sebarang aduan lain melainkan jika doktor anda mengatakan anda boleh.

Jangan beri ubat ini kepada orang lain, walaupun gejala mereka seolah-olah serupa dengan anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Keupayaan anda untuk menumpukan perhatian atau bertindak balas boleh terjejas akibat penurunan paras gula dalam darah atau jika anda mengalami masalah penglihatan akibat keadaan ini.

Perlu diingat, anda boleh membahayakan diri anda atau orang lain. Sila tanya doktor anda sama ada anda boleh memandu kereta jika anda:

- Mempunyai episod kekurangan gula dalam darah yang kerap
- Mempunyai sedikit tanda atau tiada tanda kekurangan gula dalam darah

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, tablet Intaszoryl boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Kesan sampingan biasa:

- Reaksi alahan (termasuk keradangan saluran darah, selalunya dengan ruam pada kulit) yang boleh berkembang menjadi tindak balas yang serius dengan kesukaran bernafas, tekanan darah rendah dan kadang-kadang berlaku kejutan.

- Fungsi hati tidak normal termasuk kekuningan kulit dan mata (jaundis), masalah hempedu, radang hati (*hepatitis*) atau kegagalan fungsi hati.

- Alergi (hipersensitiviti) kulit seperti gatal-gatal, ruam dan meningkat kepekaan terhadap matahari. Beberapa reaksi alergi ringan boleh berkembang menjadi tindak balas yang serius.

- Kekurangan gula dalam darah yang melampau termasuk tidak sedar, sawan atau koma.

Kesan sampingan yang jarang berlaku:

- Gula darah yang lebih rendah daripada biasa (hypoglycaemia)
- Pengurangan dalam bilangan sel-sel darah: Platelet darah (yang meningkatkan risiko pendarahan atau lebam).

Sel-sel darah putih (yang menyebabkan kecenderungan jangkitan).

Sel-sel darah merah (yang boleh menjadikan kulit pucat dan menyebabkan kelemahan atau sesak nafas).

Masalah-masalah ini menjadi lebih baik selepas anda berhenti mengambil Intaszoryl.

Kesan sampingan yang sangat jarang berlaku

- Reaksi alahan (termasuk radang saluran darah, selalunya dengan ruam pada kulit) yang boleh berkembang menjadi tindak balas yang serius dengan kesukaran bernafas, tekanan darah rendah dan kadang-kadang menyebabkan kejutan. Jika anda mengalami mana-mana gejala-gejala ini, beritahu doktor anda dengan segera.

- Fungsi hati tidak normal termasuk kekuningan kulit dan mata (jaundis), kemerosan aliran hempedu (*cholestasis*), radang hati (*hepatitis*) atau kegagalan fungsi hati.

- Merasa sakit atau sememangnya sakit, cirit-birit, rasa penuh atau kembung, dan sakit perut.
- Pengurangan kadar natrium dalam darah anda (yang ditunjukkan oleh ujian darah)

Kesan sampingan yang lain termasuk:

- Alergi (hypersensitivity) kulit seperti gatal-gatal, ruam dan peningkatan kepekaan terhadap matahari. Beberapa reaksi alergi yang ringan boleh menjadi tindak balas yang serius seperti

INTASZORYL-1, 2,3 & 4

(Tablet Glimepiride 1 mg, 2 mg, 3 mg dan 4 mg)

kesukaran menelan atau bernafas, bengkak bibir, tekak atau lidah, beritahu doktor anda dengan segera.

- Alahan reaksi dengan sulfonyleureas, sulfonamides, atau ubat berkaitan mungkin berlaku
- Masalah dengan penglihatan mungkin berlaku apabila memulakan rawatan dengan Intaszoryl. Ini adalah disebabkan oleh perubahan paras gula dalam darah dan sepatutnya bertambah baik

- Peningkatan enzim hati

Jika apa-apa kesan sampingan menjadi semakin serius, atau jika anda mendapati apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Intaszoryl

-Penyimpanan

Simpan di suhu bawah 30 ° C.

Simpan ubat ini dalam pakej asal, ditutup rapat, dan daripada jangkauan kanak-kanak. Simpan daripada haba dan kelembapan yang berlebihan

-Pelupusan

Jangan melupuskan ubat dalam air kumbahan atau sampah dalam rumah. Tanya ahli

farmasi cara melupuskan tablet yang tidak diperlukan lagi. Ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet berbentuk bujur, tidak bersalut dengan garis skor di satu sisi dan biasa di sisi lain tablet. Intaszoryl dibungkus dalam lepuh PVC / PVDC Alu-sebanyak 10 tablet setiap lepuh. Setiap kotak mengandungi 3 lepuh tersebut. (3x10).

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan Aktif:
Glimepiride

-Bahan-bahan tidak aktif:
Lactose monohydrate
Sodium starch glycolate
Povidone (K-30)
Purified water
Sodium starch glycolate
Magnesium stearate.

Bahan Pewarna:

1 mg: Iron oxide red
2 mg: Yellow oxide of iron dan Lake of indigo Carmine
3 mg: Yellow oxide of iron
4 mg: Lake of indigo carmine

- Nombor MAL

Intaszoryl-1mg tablets
MAL10063005AZ
Intaszoryl-2mg tablets
MAL10063006AZ
Intaszoryl-3mg tablets
MAL10063007AZ
Intaszoryl-4mg tablets
MAL10063008AZ

Pengilang

INTAS PHARM LTD.
PLOT NO. 457/458,
VILLAGE MATODA
TALIKA: SANAND 382210,
INDIA

Pemegang Pendaftaran Produk

Jetpharma Sdn Bhd
No 13, Jalan Rajawali 2,
Bandar Puchong Jaya,
47100 Puchong,
Selangor, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

05/11/2024

Nombor Siri

NPRA(R2/1)220316/851