

LANOXIN PG ELIXIR

Digoxin (50mcg/ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Lanoxin PG Elixir
2. Bagaimana Lanoxin PG Elixir berfungsi
3. Sebelum menggunakan Lanoxin PG Elixir
4. Cara menggunakan Lanoxin PG Elixir
5. Semasa menggunakan Lanoxin PG Elixir
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Lanoxin PG Elixir
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Lanoxin PG Elixir

Lanoxin PG Elixir digunakan untuk merawat aritmia dan kegagalan jantung. Aritmia ialah keadaan tidak sekata pada denyut jantung, yang menyebabkan jantung berdenyut dengan melangkau satu denyutan atau berdenyut pada kelajuan yang salah.

Bagaimana Lanoxin PG Elixir berfungsi

Lanoxin PG Elixir mengandungi bahan aktif digoxin, yang termasuk dalam kumpulan ubat yang dinamakan *cardiac glycosides*.

Lanoxin PG Elixir berfungsi membetulkan denyut jantung yang tidak sekata kepada rentak yang normal dan menguatkan daya denyut jantung, dan oleh itu sangat berguna dalam merawat kegagalan jantung.

Sebelum menggunakan Lanoxin PG Elixir

- *Bila tidak boleh menggunakan*

Jangan ambil Lanoxin PG Elixir jika anda mempunyai alahan kepada digoxin, *cardiac glycosides* yang lain atau apa-apa ramuan lain dalam ubat ini.

Lanoxin PG Elixir tidak boleh digunakan oleh pesakit yang menghidap masalah jantung yang tertentu. Doktor akan mengkaji sejarah perubatan sebelum merawat anda dengan ubat ini. Jika ada apa-apa perkara yang membimbangkan, bincangkannya dengan doktor anda.

- *Sebelum menggunakan Lanoxin PG Elixir*

Jika anda hamil atau berniat untuk hamil atau menyusukan anak anda perlu berbincang dengan doktor anda. Doktor anda akan membincangkan kemungkinan risiko dan manfaat yang terlibat.

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Anda **mesti** memberitahu doktor atau ahli farmasi anda tentang semua ubat yang sedang diambil, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi doktor, dan juga ramuan herba seperti *St. John's wort* dan vitamin. Digoxin berinteraksi dengan banyak jenis ubat. Ubat lain yang anda ambil boleh meningkatkan atau mengurangkan kesan Lanoxin PG Elixir. Ini boleh menyebabkan Lanoxin PG Elixir tidak berfungsi dengan betul, boleh meningkatkan peluang mengalami kesan sampingan atau boleh menyebabkan kesan sampingan menjadi lebih teruk.

Cara menggunakan Lanoxin PG Elixir

- *Berapa banyak harus digunakan*

Doktor akan menentukan dos Lanoxin PG Elixir yang betul untuk anda, dan berapa kerap anda perlu mengambilnya.

Ikut semua arahan yang diberikan oleh doktor anda dengan teliti. Arahan ini mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada pek, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk bantuan.

- *Bila perlu digunakan*

Anda harus cuba untuk mengambil Lanoxin PG Elixir pada masa yang sama setiap hari.

Lanoxin PG Elixir boleh diambil dengan kebanyakan makanan. Walau bagaimanapun, anda harus mengelak daripada mengambil dengan makanan yang tinggi dengan serat, kerana jumlah Lanoxin diserap ke dalam badan boleh dikurangkan.

- *Berapa lama perlu digunakan*

Teruskan pengambilan Lanoxin PG Elixir selama yang doktor anda mencadangkan.

- *Jika terlupa menggunakan*

Jika anda terlupa mengambil satu dos, ambil ia sebaik sahaja anda ingat, dan kemudian terus seperti sebelum ini. Jangan ambil dos berganda untuk membuat untuk dos individu dilupakan. Jika lebih daripada satu dos yang terlepas, hubungi

doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital yang berdekatan jika anda berfikir bahawa anda atau orang lain mungkin telah mengambil terlalu banyak Lanoxin PG Elixir.

Ini mesti dilakukan walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak boleh menyebabkan pening yang teruk, penglihatan kabur, degupan jantung yang tidak teratur, rasa sakit, cirit-birit dan ruam kulit.

Semasa menggunakan Lanoxin PG Elixir

- *Perkara yang perlu dilakukan*

Sesetengah penyakit boleh mempengaruhi fungsi Lanoxin PG Elixir. Dalam kes tertentu, anda mungkin menghadapi kemungkinan yang lebih besar mengalami kesan sampingan, yang mungkin serius. Anda mungkin perlu diperiksa lebih kerap atau dos Lanoxin PG Elixir anda perlu dikurangkan. Beritahu doktor jika anda mengalami mana-mana keadaan yang berikut:

- jika baru-baru ini anda mengalami serangan jantung atau masalah jantung yang lain pada masa lalu;
- jika anda mengalami masalah kelenjar tiroid;
- jika anda mengalami masalah pernafasan yang teruk;
- jika anda menghidap atau pernah menghidap penyakit buah pinggang.

Semasa dirawat dengan Lanoxin PG Elixir, sampel darah anda mungkin diambil pada sela masa tertentu untuk memeriksa jika ada apa-apa yang tidak normal atau untuk memeriksa jumlah digoxin dalam darah anda. Dos yang sedang diambil mungkin perlu diubah. Ini penting terutamanya pada pesakit yang lebih tua atau mereka yang menghidap atau yang pernah menghidap penyakit buah pinggang.

Jika anda menjalani ujian jantung ECG (elektrokardiogram), beritahu orang yang akan menjalankan ujian itu yang anda sedang mengambil Lanoxin PG Elixir, kerana ia boleh menjejaskan tafsiran keputusan.

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Jangan berhenti mengambil Lanoxin PG Elixir tanpa terlebih dahulu berbincang dengan doktor anda. Berhenti dengan tiba-tiba boleh menyebabkan keadaan jantung anda menjadi bertambah teruk. Walau pun anda rasa lebih sihat, anda perlu meneruskan pengambilan ubat ini untuk membantu jantung anda berfungsi dengan betul.

Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jangan mengambil Lanoxin PG Elixir untuk merawat sebarang masalah lain melainkan jika doktor anda memberitahu anda.

Jangan berikan Lanoxin PG Elixir kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

- *Perkara yang perlu diberi perhatian*

Ubat ini boleh menyebabkan pening, kekeliruan dan masalah penglihatan pada sesetengah orang. Ia boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau mesin digunakan.

Jika Lanoxin PG Elixir membuat anda merasa sakit, pening atau letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Lanoxin PG Elixir boleh menyebabkan kesan sampingan. Walau bagaimanapun, kebanyakannya berlaku kerana dos yang terlalu tinggi. Oleh itu, doktor anda perlu menyesuaikan dos ini. Manfaat yang dijangka bagi ubat ini lebih tinggi daripada risiko mengalami apa-apa kesan sampingan yang memudaratkan. Berikut adalah kesan sampingan yang dilaporkan daripada pesakit yang mengambil Lanoxin PG Elixir.

Kesan yang kerap:

bermaksud antara 1 dalam 10 dan 1 dalam 100 orang mungkin mengalaminya.

- Disorientasi, pening kepala, masalah penglihatan (penglihatan kabur atau kekuningan).
- Perubahan dalam rentak atau kadar denyut jantung anda. Jantung anda mungkin berdenyut lebih perlahan atau tidak tetap.
- Rasa loya atau rasa hendak muntah, cirit-birit.
- Ruam kulit.

Kesan yang tidak kerap:

bermaksud 1 dalam 100 dan 1 dalam 1,000 orang mungkin mengalaminya.

- Kemurungan.

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda dapati apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Lanoxin PG Elixir

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 25°C.

- Pelupusan

Lupuskan baki ubat selepas 12 hari ubat dibuka.

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Jika doktor atau ahli farmasi anda mengarahkan anda berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini sudah melepasi tarikh luputnya, sila tanya ahli farmasi anda apa yang patut dilakukan dengan sebarang ubat yang tinggal. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk
- Lanoxin PG Elixir adalah larutan jernih, berwarna kuning, perasa limau, mengandungi 50mcg (0.050mg) Digoxin BP dalam setiap 1ml *sweetened, aqueous-alcoholic vehicle*.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

- Digoxin

Bahan tidak aktif:

- Propylene Glycol
- Ethanol 96%
- Colour Quinoline Yellow No. 10 E104
- Syrup
- Citric Acid Monohydrate
- Lime flavour No. 1
- Methyl Parahydroxybenzoate
- Anhydrous sodium phosphate
- Purified water

- Nombor MAL
MAL19861532AZ

Pengilang

Aspen Bad Oldesloe GmbH
Industriestrasse 32-36,
D-23843 Bad Oldesloe,
Germany.

Pemegang Pendaftaran Produk

Aspen Medical Products
Malaysia Sdn Bhd
(1004761-W)
Unit 1302A, Level 13A,
Uptown 1, 1 Jalan SS21/58,
Damansara Uptown, 47400
Petaling Jaya, Selangor,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

15/06/2020

Nombor Siri

NPRA (R1/3) 21072020/127