

GRACIAL TABLET

Desogestrel / Ethinylestradiol (25 mcg / 40 mcg & 125 mcg / 30 mcg)

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan GRACIAL Tablet
2. Bagaimana GRACIAL Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan GRACIAL Tablet
4. Cara menggunakan GRACIAL Tablet
5. Semasa menggunakan GRACIAL Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan GRACIAL Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan GRACIAL Tablet

GRACIAL Tablet digunakan untuk mencegah kehamilan. Apabila dimakan dengan betul (tanpa tertinggal tablet), kemungkinan menjadi hamil sangatlah rendah.

Bagaimana GRACIAL Tablet berfungsi

GRACIAL Tablet ialah sejenis pil perancang gabungan. Setiap tablet mengandungi sejumlah kecil dua jenis hormon wanita, iaitu desogestrel (sejenis progestogen) dan ethinylestradiol (sejenis estrogen). GRACIAL Tablet dianggap sebagai pil perancang dos rendah kerana kandungan hormonnya yang sedikit. Oleh sebab hormon-hormon dalam tablet biru adalah berbeza dengan yang dalam tablet putih, maka tablet ini dianggap sebagai pil perancang gabungan dwi-fasa.

GRACIAL Tablet menyekat pelepasan telur dari ovari dan menyebabkan perubahan pada *cervical secretion*, oleh sebab itu, mencegah kehamilan.

Sebelum menggunakan GRACIAL Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan
Jangan gunakan GRACIAL Tablet jika anda menghidap mana-mana

penyakit yang disenaraikan di bawah ini. Jika mana-mana penyakit di dalam senarai ini berkenaan dengan anda, beritahulah doktor sebelum anda mula menggunakan GRACIAL Tablet. Doktor mungkin akan menasihati anda untuk menggunakan jenis Pil yang lain atau kaedah pencegahan kehamilan yang lain (tidak berhormon).

- Jika anda mengalami atau pernah mengalami bekuan darah (trombosis) di dalam salur darah pada betis, paru-paru (embolus) atau organ lain.
- Jika anda mengalami atau pernah mengalami serangan jantung atau strok (angin ahmar).
- Jika anda mengalami atau pernah mengalami keadaan yang mungkin merupakan tanda pertama serangan jantung (misalnya, angina pektoris atau sakit dada) ataupun strok (misalnya, serangan iskemia sementara atau strok ringan yang boleh pulih).
- Jika anda mengalami gangguan pembekuan darah (misalnya, kekurangan protein C).
- Jika anda pernah menjalani pembedahan besar dan pergerakan anda terhad selama tempoh yang panjang.
- Jika anda menghidap atau pernah menghidap sejenis migrain yang digelar 'migrain berserta aura'.
- Jika anda menghidap diabetes melitus (kencing manis) berserta kerosakan salur darah.
- Jika anda menghadapi faktor risiko yang serius, atau beberapa faktor risiko mengalami trombosis.
- Jika anda menghidap atau pernah menghidap pankreatitis (radang pankreas) yang terkait dengan aras tinggi bahan berlemak di dalam darah anda.

- Jika anda mengalami jaundis (kulit menjadi kuning) atau penyakit hati yang teruk dan hati anda belum lagi berfungsi secara normal.
- Jika anda menghidap atau pernah menghidap tumor hati.
- Jika anda menghidap atau pernah menghidap kanser yang mungkin membesar akibat kesan hormon seks (misalnya kanser payudara atau organ genital).
- Jika anda mengalami pendarahan dari faraj yang tidak dapat dijelaskan.
- Jika anda hamil atau jika anda rasa anda mungkin hamil.
- Jika anda alah terhadap mana-mana bahan di dalam GRACIAL Tablet.
- Jika anda menghidap Hepatitis C dan mengambil ubat mengandungi ombitasvir / paritaprevir / ritonavir bersama atau tidak dengan dasabuvir, glecaprevir / pibrentasvir dan sofosbuvir / velpatasvir / voxilaprevir.

- Sebelum menggunakannya

Jika GRACIAL Tablet ini digunakan apabila adanya salah satu keadaan yang disenaraikan di bawah ini, anda mungkin perlu diawasi dengan rapi. Oleh itu, jika mana-mana keadaan ini berkenaan dengan anda, beritahulah doktor sebelum anda mula GRACIAL Tablet.

- anda merokok / berbadan gemuk
- anda menghidap diabetes
- anda berbadan gemuk
- anda mengalami tekanan darah tinggi
- anda mengalami gangguan injap jantung atau gangguan ritma jantung
- anda mengalami radang vena (flebitis yang tidak mendalam)
- anda mengalami vena varikos
- anggota keluarga anda yang terdekat pernah mengalami trombosis, serangan jantung atau strok

- anda menghidap migrain
- anda menghidap epilepsi (sawan bayi)
- anda atau anggota keluarga anda yang terdekat mengalami atau pernah mengalami aras kolesterol atau trigliserida (lemak di dalam darah) yang tinggi
- anggota keluarga anda yang terdekat pernah menghidap kanser payudara
- anda menghidap penyakit hati atau penyakit pundi hempedu;
- anda menghidap penyakit Crohn atau kolitis berulser (penyakit radang usus yang kronik)
- anda menghidap lupus eritematosus sistemik (SLE, iaitu sejenis penyakit tisu penghubung yang kronik dan menjejaskan kulit seluruh tubuh)
- anda menghidap sindrom uremia hemolitik (HUS, iaitu pemusnahan sel darah merah secara abnormal yang berlaku sebelum masanya dan menyebabkan kegagalan ginjal apabila sel darah merah yang musnah itu menyumbat sistem penapisan di dalam ginjal)
- anda menghidap anemia sel sabit (sejenis penyakit darah yang jarang-jarang berlaku)
- anda memerlukan pembedahan, atau jika pergerakan anda terhad selama tempoh yang panjang
- jika anda bersalin, anda mengalami risiko yang lebih tinggi mengalami bekuan darah
- anda mengalami penyakit yang pertama kali berlaku atau yang bertambah teruk semasa anda hamil atau semasa anda menggunakan hormon seks sebelum ini (misalnya hilang pendengaran, penyakit *porphyria*, penyakit kulit yang digelar *herpes gestationis*, penyakit *Sydenham's chorea*, penyakit *angioedema* yang diwarisi/diperolehi)
- anda menghidap atau pernah menghidap *chloasma* (tompok-tompok pigmentasi yang berwarna perang kekuningan pada kulit, terutamanya pada muka). Jika demikian, jangan terlalu banyak terdedah kepada

cahaya matahari atau cahaya ultraungu.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Anda **mesti** memberitahu doktor atau ahli farmasi anda tentang semua ubat yang sedang diambil, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi doktor. Ubat lain yang anda ambil boleh meningkatkan atau mengurangkan kesan GRACIAL Tablet.

Ubat-ubat ini termasuk ubat untuk merawat *epilepsy* (misalnya, *primidone*, *barbiturates*, *carbamazepine*, *oxcarbazepine*, *topiramate*, *felbamate*); tuberculosis (misalnya, *rifampicin*) and HIV infections (misalnya, *ritonavir*); antibiotics (misalnya, *griseofulvin*) untuk merawat penyakit berjangkit yang lain; dan rawatan herba St. John's wort (untuk rawatan penyakit murung).

Jika anda mengambil ubat-ubatan atau produk herba yang mungkin membuat tablet GRACIAL kurang efektif, kaedah kontraseptif halangan juga harus digunakan. Oleh kerana kesan ubat lain pada GRACIAL mungkin berlangsung sehingga 28 hari selepas menghentikan ubat, perlu menggunakan kaedah kontraseptif penghalang tambahan untuk masa yang lama.

GRACIAL Tablet juga boleh mengganggu tindakan ubat lain, menyebabkan sama ada peningkatan kesan (misalnya, *ciclosporin*) atau pengurangan kesan (misalnya, *lamotrigine*).

Jangan guna GRACIAL Tablet jika anda menghidap Hepatitis C dan mengambil ubat yang mengandungi ombitasvir / paritaprevir / ritonavir bersama atau tidak dengan dasabuvir, glecaprevir / pibrentasvir dan sofosbuvir / velpatasvir / voxilaprevir. Doktor anda akan memberi ubat yang lain sebelum memulakan rawatan dengan ubat ini.

Cara menggunakan GRACIAL TABLET

- Berapa banyak harus digunakan

Pek tablet GRACIAL mengandungi 22 tablet: 7 biru (bernomor 1-7) dan 15 tablet putih (bernomor 8-22). Ambil tablet anda pada masa yang sama setiap hari, dengan cecair jika perlu. Setiap kali anda memulakan pek baru GRACIAL mengambil nombor 1 tablet biru di sudut atas sebelah kiri. Tandakan hari permulaan anda dengan memecahkan penutup aluminium poket penunjuk yang sesuai di bahagian hijau jalur. Dengan cara ini, anda boleh dengan mudah memeriksa sama ada anda mengambil tablet harian anda. Ikut arah anak panah sehingga semua 22 tablet telah diambil. Apabila melakukan itu, anda akan mengambil semua tablet biru terlebih dahulu, diikuti oleh semua tablet putih. Dalam tempoh 6 hari akan datang anda tidak mengambil tablet. Tempoh mesti bermula selama 6 hari ini (penarikan diri berdarah). Biasanya ia akan bermula pada hari 2-3 selepas tablet GRACIAL yang terakhir. Mulakan mengambil pek anda seterusnya pada hari ke-7 walaupun tempoh anda berterusan. Ini bermakna bahawa anda akan sentiasa memulakan pek baru pada hari yang sama dalam seminggu, dan juga bahawa anda mempunyai *withdrawal bleed* pada kira-kira hari yang sama, setiap bulan.

- Bila perlu digunakan

Tiada penggunaan kontraseptif hormon sebelum ini [dalam sebulan lepas]

Mula mengambil GRACIAL Tablet pada hari pertama kitaran anda, iaitu hari pertama pendarahan haid. GRACIAL Tablet akan berfungsi dengan serta-merta. Anda tidak perlu menggunakan kaedah kontraseptif tambahan.

Anda juga boleh memulakan hari 2-5 kitaran anda, tetapi jika anda lakukan, pastikan anda juga menggunakan kaedah kontraseptif tambahan (kaedah penghalang) untuk 7 hari pertama tablet mengambil dalam kitaran pertama.

Mengubah dari kontraseptif hormon gabungan (kontraseptif

oral gabungan (COC), cincin vagina, atau tampalan transdermal)

Anda harus bermula dengan GRACIAL Tablet sebaik-baiknya pada hari selepas tablet aktif yang terakhir (tablet terakhir yang mengandungi bahan-bahan aktif) COC sebelumnya, tetapi pada hari terakhir berikutan tablet biasa atau plasebo selang COC sebelumnya. Sekiranya cincin vagina atau tampalan transdermal telah digunakan, anda harus menggunakan GRACIAL Tablet sebaik-baiknya pada hari penyingkiran, tetapi pada masa yang paling lama apabila permohonan berikutnya akan tiba.

Jika anda telah menggunakan kaedahnya sebelum ini secara konsisten dan betul dan jika anda pasti yakin bahawa anda tidak hamil, anda juga boleh beralih dari kontraseptif hormon gabungan anda sebelum ini pada mana-mana hari kitaran.

Hormone-free interval dari kaedah sebelumnya tidak boleh dilanjutkan melebihi panjang yang disyorkan.

Mengubah dari kaedah progestogen sahaja (minipill, suntikan, implan) atau dari sistem intrauterine yang mengeluarkan progestogen (IUS)

Anda boleh menukar mana-mana hari dari minipill (dari implan atau IUS pada hari penyingkirannya, dari suntikan apabila suntikan seterusnya akan datang), tetapi pastikan anda menggunakan kaedah tambahan penghalang untuk 7 hari pertama *tablet-taking*.

Selepas bersalin

Sekiranya anda baru sahaja bersalin, doktor mungkin memberitahu anda untuk menunggu sehingga selepas tempoh normal anda sebelum anda mula mengambil GRACIAL Tablet. Kadang-kadang ada kemungkinan untuk memulakan lebih awal. Doktor anda akan menasihati anda. Jika anda menyusu dan ingin mengambil GRACIAL Tablet, anda perlu terlebih dahulu bercakap dengan doktor anda.

Selepas keguguran atau pengguguran

Doktor anda akan menasihati anda.

- *Berapa lama perlu digunakan*
Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- *Jika anda terlupa menggunakan*

- Jika anda memakan tablet **kurang daripada 12 jam lewat**, keberkesanan Pil masih sama. Makanlah tablet itu sebaik sahaja anda ingat dan makanlah tablet yang seterusnya pada waktu yang biasa.
- Jika anda memakan tablet **lebih daripada 12 jam lewat**, keberkesanan Pil mungkin berkurangan. Semakin banyak tablet yang tidak anda makan secara berturut-turut, semakin tinggilah risiko keberkesanannya sebagai pencegah kehamilan akan berkurangan. Risiko menjadi hamil lebih tinggi jika anda terlupa memakan tablet pada peringkat awal atau akhir papan.

Lebih daripada satu tablet terlupa dimakan di dalam satu papan

Mintalah nasihat doktor.

1 tablet tidak dimakan pada minggu 1

Makanlah tablet yang tidak dimakan itu sebaik sahaja anda ingat (walaupun ini bermakna memakan dua tablet sekali gus) dan makanlah tablet yang seterusnya pada waktu yang biasa.

Gunalah kaedah tambahan untuk mencegah kehamilan (kaedah perintang) selama 7 hari yang seterusnya. Jika anda telah bersetubuh pada minggu sebelum anda terlupa memakan tablet, ada kemungkinan anda hamil. Oleh itu, beritahulah doktor dengan segera.

1 tablet tidak dimakan pada minggu 2

Makanlah tablet yang tidak dimakan itu sebaik sahaja anda ingat (walaupun ini bermakna memakan dua tablet sekali gus) dan makanlah

tablet yang seterusnya pada waktu yang biasa.

1 tablet tidak dimakan pada minggu 3

Anda boleh mengambil salah satu pilihan yang berikut tanpa memerlukan kaedah tambahan untuk mencegah kehamilan.

1. Makanlah tablet yang tidak dimakan itu sebaik sahaja anda ingat (walaupun ini bermakna memakan dua tablet sekali gus) dan makanlah tablet yang seterusnya pada waktu yang biasa. Mulakan papan yang seterusnya sebaik sahaja habis papan yang sedang digunakan supaya **tiada selang antara kedua-dua papan**. Anda mungkin tidak akan mengalami pendarahan sehinggalah penghujung papan kedua tetapi anda mungkin akan mengalami penitisan darah atau pendarahan ringan pada hari-hari anda memakan tablet.

Atau

2. Berhenti memakan tablet dari papan anda sekarang, lalui tempoh rehat tanpa tablet selama 6 hari atau kurang (**termasuklah hari yang anda terlupa memakan tablet**) dan kemudian mulakan papan yang seterusnya. Jika anda lakukan begini, anda boleh mulakan papan yang seterusnya pada hari yang sama seperti yang biasa anda lakukan.

Jika anda terlupa memakan beberapa tablet di dalam satu papan dan anda tidak pula datang haid semasa tempoh rehat biasa yang pertama tanpa tablet, maka anda mungkin hamil. Beritahulah doktor sebelum anda memulakan papan yang seterusnya.

- *Jika anda mengalami gangguan gastro-intestinal (misalnya, muntah, cirit-birit yang teruk)*

Sekiranya anda muntah atau mengalami cirit-birit yang teruk, bahan aktif tablet GRACIAL anda mungkin tidak diserap sepenuhnya. Jika anda muntah dalam masa 3 hingga 4 jam selepas mengambil tablet anda, ini seperti hilang tablet. Anda mesti mengikut nasi hat '*Jika terlupa menggunakan*' tablet.

Sekiranya anda mengalami cirit-birit yang teruk, sila beritahu doktor anda.

- Jika anda mahu melambatkan kitaran haid

Anda boleh melambatkan tempoh haid anda jika anda memulakan dengan tablet putih dalam pek GRACIAL Tablet seterusnya selepas anda menyelesaikan pek semasa anda. Anda boleh meneruskan pek ini selagi yang anda mahu, sehingga akhir pek kedua (maksima 15 hari). Apabila anda ingin tempoh haid anda bermula, hentikan pengambilan tablet. Semasa menggunakan pek kedua, anda mungkin mengalami pendarahan ringan atau penitisan darah pada hari pengambilan tablet. Mulakan dengan pek anda yang seterusnya selepas 6 hari tempoh rehat.

- Jika anda ingin mengubah hari permulaan kitaran haid

Jika anda mengambil tablet anda dengan betul, anda akan mempunyai tempoh anda pada hari yang sama setiap 4 minggu. Sekiranya anda ingin menukar hari ini, hanya pendekkan, (jangan panjangkan) tempoh rehat tablet seterusnya. Sebagai contoh, jika haid anda biasanya bermula pada hari Jumaat dan pada masa akan datang anda mahu bermula pada hari Selasa (3 hari lebih awal) memulakan pek seterusnya anda 3 hari lebih awal daripada biasanya. Jika anda membuat tempoh rehat tablet anda sangat singkat (contohnya, 3 hari atau kurang), anda mungkin tidak berdarah semasa tempoh rehat. Anda mungkin mengalami pendarahan ringan atau penitisan darah semasa menggunakan pek seterusnya.

- Jika anda mengalami pendarahan yang tidak dijangka

Dengan semua Pil, untuk beberapa bulan pertama, anda boleh mengalami pendarahan faraj tidak teratur (penitisan darah atau pendarahan ringan) di antara tempoh haid anda. Anda mungkin perlu menggunakan perlindungan kebersihan, tetapi terus mengambil

tablet anda seperti biasa. Pendarahan faraj yang tidak teratur biasanya berhenti apabila badan anda telah diselaraskan ke GRACIAL Tablet (biasanya selepas kira-kira 3 bulan). Jika pendarahan berterusan, menjadi berat atau bermula lagi, beritahu doktor anda.

- Jika haid anda terlepas

Jika anda telah mengambil semua tablet anda pada masa yang tepat, dan anda tidak muntah, atau menggunakan ubat-ubatan lain maka anda tidak mungkin hamil. Pastikan guna GRACIAL Tablet seperti biasa.

Sekiranya anda terlepas haid anda dua kali berturut-turut, anda mungkin hamil. Beritahu doktor anda.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat jika anda berfikir bahawa anda atau orang lain mungkin telah mengambil terlalu banyak GRACIAL Tablet.

Lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak tablet boleh menyebabkan loya, muntah atau pendarahan vagina.

Semasa menggunakan Imuran Tablet

Semasa menggunakan GRACIAL Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Pemeriksaan yang kerap
Apabila anda mengambil GRACIAL Tablet, doktor anda akan memberitahu anda untuk kembali ke pemeriksaan biasa. Anda sepatutnya mempunyai pemeriksaan setiap tahun.

Hubungi doktor anda secepat mungkin jika:

- Anda perhatikan apa-apa perubahan dalam kesihatan anda sendiri, terutamanya yang melibatkan apa-apa perkara yang

disebutkan dalam risalah ini ('Bila tidak boleh mengambil' dan 'Sebelum mula mengambilnya') jangan lupa tentang perubahan dalam kesihatan anda yang terdekat keluarga

- anda merasakan ketulan pada payudara anda
- anda mengalami gejala angioedema seperti muka bengkak, lidah dan / atau tekak dan / atau kesukaran menelan atau gatal-gatal bersama-sama dengan kesukaran bernafas
- anda akan menggunakan ubat lain ('Jika mengambil ubat-ubat lain')
- keupayaan anda untuk bergerak di sekeliling adalah terhad untuk tempoh masa yang lama atau anda perlu menjalani pembedahan (beritahu doktor anda sekurang-kurangnya empat minggu lebih awal)
- anda mempunyai pendarahan faraj yang luar biasa dan berat
- anda terlupa tablet pada minggu pertama pek dan bersetubuh dalam tujuh hari sebelum itu
- anda mempunyai cirit-birit yang teruk
- anda terlepas haid anda dua kali berturut-turut atau mengesyaki anda mengandung (jangan memulakan pek seterusnya sehingga doktor memberitahu anda).

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil GRACIAL Tablet tanpa pemeriksaan terlebih dahulu dengan doktor anda.

Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berunding dengan doktor anda.

Jangan ambil GRACIAL Tablet untuk merawat sebarang aduan lain kecuali jika doktor memberitahu anda.

Jangan memberi GRACIAL Tablet kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

GRACIAL Tablet, seperti semua Pil perancang, tidak melindungi jangkitan HIV (AIDS) atau sebarang penyakit menular seksual lain.

Berhenti mengambil tablet dan berjumpa dengan doktor anda dengan segera jika anda perhatikan kemungkinan tanda trombotik:

- batuk yang luar biasa
- kesakitan yang teruk di dada yang boleh mencapai lengan kiri
- sesak nafas
- sebarang serangan sakit kepala atau migrain yang luar biasa, teruk, atau berpanjangan
- kehilangan penglihatan separuh atau penuh, atau *double vision*
- *slurring* atau kecacatan percakapan
- Perubahan mendadak pada pendengaran anda, rasa bau, atau rasa
- pening atau pusing;
- kelemahan atau kebas di mana-mana bahagian badan anda;
- kesakitan yang teruk di dalam perut anda;
- Kesakitan yang teruk atau bengkak di kedua-dua kaki anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, GRACIAL Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan. Walau bagaimanapun, banyak perkara ini berlaku kerana dosnya terlalu tinggi. Oleh itu doktor anda mungkin perlu melaraskan ubat ini.

Lazim:

- Rasa murung, perubahan ragam angina
- Sakit kepala
- Loya, sakit pada bahagian abdomen
- Sakit pada payudara, payudara terasa sakit apabila disentuh
- Kenaikan berat badan

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan GRACIAL Tablet

- Penyimpanan

Jauhi ubat daripada kanak-kanak. Simpan di bawah 30°C. Lindungi dari cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Setiap papan GRACIAL Tablet mengandungi 7 (biru) Desogestrel / Ethinylestradiol 25mcg / 40mcg dan 15 (putih) tablet of Desogestrel / Ethinylestradiol 125mcg/30mcg.

Desogestrel / Ethinylestradiol 25mcg/40mcg (Tablet Biru)

- Biru, tablet bulat dan rata dengan tepi bevelled dengan diameter 6 mm, dikodkan TR / 9 di satu sisi dan kosong di sebelah yang lain.

Desogestrel / Ethinylestradiol 125mcg/30mcg (Tablet Putih)

- Putih, tablet bulat dan rata dengan tepi bevelled dengan diameter 6 mm, dikodkan TR / 8 di satu sisi dan kosong di sebelah yang lain.

- Bahan-bahan kandungan

Desogestrel / Ethinylestradiol 25mcg/40mcg (Blue Tablet)

Bahan aktif:

- Desogestrel 25 mcg
- Ethinylestradiol 40 mcg

Bahan tidak aktif:

- Potato Starch
- Silica, colloidal anhydrous
- All-rac-alpha-tocopherol
- Indigo Carmine E132
- Stearic acid
- Povidone
- Lactose monohydrate

Desogestrel / Ethinylestradiol 125mcg/30mcg (White Tablet)

Bahan aktif:

- Desogestrel 125 mcg
- Ethinylestradiol 30 mcg

Bahan tidak aktif:

- Potato Starch
- Silica, colloidal anhydrous
- All-rac-alpha-tocopherol
- Stearic acid
- Povidone
- Lactose monohydrate

- Nombor MAL

MAL20076018ACZ

Pengilang

Cyndeia Pharma, S.L
Poligono Industrial Emiliano
Revilla Sanz
Avenida de Agreda, 31 Olvega
42110 (Soria) Spain.

Pemegang Pendaftaran Produk

Aspen Medical Products Malaysia
Sdn Bhd (1004761-W)
Unit 1302A, Level 13A, Uptown 1,
1 Jalan SS21/58, Damansara
Uptown, 47400 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia.

Tarikh kemas kini RIMUP

01/06/2025

Nombor Siri

NPRA(R2/1)260604/00071