

BECO TABLET

Vitamin B1/ Vitamin B2/ Vitamin B3/ Vitamin B6/ Vitamin B12 (9.7mg/5mg/25mg/2mg/5mcg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Beco Tablet
2. Bagaimana Beco Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Beco Tablet
4. Cara menggunakan Beco Tablet
5. Semasa menggunakan Beco Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Beco Tablet
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Beco Tablet

Beco Tablet digunakan sebagai sumber tambahan kepada makanan dan diet sedia ada.

Bagaimana Beco Tablet berfungsi

Bahan aktif dalam Beco Tablet adalah Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6 dan Vitamin B12. Bahan-bahan ini bertindak bersama untuk membantu mencegah kekurangan vitamin B dalam badan.

Sebelum menggunakan Beco Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Beco Tablet jika anda:

- hipersensitif kepada vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B12 atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).

- Sebelum mula menggunakan Beco Tablet

Beritahu doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda:

- mempunyai masalah kurang darah merah disebabkan kekurangan vitamin B12 (anemia) atau sebarang kekurangan zat yang teruk.

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika menggunakan ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai ubat makanan untuk kesihatan.

Anda perlu berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat seperti yang berikut: -

- levodopa (ubat untuk merawat penyakit parkinson).

Cara menggunakan Beco Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut semua arahan yang diberikan oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan teliti. Arahan tersebut mungkin berbeza dengan maklumat yang terdapat dalam risalah ini. Sekiranya anda tidak memahami arahan pada label, minta bantuan daripada doktor atau ahli farmasi.

Pengambilan secara oral sahaja.

1 atau 2 tablet diambil dua hingga tiga kali sehari.

- Bila perlu digunakan

Ambil 2 atau 3 kali sehari, atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil Beco Tablet untuk tempoh yang ditetapkan oleh doktor.

- Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga itu untuk mengambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Beco Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Beco Tablet.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandung semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan mengambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Jangan berikan Beco Tablet kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau masalah seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin

Berhati-hati semasa memandu atau menggunakan jentera sehingga anda mengetahui tentang kesan Beco Tablet terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Beco Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Kesan sampingan yang paling biasa adalah tindak balas alahan. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami kesan sampingan lain semasa mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Beco Tablet

- Penyimpanan

Simpan pada suhu 25°C. Lindungi dari cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bulat berwarna jingga kemerahan bersalut gula.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan- bahan aktif

- Thiamine hydrochloride (vitamin B1)
- Riboflavin (vitamin B2)
- Nicotinamide (vitamin B3)
- Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6)
- Cyanocobalamin (vitamin B12)

- Bahan- bahan tidak aktif

- Lactose 200 mesh
- Corn Starch
- Magnesium Stearate
- Sodium Starch Glycolate
- Polyvinylpyrrolidone
- Isopropyl Alcohol
- Shellac
- Calcium Carbonate
- Talcum
- Acacia
- Sugar
- Purified Water
- Starch
- Gelatin
- Quinoline Yellow
- Ponceau C4R

- Nombor MAL

MAL19971892XZ

**Pengilang & Pemegang Pendaftaran
Produk**

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No. 9,11 & 17, Jalan Kempas 4, Taman
Perindustrian Tampoi Indah, 81200
Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

12/07/2024

Nombor siri

NPRA(R4/1)130624/00069