

ALLERSIN-F TABLET 4MG

Chlorpheniramine Maleate (4mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Allersin-F Tablet
2. Bagaimana Allersin-F Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Allersin-F Tablet
4. Cara menggunakan Allersin-F Tablet
5. Semasa menggunakan Allersin-F Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Allersin-F Tablet
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Allersin-F Tablet

Allersin-F Tablet digunakan untuk merawat keadaan alahan yang responsif pada antihistamin.

Bagaimana Allersin-F Tablet berfungsi

Bahan aktif dalam ubat ini adalah chlorpheniramine maleate. Chlorpheniramine maleate merupakan antihistamin. Ia berfungsi dengan menyekat bahan semulajadi tertentu (*histamine*) yang badan anda hasilkan semasa reaksi alahan.

Sebelum menggunakan Allersin-F Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Allersin-F Tablet jika anda:

- mempunyai alahan terhadap chlorpheniramine maleate ataupun mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut produk).
- mempunyai glaukoma sudut tertutup (peningkatan tekanan dalam mata).
- mengambil ubat kemurungan dikenali sebagai Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOIs).
- mempunyai ulser perut atau duodenum.
- mengalami kesukaran untuk membuang air kencing.
- sedang mengalami serangan asma.

Kanak-kanak

Ubat ini tidak boleh diberikan kepada kanak-kanak di bawah umur 2 tahun.

- Sebelum mula menggunakan Allersin-F Tablet

Beritahu doktor anda jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau menyusukan bayi.

Ia tidak digalakkan untuk wanita hamil dan ibu menyusui kecuali manfaat yang dijangka melebihi potensi risiko.

Tiada bukti mencukupi yang menunjukkan penggunaannya adalah selamat dalam tempoh kehamilan ibu mengandung. Jaminan kesihatan ketika mengandung tidak dapat dipastikan. Langkah berjaga-jaga perlu diambil apabila menyusukan anak.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Anda perlu berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat seperti yang berikut: -

- *anticonvulsants*, (ubat untuk sawan seperti phenytoin).
- alkohol, ubat penenang atau sedatif.

Cara menggunakan Allersin-F Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Pengambilan Oral.

Dewasa

Dos biasa: 1 tablet, setiap 4-6 jam mengikut keperluan (tidak melebihi 6 tablet sehari).

Kanak-kanak

6 hingga 12 tahun: ½ tablet setiap 4 – 6 jam mengikut keperluan (tidak melebihi 3 tablet sehari).

2 hingga 5 tahun: ¼ tablet setiap 4 – 6 jam mengikut keperluan (tidak melebihi 1 1/2 tablet sehari).

Warga emas

Dos biasa adalah sama dengan orang dewasa.

- Bila perlu digunakan

Gunakan Allersin-F Tablet setiap 4-6 jam atau mengikut nasihat doktor anda. Semua dos perlu diambil selepas makan.

- Berapa lama perlu digunakan

Ia adalah penting untuk mengambil Allersin-F Tablet untuk tempoh masa yang disyorkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga itu untuk mengambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos

yang terlepas. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Sila rujuk kepada kesan sampingan untuk simptom-simptom terlebih dos.

Semasa menggunakan Allersin-F Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Allersin-F Tablet.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandung semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Jangan berikan Allersin-F Tablet kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau masalah seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Chlorpheniramine maleate boleh menjejaskan keupayaan anda untuk menumpukan perhatian atau bertindak balas terjejas. Berhati-hati ketika memandu kenderaan atau mengendalikan mesin sehingga anda mengetahui kesan Allersin-F Tablet terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Allersin-F Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Kesan sampingan yang paling biasa adalah seperti sedatif, sedikit mengantuk sehingga terlepas, ketidakupayaan untuk menumpukan perhatian, letih, pening, tekanan darah rendah, otot lemah dan gangguan koordinasi.

Kesan sampingan lain yang mungkin berlaku termasuk loya, muntah-muntah, cirit-birit atau sembelit, sakit epigastrik, kekeringan mulut, sesak dada, kelemahan

tangan, bunyi berdering dalam telinga, tiada selera makan dan mimpi ngeri.

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin juga boleh berlaku pada sesetengah orang. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami kesan sampingan lain semasa mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Allersin-F Tablet

- Penyimpanan

Simpan pada atau di bawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet berbentuk bulat, cembung dan berwarna kuning dengan ukiran  pada sebelah sahaja.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Chlorpheniramine Maleate

- Bahan- bahan tidak aktif

- Lactose
- Maize Starch
- Quinoline Yellow 30E
- Magnesium Stearate
- Polyvinylpyrrolidone K90
- Isopropyl Alcohol

- Nombor MAL

MAL19861183AZ

Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No. 9,11 & 17, Jalan Kempas 4,
Taman Perindustrian Tampoi Indah,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

11/04/2025

Nombor siri:

NPRA(R4/1)110325/00020