

SW METOCLOPRAMIDE TABLET

Metoclopramide hydrochloride (10mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan SW Metoclopramide Tablet
2. Bagaimana SW Metoclopramide Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan SW Metoclopramide Tablet
4. Cara menggunakan SW Metoclopramide Tablet
5. Semasa menggunakan SW Metoclopramide Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan SW Metoclopramide Tablet
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan SW Metoclopramide Tablet

Bagi orang dewasa, SW Metoclopramide tablet digunakan untuk;

- merawat loya dan muntah, termasuk sakit migran yang akut.
- mencegah loya dan muntah-muntah yang disebabkan oleh radiasi dan rawatan kemoterapi

Bagi kanak-kanak berumur 1 hingga 18 tahun, SW Metoclopramide Tablet digunakan sebagai pilihan rawatan kedua untuk mencegah loya dan muntah akibat rawatan kemoterapi.

Bagaimana SW Metoclopramide Tablet berfungsi

Bahan aktif dalam ubat ini adalah Metoclopramide hydrochloride. Ia digunakan untuk menyekat isyarat di dalam otak yang menyebabkan rasa muntah dan loya.

Sebelum menggunakan SW Metoclopramide Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan SW Metoclopramide Tablet jika anda:

- alah terhadap metoclopramide hydrochloride atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut).
- mempunyai masalah pendarahan, halangan atau lubang pada saluran gastrousus.

- disahkan atau disyaki menghidap *pheochromocytoma* (sejenis tumor jarang yang mengeluarkan hormon yang boleh menyebabkan tekanan darah tinggi).
- mempunyai sejarah gerakan badan tidak terkawal yang disebabkan pengambilan ubat metoclopramide atau neuroleptik.
- mempunyai sawan.
- mempunyai penyakit parkinson atau menggunakan levodopa atau agonis dopamin (ubat untuk merawat penyakit parkinson).
- mempunyai sejarah methemoglobin berlebihan dalam darah disebabkan oleh kekurangan enzim NADH-cytochrome B5 reductase.

Kanak-kanak

Tidak boleh digunakan pada kanak-kanak di bawah satu tahun.

- Sebelum mula menggunakan SW Metoclopramide Tablet

Beritahu doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda:

- mempunyai masalah buah pinggang atau hati.
- mengalami gangguan neurologi (seperti penyakit parkinson).
- mempunyai masalah jantung.

Mengandung dan penyusuan bayi

Bincang dengan doktor anda jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau menyusukan bayi.

Tiada bukti mencukupi yang menunjukkan penggunaannya adalah selamat dalam tempoh kehamilan ibu mengandung. Ia boleh diguna oleh wanita hamil hanya jika diperlukan.

Metoclopramide hydrochloride didapati dalam susu ibu dan boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini. Berjaga-jaga ketika menyusukan badan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Terdapat beberapa ubat yang boleh berinteraksi dengan SW Metoclopramide Tablet. Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Anda perlu berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat seperti yang berikut:-

- Alkohol, hipnotik, sedatif, penenang, dan lain-lain).

- Ubat untuk kemurungan dikenali sebagai Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOIs).
- Ubat tahan sakit (seperti acetaminophen).
- Antibiotik (seperti tetracycline).
- Cyclosporine, ubat untuk mencegah penolakan organ.
- Ubat untuk merawat penyakit Parkinson (contoh: levodopa).
- Ethanol.
- Digoxin, ubat untuk masalah jantung.

Cara menggunakan SW Metoclopramide Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Anda perlu mengambil SW Metoclopramide Tablet seperti yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Pengambilan Oral.

Dewasa

Dos yang disyorkan ialah 1 tablet diambil untuk tiga kali sehari. Dos harian maksimum yang disyorkan ialah 3 tablet atau 0.5mg/kg berat badan.

Kanak-kanak

Umur 9-15 tahun (berat badan 30-60kg): Separuh tablet.

Umur 15-18 tahun (berat badan melebihi 60kg): 1 tablet.

Jumlah dos harian metoclopramide, terutama untuk kanak-kanak dan orang muda, biasanya tidak boleh melebihi 0.5mg / kg berat badan.

Tablet tidak sesuai digunakan pada kanak-kanak dengan berat badan kurang dari 30kg.

Warga tua

Pengurangan dos harus dipertimbangkan pada orang tua, berdasarkan fungsi buah pinggang, hati dan kesihatan secara keseluruhan.

Kegagalan buah pinggang

Orang yang mengalami kegagalan buah pinggang peringkat akhir, dos harian perlu dikurangkan sebanyak 75%.

Orang yang mengalami masalah buah pinggang yang sederhana atau teruk, dos harian perlu dikurangkan sebanyak 50%.

Kegagalan hati

Orang yang mempunyai kegagalan hati yang teruk, dos perlu dikurangkan sebanyak 50%.

- Bila perlu digunakan

Gunakan SW Metoclopramide Tablet sehingga 3 kali sehari atau mengikut preskripsi doktor dengan selang masa sekurang-kurangnya 6 jam antara dua dos walaupun muntah berlaku.

- Berapa lama perlu digunakan

Ia adalah penting untuk mengambil SW Metoclopramide Tablet mengikut tempoh yang ditetapkan oleh doktor. Tempoh rawatan maksimum adalah 5 hari.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga itu untuk mengambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan terlalu banyak tablet boleh menyebabkan mengantuk, kekeliruan atau simptom ekstrapiramidal (sila rujuk pada kesan-kesan sampingan untuk perincian simptom) mungkin berlaku.

Semasa menggunakan SW Metoclopramide Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil SW Metoclopramide Tablet.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandung semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.

- Jangan berikan SW Metoclopramide Tablet kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau masalah seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati apabila melakukan aktiviti yang memerlukan kecerdasan mental seperti memandu kereta atau mengendalikan jentera sehingga anda mengetahui kesan SW Metoclopramide Tablet terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, SW Metoclopramide Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Kesan-kesan sampingan yang paling biasa dilaporkan adalah kegelisahan, kurang bertenaga, mengantuk, keletihan dilaporkan berlaku kira-kira pada 10% orang.

Kesan sampingan lain seperti kesukaran untuk tidur, sakit kepala, pening, loya atau gangguan pencernaan. Kesan ekstrapiramidal terutamanya pengecutan otot yang tidak terkawal cenderung berlaku pada kanak-kanak sejurus selepas permulaan terapi dan biasanya dengan dos yang lebih tinggi. Kemurungan dan masalah hilang kawalan pergerakan badan yang berterusan dilaporkan tetapi jarang.

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin juga boleh berlaku pada sesetengah orang. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami kesan sampingan lain semasa mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan SW Metoclopramide Tablet

- Penyimpanan

Simpan pada atau di bawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet cembung berbentuk bulat, berwarna putih, dengan skor tunggal di satu permukaan sahaja.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
- Metoclopramide hydrochloride

- Bahan- bahan tidak aktif

- Lactose
- Corn Starch
- Magnesium Stearate
- Polyvinylpyrrolidone (PVP K-90)
- Isopropyl Alcohol (IPA)

- Nombor MAL

- MAL19870956AZ
- MAL20051301ASZ

Pengilang

(MAL19870956AZ)
Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No. 9,11 & 17, Jalan Kempas 4, Taman Perindustrian Tampoi Indah, 81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

(MAL20051301ASZ)
Sunward Pharmaceutical Pte.Ltd
No.11,Wan Lee Road
627943, Singapore.

Pemegang Pendaftaran Produk

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No.9,11 & 17, Jalan Kempas 4, Taman Perindustrian Tampoi Indah, 81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

19/12/2022

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)231122/00105