

TRICONAZOLE CREAM

Triamcinolone Acetonide / Econazole Nitrate (0.1% w/w / 1.0% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Triconazole Cream
2. Bagaimana Triconazole Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Triconazole Cream
4. Cara menggunakan Triconazole Cream
5. Semasa menggunakan Triconazole Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Triconazole Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Triconazole Cream

Triconazole Cream digunakan untuk merawat keradangan kulit yang disebabkan olehjangkitan kulat (seperti kurap, yis, atau kulat) atau jangkitan bakteria.

Bagaimana Triconazole Cream berfungsi

Bahan aktif dalam ubat ini ialah triamcinolone acetonide dan econazole nitrate.

Triamcinolone tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai kortikosteroid. Ia membantu mengurangkan keradangan dan rasa gatal.

Econazole ialah sejenis agen antikulat yang merawat jangkitan kulat pada kulit.

Sebelum menggunakan Triconazole Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan Triconazole Cream jika anda hipersensitif kepada triamcinolone acetonide, econazole nitrate, kortikosteroid lain, atau sebarang bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan pada Maklumat Lanjut).

- Sebelum menggunakan Triconazole Cream

Beritahu doktor anda sebelum menggunakan Triconazole Cream.

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

Triconazole Cream hanya boleh digunakan semasa kehamilan jika manfaatnya melebihi risiko kepada janin.

Tidak diketahui sama ada Triconazole Cream dirembeskan ke dalam susu ibu atau tidak. Oleh itu, ubat ini hanya boleh digunakan sekiranya manfaatnya melebihi risiko.

Penggunaan pada kanak-kanak

Ubat ini harus digunakan dengan berhati-hati pada kanak-kanak.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan. Anda perlu berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil:-

- Ubat cair darah seperti warfarin atau acenocoumarol.

Cara menggunakan Triconazole Cream

- Berapa banyak harus digunakan

Kegunaan topikal.

Sapukan krim pada kulit yang terjejas dua kali sehari.

- Bila perlu digunakan

Sapukan dua kali sehari atau mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini untuk tempoh yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat jika anda atau sesiapa menggunakan dos berlebihan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa.

Semasa menggunakan Triconazole Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Triconazole Cream.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan mengambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Jangan berikan Triconazole Cream kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau masalah yang sama seperti anda.
- Jangan sapukan krim dekat atau di dalam mata.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera
Berhati-hati semasa memandu atau menggunakan jentera sehingga anda mengetahui tentang kesan Triconazole Cream terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Triconazole Cream boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Kesan-kesan sampingan adalah:

- Gatal
- Rasa terbakar
- Rasa menyengat
- Kemerahan pada kulit
- Kulit kering
- Folikel rambut yang meradang (seperti benjolan merah kecil)
- Pertumbuhan rambut yang tidak biasa
- Jerawat atau
- Pencerahan kulit
- Ruam di sekeliling mulut
- Reaksi alahan pada kulit
- Kulit menjadi lembik dan lembap (terutamanya di lipatan kulit)
- Jangkitan baru pada kulit
- Penipisan kulit
- Tanda regangan
- Ruam haba (benjolan kecil yang gatal, terutamanya di kawasan panas atau berpeluh)

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin juga boleh berlaku pada sesetengah orang. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami kesan sampingan lain semasa mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Triconazole Cream

- Penyimpanan

Simpan pada atau di bawah suhu 30°C.
Lindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim putih dan lembut.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
 - Triamcinolone Acetonide
 - Econazole Nitrate

- Bahan tidak aktif
 - Cetostearyl Alcohol
 - Cetomacrogol 1000
 - Vaseline (White Soft Paraffin)
 - Propylene Glycol
 - Chlorocresol
 - EDTA (Disodium Edetate)
 - Purified Water

- Nombor Mal

MAL19921228AZ

Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No. 9,11 & 17, Jalan Kempas 4,
Taman Perindustrian Tampoi Indah,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh Kemas Kini RiMUP

08/04/2026

Nombor Siri:

NPRA(R2/1)260304/00024