

LOBESOL CREAM

Clobetasol Propionate (0.05% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Lobesol Cream
2. Bagaimana Lobesol Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Lobesol Cream
4. Cara menggunakan Lobesol Cream
5. Semasa menggunakan Lobesol Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Lobesol Cream
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Lobesol Cream

Ia digunakan untuk tempoh yang singkat bagi melegakan keradangan dan kegatalan yang disebabkan oleh sesetengah masalah kulit yang sederhana atau teruk, dan bertindak balas terhadap terapi kortikosteroid topikal.

Bagaimana Lobesol Cream berfungsi

Bahan aktif dalam ubat ini adalah clobetasol propionate iaitu kortikosteroid yang mengurangkan kemerahan, kegatalan, bengkak, serta sebarang kerengsaan pada kulit.

Sebelum menggunakan Lobesol Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Lobesol Cream jika anda hipersensitif kepada clobetasol propionate atau kortikosteroid lain ataupun sebarang bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).

- Sebelum mula menggunakan Lobesol Cream

Periksa dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan Lobesol Cream.

Mengandung dan menyusukan anak

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau menyusukan badan sebelum menggunakan sebarang ubat.

Jangan gunakan Lobesol Cream jika anda hamil (melainkan diarahkan oleh doktor anda), kerana ia boleh menyebabkan kemudaratan kepada bayi anda. Krim ini tidak boleh digunakan dalam kuantiti yang berlebihan atau untuk tempoh masa yang lama pada wanita hamil.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Anda perlu berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat seperti yang berikut: -

- ubat untuk merawat jangkitan HIV (contoh: Ritonavir).
- ubat untuk merawat jangkitan kulat (contoh: Itraconazole).

Cara menggunakan Lobesol Cream

- Berapa banyak harus digunakan

Penggunaan secara topikal sahaja.

Sapu secukupnya pada kawasan kulit yang terjejas.

- Bila perlu digunakan

Sapu Lobesol Cream dua kali sehari, iaitu pada waktu pagi dan petang atau mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan Lobesol Cream untuk tempoh yang disyorkan oleh doktor.

Ini adalah kortikosteroid yang sangat kuat, oleh itu, tidak disarankan untuk disapu secara berlebihan dalam tempoh yang singkat. Tempoh penggunaan ubat ini tidak boleh melebihi 14 hari.

Sekiranya masalah tidak bertambah baik dalam tempoh 14 hari, sila berjumpa kembali doktor / ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Sapu dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapu dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terguna dos berlebihan atau tidak sengaja tertelan ubat ini. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Lobesol Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda menggunakan Lobesol Cream.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandung semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan mengambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Jangan berikan Lobesol Cream kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau masalah seperti anda.
- Jangan balut kawasan kulit yang dirawat dengan pembalut kedap udara kecuali diarahkan oleh doktor anda, kerana ini boleh meningkatkan risiko kesan sampingan.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda mengalami sebarang kerengsaan kulit atau sebarang jangkitan, rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat.

Elakkan penggunaan berterusan untuk jangka masa panjang atau menyapu krim secara berlebihan, kerana ia boleh menjejaskan sistem hormon badan anda (HPA axis).

Jika penglihatan anda menjadi kabur atau berlaku masalah mata yang lain, maklumkan kepada doktor anda dengan segera.

Jika anda mempunyai jangkitan kulit, gunakan krim ini bersama ubat antikulat atau antibakteria yang sesuai. Jika jangkitan tidak bertambah baik, hentikan penggunaan steroid sehingga jangkitan dikawal.

Memandu dan menggunakan jentera

Berhati-hati semasa memandu atau menggunakan jentera sehingga anda mengetahui tentang kesan Lobesol Cream terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Lobesol Cream boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Kesan sampingan yang pernah dilaporkan adalah seperti berikut:

• Kulit: Anda mungkin mengalami masalah kulit seperti ruam di sekitar mulut, tindak balas alahan kulit, kulit lembut atau lembap, penipisan kulit, tanda regangan pada kulit, ruam panas, atau jangkitan.

• Kesan pada hormon: Ubat ini boleh menyerap ke dalam badan, berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan hormon sementara, gejala sindrom Cushing (contoh; berat badan bertambah, muka bulat), gula tinggi dalam darah (hiperglisemia), atau gula dalam air kencing (glukosuria).

• Penglihatan: Sesetengah orang mungkin mengalami penglihatan kabur.

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin juga boleh berlaku pada sesetengah orang. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami kesan sampingan lain semasa menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Lobesol Cream

- Penyimpanan

Simpan pada atau di bawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim putih dan licin.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Clobetasol Propionate

- Bahan- bahan tidak aktif

- Chlorocresol
- Cetostearyl Alcohol
- Purified Water
- Vaseline (White Soft Paraffin)

- Propylene Glycol
- Cetomacrogol 1000
- EDTA (Disodium Edetate)

- Nombor MAL

MAL19921281AZ

Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No. 9,11 & 17, Jalan Kempas 4, Taman
Perindustrian Tampoi Indah, 81200
Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

25/08/2025

Nombor Siri

NPRA(R4/1)280125/00009