

SUNITON TABLET

Orphenadrine Citrate / Paracetamol (35mg / 450mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Suniton Tablet
2. Bagaimana Suniton Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Suniton Tablet
4. Cara menggunakan Suniton Tablet
5. Semasa menggunakan Suniton Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Suniton Tablet
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Suniton Tablet

Suniton Tablet digunakan untuk melegakan sakit otot serta sakit kepala.

Bagaimana Suniton Tablet berfungsi

Orphenadrine adalah penenang otot yang bertindak pada sistem saraf untuk menghasilkan kesan pengenduran otot. Paracetamol adalah analgesik (penahan sakit) dan antipiretik (melegakan demam).

Sebelum menggunakan Suniton Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Suniton Tablet jika anda:

- hipersensitif kepada orphenadrine citrate, paracetamol ataupun mana-mana bahan kandungan lain ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut)
- mempunyai glaukoma (peningkatan tekanan dalam mata).
- mengalami *pyloroduodenal obstruction* (halangan aliran keluar gastrik).
- mempunyai ulser perut.
- mempunyai masalah pembesaran prostat atau halangan di leher pundi kencing.
- mempunyai otot yang amat lemah.
- ada masalah hati atau buah pinggang.

- Sebelum mula menggunakan Suniton Tablet

Anda perlu menyemak dengan doktor anda jika anda mempunyai:

- kadar dengupan jantung cepat atau penyakit jantung/saluran darah yang lain.
- fungsi hati dan buah pinggang yang tidak normal.

Penyediaan ini mengandungi Paracetamol.

Jangan mengambil ubat lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama.

Mengandung dan penyusuan bayi

Beritahu doktor anda jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau menyusukan bayi.

Ujian makmal

Beritahu doktor anda bahawa anda mengambil Suniton Tablet sebelum melakukan ujian makmal.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai ubat makanan untuk kesihatan. Anda perlu berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat seperti yang berikut: -

- ubat untuk merawat kesakitan dan keradangan seperti phenylbutazone, aminopyrine, griseofulvin and hexobarbital.
- ubat untuk sawan seperti phenobarbitone.
- alkohol.
- ubat untuk merawat kanser (doxorubicin).
- kontraseptif, ubat untuk mencegah kehamilan.
- ubat antikolinergik untuk merawat anti-depresan dan antihistamin.

Cara menggunakan Suniton Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Ambil satu hingga dua tablet.

- Bila perlu digunakan

Ambil tiga kali sehari atau seperti diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil Suniton Tablet selama tempoh yang disyorkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga itu untuk mengambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan Suniton Tablet rasa teruja, kekeliruan, kekeliruan atau keadaan serius seperti koma. Sawan, kadar dengupan jantung cepat dengan anak mata mengembang, kesukaran untuk mengeluarkan air kencing dan juga kerosakan hati boleh berlaku.

Semasa menggunakan Suniton Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

- Gunakan Suniton Tablet hanya dengan preskripsi doktor.
- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Suniton Tablet.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandung semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Jangan berikan Suniton Tablet kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau masalah seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening atau pengsan, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Amaran alergi: Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Gejala mungkin termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Ini boleh menjadi tanda-tanda keadaan serius. Sekiranya tindak balas ini berlaku, hentikan menggunakan dan mendapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Suniton Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Kesan-kesan sampingan yang disebabkan orphenadrine citrate adalah:

- kekeringan mulut
- kadar dengupan jantung cepat / denyutan jantung yang kuat
- kesukaran untuk mengeluarkan air kencing
- penglihatan kabur
- anak mata mengembang
- tekanan mata meningkat
- lemah
- loya
- muntah-muntah
- sakit kepala
- sembelit
- reaksi hipersentif
- gatal
- halusinasi
- rasa gelisah / menggigil
- sakit gastrik
- geligata (jarang) serta masalah kulit yang lain.

Kesan-kesan sampingan disebabkan paracetamol ialah:

- Hematologi: bilangan sel darah merah, sel darah putih dan platelet yang rendah.
- Kulit: ruam, reaksi kulit yang teruk seperti sindrom Stevens Johnson atau *toxic epidermal necrolysis* (sindrom Lyell's).

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin juga boleh berlaku pada sesetengah orang. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami kesan sampingan lain semasa mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Suniton Tablet

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bulat dan rata yang berwarna putih dengan skor tunggal pada satu permukaan sahaja.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Orphenadrine citrate
- Paracetamol

- Bahan- bahan tidak aktif

- Corn Starch
- Sodium Starch Glycolate
- Magenesium Streate
- Isopropyl alcohol
- Polyvinylpyrrolidone (Kolidon 90F)
- Polyvinylpyrrolidone (K90)

- Nombor MAL

MAL20012742AZ

Pengilang

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No. 9,11 & 17, Jalan Kempas 4, Taman Perindustrian Tampoi Indah, 81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No.9,11 & 17, Jalan Kempas 4, Taman Perindustrian Tampoi Indah, 81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh Kemas kini RiMUP

20/04/2023

Nombor Siri

NPRA(R2/1)230419/1047