

FENAGESIC CAPSULE

Mefenamic Acid (250mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah Kegunaan Fenagesic Capsule
2. Bagaimana Fenagesic Capsule berfungsi
3. Sebelum menggunakan Fenagesic Capsule
4. Cara menggunakan Fenagesic Capsule
5. Semasa menggunakan Fenagesic Capsule
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan Fenagesic Capsule.
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah Kegunaan Fenagesic Capsule

Ia digunakan untuk rawatan Primary Dysmenorrhea (sakit haid) dan melegakan kesakitan sederhana apabila terapi tidak akan melebihi satu minggu.

Bagaimana Fenagesic Capsule Berfungsi

Fenagesic Capsule mengandungi bahan yang dikenali sebagai Mefenamic acid. Ia tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai ejen anti-radang bukan steroid (NSAID) yang mengurangkan demam, kesakitan dan keradangan.

Sebelum menggunakan Fenagesic Capsule

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan Fenagesic capsule:

- Jika anda mempunyai alahan atau hipersensitiviti kepada Mefenamic acid atau mana-mana bahan kandungan lain yang disenaraikan di akhir risalah ini.
- Jika anda mempunyai asma, rinitis (radang membran mukus di hidung), urtikaria (gatal ataupun ruam) atau simptom menjadi lebih teruk disebabkan oleh Aspirin atau NSAID.
- Jika anda mempunyai ulser aktif.
- Jika anda mempunyai keradangan yang kronik pada bahagian atas atau bawah perut dan usus.
- Jika anda mempunyai penyakit buah pinggang.

- Sebelum menggunakan Fenagesic Capsule

Anda perlu menyemak dengan doktor anda:-

- Jika anda mempunyai masalah jantung atau strok.
- Jika anda mempunyai tekanan darah tinggi
- Jika anda mempunyai masalah buah pinggang atau hati.

- Jika anda mengambil anti-koagulan (ejen darah penipisan)
- Jika anda mempunyai atau telah mempunyai ulser, pendarahan atau penembusan perut dan usus.
- Jika anda mengalami dispepsia (rasa tidak selesa di sekitar epigastric kerana masalah pencernaan).
- Fenagesic capsule boleh menyebabkan alahan kulit yang teruk, contohnya exfoliative dermatitis, toxic epidermal necrolysis, Steven-Johnson Syndrome. Simptom-simptom adalah ruam kulit, kulit melepuh dan mengelupas. Simptom ini menjadi tanda-tanda keadaan serius. Jika tindak balas ini berlaku, berhenti menggunakannya dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Sila rujuk doktor anda sebelum menggunakan Fenagesic Capsule jika anda mengandungi, merancang untuk mengandungi, menyusukan anak atau berniat untuk menyusukan. Doktor anda akan menimbang risiko dan manfaat pengambilan Fenagesic Capsule terhadap anda.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sesetengah ubat dan Fenagesic capsule boleh bertindak balas antara satu sama lain. Adalah penting untuk memberitahu doktor atau ahli farmasi anda mengenai semua ubat yang anda ambil, termasuk yang diperolehi tanpa preskripsi doktor. Anda perlu berbincang dengan doktor anda atau ahli farmasi jika anda mengambil seperti berikut :-

- Ejen antikoagulan oral, ubat yang digunakan untuk penipisan darah
- Lithium, digunakan untuk kemurungan

Cara menggunakan Fenagesic Capsule

- Berapa banyak harus digunakan

Secara Oral :

Regimen yang disyorkan dalam kesakitan akut untuk orang dewasa dan kanak-kanak lebih 14 tahun adalah 500mg tiga kali sehari, biasanya tidak melebihi satu minggu. Untuk rawatan seggungut atau sakit haid, dos yang disyorkan adalah 500mg tiga kali sehari bermula dengan bermulanya pendarahan dan gejala yang berkaitan. Mefenamic Acid tidak boleh digunakan lebih daripada 7 hari pada satu masa. Anda harus bincang dengan doktor anda mengenai Fenagesic capsule jika anda di bawah umur 14 tahun.

- Bila perlu digunakan

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat.

- Berapa lama perlu digunakan

Ikut arahan yang telah ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jangan gandakan dos anda. Ambil dos seperti biasa bila tiba waktu untuk dos seterusnya.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital terdekat anda, jika anda sesiapa sahaja yang menggunakan terlalu banyak ubat ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera. Mengambil terlalu banyak kapsul boleh menyebabkan cirit-birit, loya dan ataupun tanpa muntah, sakit perut, mengantuk, pening, ketakutan, sakit kepala, penglihatan kabur, sawan, *Dyskinesia* (pergerakan luar kawal), kegagalan buah pinggang, koma dan kematian.

Semasa menggunakan Fenagesic Capsule

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil Fenagesic capsule mengikut arahan doktor.

- Perkara yang tidak perlu dilakukan

Jangan kongsi ubatan anda dengan orang lain walaupun mereka mengalami masalah yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati ketika memandu kenderaan atau mengendalikan mesin sehingga anda mengetahui kesan Fenagesic Capsule terhadap anda. Rujuk doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan yang dinyatakan.

Kesan-kesan Sampingan

Seperti semua ubat, Fenagesic capsule boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang akan mengalami. Berjumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

Mefenamic Acid boleh membawa gangguan pada perut dan usus. Pendarahan pada usus dan perut mungkin berlaku.

Gangguan darah yang lain seperti anemia hemolitik, agranulocytosis, pancytopenia, thrombocytopenia, purpura thrombocytopenic dan sum-sum tulang aplasia mungkin berlaku. Simptom seperti cirit- birit atau ruam kulit adalah petunjuk untuk memberhentikan pengambilan ubat tersebut

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Fenagesic Capsule

- Penyimpanan

Simpan pada suhu dibawah 30°C. Lindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Jangan buang ubat-ubatan yang berlebihan secara sebarangan. Dapatkan nasihat ahli farmasi anda mengenai cara-cara pelupusan ubat

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Kapsul: Ivory / biru, saiz 1 kapsul.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Mefenamic Acid

- Bahan tidak aktif

- Maize Starch
- Magnesium Stearate

- Nombor MAL

MAL19861049AZ

MAL20051300ASZ

Pengilang

(MAL20051300ASZ)

Sunward Pharm PTE.LTD No.11,
Wan Lee Road, Jurong 2262,
Singapore.

(MAL19861049AZ)

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
9,11 & 17 Jalan Kempas 4,
Taman Perindustrian Tampoi Indah,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No.9,11 & 17, Jalan Kempas 4, Taman
Perindustrian Tampoi Indah, 81200
Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

03/11/2020

Nombor siri

NPRA(R2/1)201028/547