

LINDACIN CAPSULES 150MG “S.T.” (CLINDAMYCIN)

Clindamycin hydrochloride (150mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Lindacin Capsules
2. Bagaimana Lindacin Capsules berfungsi
3. Sebelum menggunakan Lindacin Capsules
4. Cara menggunakan Lindacin Capsules
5. Semasa menggunakan Lindacin Capsules
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Lindacin Capsules
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Lindacin Capsules

Ia digunakan sebagai antibiotik untuk merawat jangkitan serius seperti jangkitan serius pada saluran pernafasan, jangkitan serius pada kulit dan tisu lembut, septikemia (keracunan darah), jangkitan intra-abdominal (keradangan tisu organ), jangkitan di pinggul dan saluran kemaluan wanita (contohnya: keradangan lapisan dalaman rahim, radang tuba ovari (Tubo-ovarian abscess), jangkitan di bawah permukaan kulit pelvik dan jangkitan pada faraj selepas pembedahan kerana terdedah kepada bakteria anaerobes, streptococci, pneumococci dan staphylococci.

Ia harus digunakan dengan berhati-hati semasa menggunakan penisilin

Bagaimana Lindacin Capsules berfungsi

Bahan aktif dalam ubat ini adalah clindamycin. Clindamycin berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh aktiviti mikrob.

Sebelum menggunakan Lindacin Capsules

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Lindacin Capsules jika anda:-

- hipersensitif kepada clindamycin atau lincomycin atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).
- menghadapi meningitis (Pembengkakan pada membran yang meliputi otak dan saraf tunjang akibat jangkitan bakteria atau virus).

Lindacin Capsules tidak boleh digunakan pada bayi yang baru lahir kerana kemungkinan reaksi alahan yang teruk.

- Sebelum menggunakannya

Bincang dengan doktor anda sebelum menggunakan Lindacin Capsules jika anda;

- mempunyai masalah saraf dan otot.
- pengambilan ubat bersama erythromycin.
- menghadapi penyakit teruk yang lain.
- mempunyai sejarah lampau penyakit gastrousus.
- mempunyai ekzema (dermatitis atopik).
- telah dijangkiti dengan yis.
- anda mengalami masalah buah pinggang.

Sesetengah ubat boleh meningkatkan kesan Lindacin Capsules dan doktor anda perlu memantau anda dengan teliti jika anda mengambil ubat ini (termasuk beberapa ujian seperti ujian fungsi hati, buah pinggang secara berkala dan ujian darah (Full Blood Count)).

Mengandung dan menyusukan anak

Beritahu doktor anda jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau menyusukan bayi.

Lindacin Capsules harus digunakan dengan berhati-hati semasa mengandung. Tiada bukti mencukupi yang menunjukkan penggunaannya adalah selamat dalam tempoh kehamilan ibu mengandung. Jaminan kesihatan ketika mengandung tidak dapat dipastikan. Langkah berjaga-jaga perlu diambil apabila menyusukan anak kerana clindamycin boleh didapati dalam susu ibu dan boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Anda perlu berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil seperti berikut: -

- agen neuromuskular lain digunakan untuk sakit otot dan saraf.
- ubat untuk rawatan cirit-birit.
- antibiotik (contohnya, erythromycin).

Cara menggunakan Lindacin Capsules

- Berapa banyak harus digunakan

Anda perlu mengambil Lindacin Capsules dengan tepat seperti yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi. Keperluan dos adalah berbeza dan mesti disesuaikan berdasarkan penyakit dan tindak balas individu.

Jangan ambil lebih atau kurang daripada apa yang doktor anda tetapkan.

Pengambilan Oral.

Dewasa:

- jangkitan kecil hingga sederhana - 150mg hingga 300mg setiap 6 jam sehari.
- jangkitan teruk - 300mg hingga 450mg setiap 6 jam sehari.

Kanak-kanak:

- jangkitan kecil hingga sederhana - dos diselaraskan antara 8mg hingga 16mg/kg/hari (4 hingga 8mg/lb/hari) mengikut berat badan kanak-kanak dan dibahagikan sama rata kepada tiga atau empat dos setiap hari.
- jangkitan teruk - dos diselaraskan antara 16mg hingga 20mg/kg/hari (8 hingga 10mg/lb/hari) mengikut berat badan kanak-kanak dan dibahagikan sama rata kepada tiga atau empat dos setiap hari.

- Bila perlu digunakan

Lindacin Capsules perlu diambil dengan segelas air penuh dan sekurang-kurangnya 30 minit sebelum berbaring.

- Berapa lama perlu digunakan

Ia adalah penting untuk mengambil Lindacin Capsules seperti ditetapkan oleh doktor.

- Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Jika ia hampir dengan masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga itu untuk mengambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Lindacin Capsules

Ianya penting untuk memastikan pematuhan terhadap panduan pengambilan kerana risiko kerengsaan perut dan tekak (rujuk Cara menggunakan Lindacin Capsules).

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Lindacin Capsules.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandung semasa mengambil ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Jangan berikan Lindacin Capsules kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda mengalami apa-apa kesan sampingan, kerengsaan atau jangkitan, anda perlu berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat.

Memandu dan menggunakan jentera

Berhati-hati semasa memandu atau menggunakan jentera sehingga anda mengenal pasti tentang kesan Lindacin Capsules terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubat lain, Lindacin Capsules boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami sebarang kesan sampingan seperti berikut :

Gastrosus: Sakit abdomen, radang kerongkong, loya, muntah, cirit-birit. Radang/ ulser daripada tekak sehingga ke lapisan saluran perut.

Hipersensitif: kulit ruam (seperti maculo papular), kulit lepuh, gegata. Sindrom hipersensitif dilaporkan jarang berlaku di mana satu atau lebih ciri-ciri berikut seperti anafilaksis (reaksi alergi imunologi akut), reaksi kulit yang serius seperti erythema (kemerahan pada kulit), sindrom *Steven-Johnson*.

Kulit: Pruritus (gatal), masalah keputihan dalam wanita, *dermatitis exfoliative*.

Hati: Penyakit kuning, keabnormalan fungsi hati ditunjukkan dalam ujian makmal.

Buah pinggang: Kegagalan buah pinggang telah dilaporkan jarang berlaku walaupun tiada hubungan langsung antara clindamycin dan buah pinggang.

Hematologi: Perubahan sementara dalam kiraan neutrofil dan eosinofil. Bilangan sel platelet berkurangan.

Muskuloskeletal: Contoh-contoh penyakit otot autoimun yang serius seperti polyarthrititis telah dilaporkan.

Jika anda mengalami kekurangan pengeluaran air kencing, pengekalan cecair yang menyebabkan bengkak pada kaki, buku lali atau kaki anda, sesak nafas atau loya anda harus menghubungi doktor anda dengan segera.

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin juga boleh berlaku pada sesetengah orang. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami simptom-simptom lain semasa mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan adverse ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Adverse Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Lindacin Capsules

- Penyimpanan

Simpan pada suhu bilik terkawal sehingga 30°C.

- Pelupusan

Ubat ini tidak boleh dilupuskan melalui air kumbahan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Serbuk putih diisi dalam kapsul jenis No.1 berwarna merah pada penutup dan berwarna ungu pada permukaan badan kapsul dengan skor “ST” berwarna putih pada permukaan 023 kapsul.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan-bahan aktif
- Clindamycin Hydrochloride

- Bahan tidak aktif

- Corn Starch
- Lactose
- Talc

- Nombor MAL

MAL07082868AZ

Pengilang

Taiwan Biotech Co., Ltd.
22, Chieh-Shou Road,
Taoyuan, Taiwan.

Pemegang Pendaftaran Produk

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No. 9,11 & 17, Jalan Kempas 4,
Taman Perindustrian Tampoi Indah,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

23/06/2026

Nombor Siri

NPRA(R2/2)260514/00066