

CONMY TABLETS

Terazosin Hydrochloride (2mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Conmy Tablets 2mg
2. Bagaimana Conmy Tablets 2mg berfungsi
3. Sebelum mengguna Conmy Tablets 2mg
4. Cara menggunakan Conmy Tablets 2mg
5. Semasa menggunakan Conmy Tablets 2mg
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Conmy Tablets 2mg
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Conmy Tablets 2mg

Ia digunakan sebagai rawatan untuk mengawal tekanan darah tinggi dan memudahkan pengaliran air kencing dalam kalangan lelaki disebabkan oleh pembesaran kelenjar prostat atau dikenali sebagai *symptomatic benign prostatic hyperplasia* (BPH).

Bagaimana Conmy Tablets 2mg berfungsi

Terazosin berfungsi untuk mengendurkan otot-otot tegang di leher prostat dan prostat serta menambahbaikan pengaliran air kencing.

Sebelum mengguna Conmy Tablets 2mg

- Bila tidak boleh mengguna

Jangan gunakan Conmy Tablets 2mg jika anda: -

- mengalami kegagalan jantung disebabkan oleh halangan mekanikal.
- hipersensitiviti kepada Terazosin hydrochloride atau mana-mana bahan kandungan yang disenaraikan pada akhir risalah ini.

- Sebelum mula mengguna

Bincang dengan doktor anda sebelum mengguna Conmy Tablets 2mg jika anda;

- mempunyai masalah tekanan darah rendah.

Mengandung dan penyusuan bayi

Beritahu doktor anda jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau menyusukan bayi. Kandungan and kesan Terazosin hydrochloride semasa penyusuan bayi tidak diketahui.

Kanak-kanak

Keselamatan dan keberkesanan pada kanak-kanak belum ditentukan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Terdapat beberapa ubatan yang boleh berinteraksi dengan Conmy Tablets 2mg. Adalah penting untuk memberitahu doktor atau ahli farmasi anda mengenai semua ubat-ubatan yang anda ambil, termasuk yang diperolehi tanpa preskripsi doktor. Anda perlu berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil seperti berikut: -

- ubat yang digunakan untuk tahan sakit / anti-radang (seperti acetaminophen, aspirin, codeine, ibuprofen, indomethacin).
- agen ubat yang digunakan untuk mengawal tekanan darah tinggi (calcium channel blocker seperti verapamil).
- antibiotik (contohnya, erythromycin, trimethoprim and sulfamethoxazole).
- ubat untuk mengawal hidung tersumbat (seperti phenylephrine hydrochloride, phenylpropanolamine, pseudoephedrine).
- ubat untuk merawat gout (allopurinol).
- ubat untuk rawatan penyakit jantung atau tekanan darah tinggi (seperti atenolol, hydrochlorothiazide, methyclothiazide, dan propranolol).
- ubat mengandungi steroids.
- ubat untuk rawatan perut dan usus (seperti antacids).
- ubat untuk mengawal kencing manis.
- ubat mengandungi sedatif dan penenang untuk kemurungan (contoh, diazepam).
- ubat mengandungi chlorpheniramine.

Cara menggunakan Conmy Tablets 2mg

- Berapa banyak harus digunakan

Anda perlu mengambil Conmy Tablets 2mg dengan tepat seperti yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi. Keperluan dos adalah berbeza dan mesti disesuaikan berdasarkan penyakit dan tindak balas individu. Jangan mengambil lebih atau kurang daripada apa yang doktor anda tetapkan. Dos permulaan yang disarankan perlu bermula dari 1 mg pada waktu tidur.

Pengambilan Oral.

Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)

Dos diambil meningkat secara beransur-ansur kepada 2mg, 5mg dan 10mg sekali sehari untuk mencapai manfaat yang diinginkan.

Tekanan darah tinggi

Dos yang disyorkan adalah 1-5mg sekali sehari pada waktu tidur.

Doktor anda mungkin menilai anda dengan meningkatkan dos secara perlahan bagi mendapatkan manfaat dari dos tertinggi iaitu 20mg untuk mencapai tekanan darah yang diinginkan dan memantau kekerapan dos untuk memastikan ia dalam keadaan terkawal.

- Bila perlu digunakan

Gunakan Conmy Tablets 2mg mengikut preskripsi doktor.

- Berapa lama perlu digunakan

Ia adalah penting untuk mengambil Conmy Tablets 2mg seperti ditetapkan oleh doktor.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga itu untuk mengambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan terlalu banyak ubat Conmy Tablet 2mg boleh menyebabkan tekanan darah rendah.

Semasa menggunakan Conmy Tablets 2mg

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Conmy Tablets 2mg.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandungi semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Jangan berikan Conmy Tablets 2mg kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Conmy Tablets 2mg boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Kesan sampingan yang paling biasa dilaporkan seperti rasa letih atau berasa kurang tenaga di dalam badan, jantung kuat berdebar, loya, cecair berlebihan bawah kaki atau tangan, mengantuk, hidung tersumbat atau berair dan penglihatan kabur.

Kesan-kesan sampingan lain termasuk pening dan pengsan apabila berdiri dengan cepat dari posisi berbaring atau duduk (*syncopal episodes*), sakit belakang, sakit kepala, tekanan darah rendah, denyutan jantung yang cepat, berat badan bertambah, sakit kaki dan tangan, keinginan untuk persetubuhan yang rendah, kemurungan, kegelisahan, sensasi abnormal seperti rasa kesemutan atau mencucuk, kesukaran bernafas, jangkitan sinus dan mati pucuk.

Pemasaran pasca : Kekurangan platelet dalam darah dan tempoh ereksi berpanjangan dalam zakar telah dilaporkan.

Ujian makmal: Pengurangan hematokrit (nisbah jumlah sel darah merah), hemoglobin, sel darah putih, jumlah protein dan albumin.

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin juga boleh berlaku pada sesetengah orang. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami simptom-simptom lain semasa mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No.Tel : 03-78835490, atau laman web nppra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Conmy Tablets 2mg

- Penyimpanan

Simpan dibawah 30°C. Lindugi daripada kanak-kanak dan cahaya matahari.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bulat dan rata berwarna jingga dengan ukiran “BH” dan bergaris pada satu permukaan

dan ukiran “S” pada sebelah permukaan lain.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Terazosin (2mg) bersamaan dengan Terazosin Hydrochloride Dihydrate 2.37mg.

- Bahan- bahan tidak aktif

- Corn Starch
- Iron Oxide (Yellow)
- Lactose Monohydrate
- Magnesium Stearate
- Povidone
- Sodium Starch Glycolate
- Purified Water

- Nombor MAL

MAL09100245AZ

Pengilang

Taiwan Biotech Co., Ltd.
22, Chieh-Shou Road,
Taoyuan, Taiwan.

Pemegang Pendaftaran Produk

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No. 9,11 & 17, Jalan Kempas 4,
Taman Perindustrian Tampoi Indah,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

21/05/2019

Nombor Siri

NPRA(R4/1)150519/00130