

SUN-GLIZIDE 30 MR TABLET

Gliclazide (30mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Sun-Glizide 30 MR Tablet
2. Bagaimana Sun-Glizide 30 MR Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Sun-Glizide 30 MR Tablet
4. Cara menggunakan Sun-Glizide 30 MR Tablet
5. Semasa menggunakan Sun-Glizide 30 MR Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Sun-Glizide 30 MR Tablet
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Sun-Glizide 30 MR Tablet

ia digunakan dalam rawatan diabetes mellitus/kencing manis yang tidak bergantung kepada insulin.

Bagaimana Sun-Glizide 30 MR Tablet berfungsi

Bahan aktif dalam ubat ini ialah Gliclazide yang tergolong dalam kumpulan 'sulphonylurea'. Ia merangsang penghasilan insulin oleh sel beta kelenjar pankreas.

Sebelum menggunakan Sun-Glizide 30 MR Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda alergi kepada Gliclazide atau bahan-bahan lain yang terkandung di dalam produk ini.
- Jika anda menghadapi penyakit kencing manis yang bergantung kepada insulin.
- Jika anda menghadapi penyakit ketoasidosis kencing manis (apabila sel-sel tidak mendapat glukosa yang mereka perlukan untuk tenaga, badan anda mula membakar lemak untuk tenaga, yang menghasilkan keton).
- Jika anda menghadapi masalah hati
- Jika anda menghadapi penyakit buah pinggang.
- Jika anda mengalami trauma yang teruk atau
- jangkitan.
- Jika mengandung atau menyusu

- Sebelum mula menggunakan Sun-Glizide 30 MR Tablet

- Dapatkan nasihat doktor jika anda:-
- Mengandung/Disyaki mengandung.
- Merancang untuk mengandung.
- Menyusu bayi.
- Akan menjalani pembedahan.
- Menghidapi penyakit buah pinggang

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai ubat makanan untuk kesihatan.

Anda perlu berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil :-

- Penyekat-beta
- Antibiotik
- Kortikosteroid
- Ubat tahan sakit(NSAIDs)
- Antikoagulan

Cara menggunakan Sun-Glizide 30 MR Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Pengambilan Oral

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda. Jangan ambil lebih atau kurang daripada amaun yang disyorkan.

Dos permulaan untuk pesakit dewasa adalah 30 mg sekali sehari. Dos maksima adalah 120mg sekali sehari

- Bila perlu digunakan

Sun-Glizide 30MR Tablet harus diambil sebaik sebelum makan. Pengambilan tablet perlu diikuti dengan makanan, untuk mengelakkan tercetusnya kemungkinan gangguan pencernaan. Telan ubat dengan air..

- Berapa lama perlu digunakan

Ia adalah penting untuk menggunakan Sun-Glizide 30 MR Tablet untuk tempoh yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jangan ambil dos tambahan untuk menggantikan dos yang terlepas. Ambil dos seperti biasa bila tiba waktu untuk dos seterusnya.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa.

Semasa menggunakan Sun-Glizide 30 MR Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

- Gunakan ubat anda dengan betul seperti yang diarahkan oleh doktor anda.
- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Sun-Glizide 30 MR Tablet.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandung semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Jangan berikan Sun-Glizide 30 MR Tablet kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau masalah seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin

Berhati-hati semasa memandu atau menggunakan jentera sehingga anda mengetahui tentang kesan Sun-Glizide 30 MR Tablet terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Sun-Glizide 30 MR Tablet, boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Kesan-kesan sampingan biasa adalah gangguan gastrousus dan hipoglisemia. Simptom hipoglisemia termasuk berpeluh, kelaparan dan lemah badan. Jika teruk, ia akan menyebabkan kekeliruan dan koma.

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin juga boleh berlaku pada sesetengah orang. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami simptom-simptom lain semasa mengambil ubat ini

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Tarikh Kemaskini RiMUP
22/05/2025

Nombor siri
NPRA(R2/1)231027/1165

Cara penyimpanan dan pelupusan Sun-Glizide 30 MR Tablet

- Penyimpanan

Simpan pada suhu 25°C dan jauhi daripada haba dan kelembapan yang terlampau.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet putih dan bujur cembung dengan skor 427 pada satu permukaan sahaja dan ST pada permukaan lain.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Gliclazide

- Bahan- bahan tidak aktif

- Magnesium stearate
- Povidone
- Dibasic calciumphosphate
- Polyvinyl alcohol

- Nombor MAL

MAL11030077AZ

Pengilang

Taiwan Biotech Co. Ltd
22, Chieh-Shou Road,
Taoyuan, Taiwan, R.O.C.

Pemegang Pendaftaran Produk

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No.9,11 & 17, Jalan Kempas 4,
Taman Perindustrian Tampoi Indah,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.