MONTEXIN CHEWABLE TABLETS

Montelukast (4mg, 5mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apa kegunaan *Montexin*
2. Bagaimana *Montexin* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Montexin*
4. Cara menggunakan *Montexin*
5. Semasa menggunakan Montexin
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Montexin*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini

Apakah kegunaan *Montexin*

1. Pencegahan dan rawatan asma kronik pada orang dewasa dan pesakit kanak-kanak berumur 12 bulan ke atas.
2. Melegakan gejala rinitis alergi (rinitis alergi bermusim pada orang dewasa dan pesakit kanak-kanak berumur 2 tahun ke atas).

Bagaimana *Montexin* berfungsi

Montexin mempunyai bahan aktif montelukast.

Montelukast adalah antagonis reseptor leukotriena yang menyekat bahan yang dipanggil leukotrien. Leukotrien menyebabkan penyempitan dan pembengkakan saluran udara di paru-paru dan juga menyebabkan gejala alergi. Dengan menyekat leukotrien, ia dapat memperbaiki gejala asma, membantu mengawal asma dan memperbaiki gejala alergi bermusim.

Sebelum menggunakan *Montexin*

Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Montexin jika anda mempunyai reaksi alergi (hipersensitiviti) terhadap montelukast atau bahan lain yang disenaraikan di hujung risalah ini.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil *Montexin* jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung. Jika anda menjadi hamil semasa mengambil *Montexin*, hentikan pengambilan dengan segera dan hubungi doktor anda.

Jangan ambil *Montexin* jika anda sedang menyusukan anak Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

Sebelum menggunakan Montexin

Beritahu doktor anda sebelum anda mengambil ubat jika anda :

- mempunyai fenilketonuria (gangguan yang diwarisi yang menyebabkan asid amino yang disebut fenilalanin menumpuk di dalam badan anda)
- alahan terhadap aspirin.
- Mempunyai alahan terhadap ubat-ubatan, makanan, bahan pengawet atau pewarna.

Montexin tidak disyorkan untuk serangan asma akut.

Ia tidak boleh digunakan sebagai terapi tunggal bagi rawatan dan pengurusan bronchospasm (penyempitan saluran udara yang masuk ke dalam paru-paru) yang disebabkan oleh senaman.

Doktor anda akan membincangkan risiko dan faedah yang terlibat.

Mengambil ubat-ubatan lain

Ubat-ubat lain mungkin terkesan dengan *Montexin*. Ia akan memberi kesan terhadap fungsi *Montexin.* Ia termasuk:

- *Theophylline*
- *Prednisone*
- *Prednisolone*
- *Oral contraceptives (norethindrone 1 mg/ethinyl estradiol 35 mcg)*
- *Terfenadine*
- *Digoxin*
- *Warfarin*
- *Cytochrome P450 enzyme inducers (eg., Phenobarbital or rifampin)*

Beritahu doktor anda jika anda mengambil ubat-ubatan yang disebutkan di atas atau ubat lain, termasuk ubat yang anda beli tanpa resep dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan anda.

Cara menggunakan *Montexin*

Berapa banyak harus digunakan

Montexin perlu diambil sehari sekali bersama air.

Asma atau rinitis alergi bermusim

Kanak-kanak berumur 6 hingga 14 tahun: satu tablet kunyah 5mg setiap hari

Kanak-kanak berumur 2 hingga 5 tahun: satu tablet kunyah 4mg setiap hari

Bila perlu digunakan

Untuk asma, *Montexin* perlu diambil pada waktu petang.

Untuk rinitis alergi bermusim, masa pengambilan mungkin disesuaikan mengikut keperluan anda sendiri.

Sekiranya anda menghidap asma dan rinitis alergi, sila ambil pada waktu petang.

Anda boleh mengambil tablet anda sebelum atau selepas makan.

Berapa lama perlu digunakan

Doktor anda boleh memberi anda maklumat lebih lanjut. Jangan berhenti mengambil Montexin atau ganti semasa mengambilnya tanpa bercakap dengan doktor anda.

Anda dinasihatkan untuk terus mengambil Montexin semasa asma anda terkawal, serta semasa asma memburuk.

Jika terlupa menggunakan

Ambil dos terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil berlebihan ubat ini. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Ciri-ciri terlebih dos ialah:

- Sakit perut
- Mengantuk
- Haus
- Sakit kepala
- Muntah
- Hiperaktif psikomotor

Semasa menggunakan Montexin

MONTEXIN CHEWABLE TABLETS

Montelukast (4mg, 5mg)

Perkara yang perlu dilakukan
Ambil ubat anda tepat seperti yang diberitahu oleh doktor anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Montexin.

Beritahu doktor anda dengan segera sekiranya anda hamil semasa mengambil ubat ini.

Sekiranya anda sensitif terhadap aspirin, teruskan menghindari pengambilan aspirin atau ubat lain yang disebut anti steroid ubat keradangan (NSAID) semasa mengambil tablet Montexin.

Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan berhenti mengambil ubat melainkan jika dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan mengambil ubat baru tanpa berunding dengan doktor anda.

Jangan berikan Montexin kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

Jangan mengambil Montexin jika anda memerlukan bantuan segera dari serangan asma secara tiba-tiba. Sekiranya anda mendapat serangan asma, anda harus mengikuti arahan yang diberikan oleh doktor anda untuk merawat serangan asma.

Perkara yang perlu diberi perhatian
Sentiasa bawa ubat penyedut penyelamat anda untuk serangan asma.

Jangan berhenti mengambil atau menurunkan dos ubat asma anda yang lain kecuali jika doktor memberitahu anda.

Kesan-kesan sampingan
Seperti semua ubat, Montexin boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya. Sekiranya ada kesan sampingan yang serius atau jika anda melihat kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Asma

Dewasa 15 tahun dan ke atas
Badan Sebagai Keseluruhan:
Asthenia / keletihan, demam, sakit perut, trauma

Gangguan Sistem Pencernaan:
Dispepsia (gangguan pencernaan), gastroenteritis (radang perut dan usus), sakit gigi

Sistem Saraf / Psikiatri:
Pening, sakit kepala

Gangguan Sistem Pernafasan:
Kesesakan hidung, batuk, influenza

Kelainan Lekapan Kulit / Kulit:
Ruam

Pesakit kanak-kanak berumur 6 hingga 14 tahun
Faringitis (radang belakang tekak), selesema, demam, sinusitis (keradangan sinus), mual, cirit-birit, dispepsia, otitis (radang telinga), virus, dan laringitis (radang kotak suara).

Pesakit yang berumur 2 hingga 5 tahun
Demam, batuk, sakit perut, cirit-birit, sakit kepala, rhinorrhea (hidung berair), sinusitis, otitis, influenza, ruam, telinga sakit, gastroenteritis, eksim, urtikaria (merah, timbul, ruam gatal), cacar air, radang paru-paru (radang tisu di paru-paru), dermatitis (radang kulit), dan konjungtivitis (keradangan atau jangkitan pada selaput luar bola mata dan kelopak mata dalaman).

Pesakit kanak-kanak 6 hingga 23 bulan yang mempunyai asma
Jangkitan pernafasan atas, nafas berdehit; otitis media; faringitis, radang tonsil (radang pada dua lapisan tisu berbentuk bujur di bahagian belakang tekak), batuk, dan rinitis.

Rinitis Alergi bermusim
Dewasa dan Remaja 15 Tahun keatas
Jangkitan pernafasan atas dan mengantuk.

Pesakit kanak-kanak berumur 2 hingga 14 tahun
Sakit kepala, otitis media, faringitis, dan jangkitan pernafasan atas.

Rhinitis Alergi Kekal
Dewasa dan remaja berumur 15 tahun dan ke atas
Sinusitis, jangkitan pernafasan atas, sakit kepala sinus, batuk, epistaksis (pendarahan dari hidung), peningkatan ALT (enzim hati), dan mengantuk. Beritahu doktor anda sekiranya anda melihat perubahan tingkah laku dan mood yang berikut: Gejala obsesif-kompulsif.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web http://npra.moh.gov.my [Orang Awam→ Lapor Kesan Sampingan (ConSERF) atau Vaksin (AEFI)]

Penyimpanan dan pelupusan
Montexin

Penyimpanan
Pastikan semua ubat tidak dapat dilihat atau dicapai oleh kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C.

Lindungi daripada kelembapan dan cahaya.

Jangan gunakan ubat anda selepas tarikh luput yang dinyatakan pada bungkusan selepas ‘EXP’. Tarikh luput merujuk pada hari terakhir bulan itu.

Pelupusan
Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk
Montexin Chewable Tablets 4 mg berwarna merah jambu, berbentuk bujur, mempunyai ‘ST/025’ pada satu bahagian.

Montexin Chewable Tablets 5 mg berwarma merah jambu, berbentuk bulat , ‘ST/027’ pada satu bahagian.

MONTEXIN CHEWABLE TABLETS

Montelukast (4mg, 5mg)

Bahan-bahan

Bahan aktif

Montexin Chewable Tablet 4mg
Montelukast Sodium 4.2 mg
(bersamaan Montelukast 4.0 mg)

Montexin Chewable Tablets 5 mg:
Montelukast Sodium 5.2 mg
(equivalent to Montelukast 5.0 mg)

Inactive ingredients
Aspartame, Hydroxypropyl Cellulose, Iron Oxide Red, Mannitol, Croscarmellose Sodium, Purified Water, 95% Alcohol, Strawberry micron, Microcrystalline Cellulose and Magnesium Stearate.

MAL number:
Montexin Chewable Tablet 4mg
MAL10053672AZ

Montexin Chewable Tablets 5 mg*:*
MAL10053673AZ

Manufacturer
Taiwan Biotech Co., Ltd.
22, Chieh-Shou Road, Taoyuan,
Taiwan, ROC

Product Registration Holder
Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No. 9,11 & 17, Jalan Kempas 4,
Taman Perindustrian Tampoi Indah,
81200 Johor Bahru, Johor,
Malaysia.

Date of revision
05/03/2026

Serial Number
NPRA(R2/1)220111/822