

SW BROMHEXINE TABLET

Bromhexine Hydrochloride (8mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan SW Bromhexine Tablet
2. Bagaimana SW Bromhexine Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan SW Bromhexine Tablet
4. Cara menggunakan SW Bromhexine Tablet
5. Semasa menggunakan SW Bromhexine Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan SW Bromhexine Tablet
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan SW Bromhexine Tablet

Ia diindikasikan sebagai bantuan rembesan untuk keradangan membran mukus dalam tiub bronkial dan kerengsaan saluran pernafasan lain.

Bagaimana SW Bromhexine Tablet berfungsi

Bahan aktif dalam ubat ini adalah Bromhexine hydrochloride. Bromhexine adalah sumber sintetik yang berdasar dari bahan aktif herba vasicine. Ia melancarkan pergerakan mukus dengan mengurangkan kelikatan dan dengan mengaktifkan epitelium (*mucociliary clearance*). Ambroxol adalah metabolit bromhexin, oleh itu ia terikat kepada protein plasma.

Sebelum menggunakan SW Bromhexine Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan SW Bromhexine Tablet jika anda hipersensitif kepada bromhexine hydrochloride ataupun mana-mana bahan kandungan lain seperti yang dinyatakan pada akhir risalah ini

Mengandung dan penyusuan bayi

Beritahu doktor anda jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau menyusukan bayi.

Ia tidak digalakkan untuk wanita hamil dan ibu menyusukan kecuali manfaat yang dijangka melebihi potensi risiko.

- Sebelum mula menggunakan SW Bromhexine Tablet

Beritahu doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda mempunyai:

- Peptik/ ulser gastrik

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Terdapat beberapa ubat yang boleh berinteraksi dengan SW Bromhexine Tablet. Adalah penting untuk memberitahu doktor atau ahli farmasi anda mengenai semua ubat-ubatan yang anda ambil, termasuk yang diperolehi tanpa preskripsi doktor. Anda perlu berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil seperti yang berikut: -

- Erythromycin or Cephalexin antibiotik

Cara menggunakan SW Bromhexine Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Anda perlu mengambil SW Bromhexine Tablet dengan tepat seperti yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi. Jumlah yang anda ambil setiap hari bergantung kepada keadaan anda. Jangan mengambil lebih atau kurang daripada apa yang doktor anda tetapkan.

Pengambilan Oral

Dewasa : 8-16mg tiga kali sehari.

Kanak-kanak berumur 6 hingga <12 tahun: 4mg tiga kali sehari.

Kanak-kanak berumur 2 hingga < 6 tahun : 2mg tiga kali sehari.

Kanak-kanak berumur kurang daripada 2 tahun : 1mg tiga kali sehari.

- Bila perlu digunakan

Gunakan SW Bromhexine Tablet apabila diperlukan dan mengikut preskripsi doktor.

- Berapa lama perlu digunakan

Ia adalah penting untuk mengambil SW Bromhexine Tablet seperti ditetapkan oleh doktor.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga itu untuk mengambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan.

Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Simptom berlebihan dos boleh menyebabkan kenaikan sementara dalam aminotransferase serum yang boleh menyebabkan masalah hati.

Semasa menggunakan SW Bromhexine Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda seperti doktor anda telah memberitahu anda.
- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil SW Bromhexine Tablet.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandung semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak perlu dilakukan

- Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Jangan berikan SW Bromhexine Tablet kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau masalah seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati apabila melakukan aktiviti yang memerlukan kecerdasan mental seperti memandu kereta atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana ubat ini memberi kesan kepada anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, SW Bromhexine Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan seperti alahan teruk and tindak balas kulit yang serious. Berhenti menggunakan SW Bromhexine Tablet dan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta sekiranya anda mengalami kesan sampingan berikut:-

Alergi akut :- Kesukaran bernafas, pening, kulit bengkak atau ruam.

Reaksi kulit yang teruk: Kulit kemerah-merahan, kulit melepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata.

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin juga boleh berlaku pada sesetengah orang. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami simptom-simptom lain semasa mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No.Tel : 03-78835490, atau laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan SW Bromhexine Tablet

- Penyimpanan

Simpan pada atau di bawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya matahari.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet rata, biasa dan berbentuk pentagon berwarna putih dengan ukiran skor tunggal di satu sisi sahaja.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Bromhexine Hydrochloride

- Bahan- bahan tidak aktif

- DC Lactose
- Starch
- Magnesium stearate

- Nombor MAL

MAL19920996XZ

Pengilang

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No. 9,11 & 17, Jalan Kempas 4, Taman
Perindustrian Tampoi Indah, 81200
Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No.9,11 & 17, Jalan Kempas 4, Taman
Perindustrian Tampoi Indah, 81200
Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

16/04/2019