

MUCODIN SYRUP 250MG/5ML

MUCODIN TABLET 375MG

Carbocysteine (250mg/5ml, 375mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Mucodin Syrup/Tablet
2. Bagaimana Mucodin Syrup/Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Mucodin Syrup/Tablet
4. Cara menggunakan Mucodin Syrup/Tablet
5. Semasa menggunakan Mucodin Syrup/Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Mucodin Syrup/Tablet
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Mucodin Syrup/Tablet

Ia digunakan sebagai terapi tambahan pada pesakit yang mempunyai rembesan mukus yang tidak normal atau pekat dalam keadaan seperti:

- penyakit paru-paru kronik/akut
- komplikasi paru-paru disebabkan fibrosis sista atau mukus tersumbat
- penjagaan trakeostomi (prosedur membuka saluran pernafasan dan membantu pernafasan)
- komplikasi paru-paru yang berkaitan dengan pembedahan
- keadaan dada selepas trauma
- kajian diagnostik paru-paru

Bagaimana Mucodin Syrup/Tablet berfungsi

Bahan aktif dalam ubat ini adalah carbocysteine. Carbocysteine akan melancarkan aliran rembesan mukus dengan mengurangkan kepekatan mukus.

Sebelum menggunakan Mucodin Syrup/Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jangan ambil ubat ini jika anda mempunyai alahan terhadap carbocysteine atau sebarang bahan yang terkandung di dalam produk ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut).
- Tidak disyorkan untuk diberikan kepada kanak-kanak dibawah umur 2 tahun.

- Sebelum mula menggunakan Mucodin Syrup/Tablet

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai:-

- ulser perut. Mucodin harus dielakkan pada pesakit dengan ulser aktif.

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

Oleh kerana tiada kajian yang mencukupi dan terkawal pada wanita hamil, produk ini harus digunakan semasa kehamilan hanya jika betul-betul diperlukan.

Perhatian harus diberikan apabila diberikan kepada wanita yang menyusui.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Mucodin Syrup/Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Anda perlu mengambil Mucodin Syrup/Tablet seperti yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi. Jumlah yang anda ambil setiap hari bergantung kepada keadaan anda. Jangan mengambil lebih atau kurang daripada apa yang doktor atau ahli farmasi anda tetapkan. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Dos oral

Tablet

Dewasa & Kanak-kanak lebih daripada 12 tahun: 2 tablet 3 kali sehari, dikurangkan kepada 2 tablet 2 kali sehari apabila tindak balas diperolehi.

Sirap

Dewasa & Kanak-kanak lebih daripada 12 tahun: 750mg (15ml) 3 kali sehari, dikurangkan kepada 500mg (10ml) 3 kali setiap hari apabila tindak balas diperolehi.

Kanak-kanak 5-12 tahun: 250mg (5ml) 3 kali setiap hari.

Kanak-kanak 2 hingga 5 tahun: 62.5mg - 125mg (1.25ml - 2.5ml) 4 kali setiap hari.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan yang ditetapkan kepada anda oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Ia adalah penting untuk mengambil Mucodin Syrup/Tablet seperti dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang perkara yang perlu anda lakukan jika anda terlupa menggunakannya.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Simptom terlebih dos mungkin serupa dengan kesan-kesan sampingan yang tertera di bawah.

Semasa menggunakan Mucodin Syrup/Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil Mucodin Syrup/Tablet seperti yang doktor anda telah memberitahu kepada anda.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Mucodin Syrup/Tablet.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Jangan berkongsi ubat anda dengan orang lain walaupun mereka mempunyai masalah yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda mempunyai sebarang kesan sampingan, hentikan penggunaan ubat ini dan beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Mucodin Syrup / Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Mucodin Syrup / Tablet boleh menyebabkan loya, sakit kepala, ketidakselesaan perut, cirit-birit, ulser perut mungkin berlaku dengan pendarahan, ruam kulit, reaksi anafilaktik, reaksi alergi pada kulit yang teruk seperti erythema multiforme, sindrom Stevens Johnson (SJS) dan toxic epidermal necrolysis (TEN).

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin juga boleh berlaku pada sesetengah orang. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami simptom-simptom lain semasa mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nppra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan

Mucodin Syrup/Tablet

- Penyimpanan

Simpan pada suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Sirap : Sirap jernih berwarna perang dengan berperisa blackcurrant.

Tablet : Tablet berbentuk bujur, berwarna hijau dan cembung dengan garisan skor di satu sisi.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Carbocysteine

- Bahan tidak aktif

Syrup

- Citric acid anhydrous
- Menthol
- Caramel
- Glycerin
- Saccharin Sodium
- Blackcurrant Flavor
- Methyl Paraben
- Xanthan Gum
- Hydrochloric Acid
- Sodium Hydroxide
- Propylene Glycol
- Deionised Water

Tablet

- Lactose
- Corn Starch
- Green Lake
- Magnesium Stearate
- Sodium Starch Glycolate
- PVP K 90
- PVP K 30
- Isopropyl Alcohol
- Deionised Water

- Nombor MAL

Sirap: MAL19920834X

Tablet: MAL19920993X

Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No. 9,11 & 17, Jalan Kempas 4,
Taman Perindustrian Tampoi Indah,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia

Tarikh Kemaskini RiMUP

28/01/2025

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)311224/00131