

DICOMET CZ CREAM

Dimethicone, Calamine, Zinc Oxide (20% w/w / 4% w/w / 3% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Dicomet CZ Cream
2. Bagaimana Dicomet CZ Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Dicomet CZ Cream
4. Cara menggunakan Dicomet CZ Cream
5. Semasa menggunakan Dicomet CZ Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Dicomet CZ Cream
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Dicomet CZ Cream

Ia digunakan untuk mencegah dan merawat masalah kulit biasa seperti ruam, ekzema, ruam lampin, dan luka akibat tekanan (luka baring).

Bagaimana Dicomet CZ Cream berfungsi

Bahan-bahan aktif dalam ubat ini ialah dimethicone, calamine, dan zinc oxide.

Dimethicone mempunyai sifat kalis air yang membantu melindungi kulit dengan membentuk satu lapisan penghalang bagi memastikan kawasan yang terjejas terlindung daripada luka atau kerengsaan.

Manakala calamine dan zinc oxide mempunyai sifat astringen sederhana yang membantu membentuk lapisan pelindung pada kulit yang melegakan, mempercepat penyembuhan kulit, dan mengurangkan kerengsaan.

Sebelum menggunakan Dicomet CZ Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Dicomet CZ Cream jika anda hipersensitif kepada dimethicone, calamine, zinc oxide, atau sebarang bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat Lanjut).

- Sebelum mula menggunakan

Periksa dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan Dicomet CZ Cream.

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Dicomet CZ Cream

- Berapa banyak harus digunakan

Pengambilan topikal.

Gunakan secukupnya pada kawasan kulit yang terjejas.

- Bila perlu digunakan

Gunakan Dicomet CZ Cream dua kali sehari, atau mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Dicomet CZ Cream hendaklah digunakan untuk tempoh yang disyorkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Sapu dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir waktu untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapu dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat sekiranya anda atau sesiapa telah menggunakan dos berlebihan atau tidak sengaja tertelan ubat ini. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang tanda keracunan atau rasa tidak selesa, kerana anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Dicomet CZ Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu semua doktor, doktor gigi, dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Dicomet CZ Cream.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat kecuali atas nasihat doktor anda.
- Jangan mengambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Jangan berikan Dicomet CZ Cream kepada individu lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau masalah seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda mengalami sebarang kesan sampingan, kerengsaan atau jangkitan, rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat.

Untuk kegunaan pada kulit luar sahaja (tidak boleh ditelan atau digunakan di dalam badan).

Jangan sapu pada luka terbuka, kulit yang luka, atau kawasan yang mengalami keradangan teruk.

Elakkan daripada terkena atau masuk ke dalam mata kerana boleh menyebabkan kerengsaan.

Kesan-kesan sampingan

Tiada kesan sampingan yang dilaporkan bagi penggunaan Dicomet CZ Cream. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami kesan sampingan semasa menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Dicomet CZ Cream

- Penyimpanan

Simpan pada atau di bawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim licin berwarna merah jambu pudar.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
 - Dimethicone
 - Calamine
 - Zinc Oxide
- Bahan tidak aktif
 - Chlorocresol
 - Cetostearyl Alcohol
 - Deionised Water
 - White Soft Paraffin
 - Propylene Glycol
 - Cetomacrogol 1000
 - EDTA (Disodium Edetate)

- Nombor MAL
MAL19920896X

**Pengilang & Pemegang Pendaftaran
Produk**

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No. 9,11 & 17, Jalan Kempas 4,
Taman Perindustrian Tampoi Indah,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP
17/04/2026

Nombor Siri:
NPRA(R4/1)130426/00016