

MUCOCLEAR TABLET 30MG

Ambroxol Hydrochloride (30mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Mucoclear Tablet
2. Bagaimana Mucoclear Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Mucoclear Tablet
4. Cara menggunakan Mucoclear Tablet
5. Semasa menggunakan Mucoclear Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Mucoclear Tablet
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Mucoclear Tablet

Ia diindikasikan untuk jangkitan paru-paru akut dan kronik yang berkaitan dengan rembesan mukus yang tidak normal dan pergerakan lendir yang tidak lancar.

Bagaimana Mucoclear Tablet berfungsi

Bahan aktif dalam ubat ini adalah Ambroxol hydrochloride. Ia melancarkan pergerakan lendir dengan mengurangkan kelikatan dan penyingkiran lendir berlebihan serta menenangkan batuk. Ambroxol adalah metabolit bromhexin, oleh itu ia mempunyai fungsi dan kegunaan yang serupa dengan bromhexine.

Sebelum menggunakan Mucoclear Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Mucoclear Tablet jika anda hipersensitif kepada ambroxol hydrochloride ataupun mana-mana bahan kandungan lain seperti yang dinyatakan pada akhir risalah ini

Mengandung dan penyusuan bayi

Beritahu doktor anda jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau menyusukan bayi.

Ia tidak digalakkan untuk wanita hamil dan ibu menyusukan kecuali manfaat yang dijangka melebihi potensi risiko.

- Sebelum mula menggunakan Mucoclear Tablet

Beritahu doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda mempunyai:

- Menyusu badan
- Hamil

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Terdapat beberapa ubat yang boleh berinteraksi dengan Mucoclear Tablet. Adalah penting untuk memberitahu doktor atau ahli farmasi anda mengenai semua ubat-ubatan yang anda ambil, termasuk yang diperolehi tanpa preskripsi doktor.

Cara menggunakan Mucoclear Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Anda perlu mengambil Mucoclear Tablet dengan tepat seperti yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi. Jumlah yang anda ambil setiap hari bergantung kepada keadaan anda. Jangan mengambil lebih atau kurang daripada apa yang doktor anda tetapkan.

Pengambilan Oral

Dewasa : 2 tablet dua kali sehari selepas makan. Sekiranya dalam terapi, 1 tablet tiga kali sehari

Kanak-kanak berumur 5 tahun dan keatas: 1 tablet tiga kali sehari.

- Bila perlu digunakan

Gunakan Mucoclear Tablet apabila diperlukan dan mengikut preskripsi doktor.

- Berapa lama perlu digunakan

Ia adalah penting untuk mengambil Mucoclear Tablet seperti ditetapkan oleh doktor.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga itu untuk mengambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera..

Semasa menggunakan Mucoclear Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda seperti doktor anda telah memberitahu anda.
- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Mucoclear Tablet.

- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandung semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak perlu dilakukan

- Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Jangan berikan Mucoclear Tablet kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau masalah seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati apabila melakukan aktiviti yang memerlukan kecerdasan mental seperti memandu kereta atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana ubat ini memberi kesan kepada anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Mucoclear Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan seperti alahan teruk and tindak balas kulit yang serious. Berhenti menggunakan Mucoclear Tablet dan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta sekiranya anda mengalami kesan sampingan berikut:-

Alergi akut :- Kesukaran bernafas, pening, kulit bengkak atau ruam.

Reaksi kulit yang teruk: Kulit kemerah-merahan, kulit melepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata.

Kesan sampingan lain yang seperti pedih pada ulu hati yg sederhana, senak, loya dan muntah kemungkinan juga boleh berlaku pada sesetengah orang. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami simptom-simptom lain semasa mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web www.npra.gov.my/Consumers-Reporting).

Cara penyimpanan dan pelupusan Mucoclear Tablet

- Penyimpanan

Simpan pada atau di bawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya matahari.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet biasa, berbentuk bulat, cembung dan berwarna merah jambu dengan ukiran skor tunggal di satu sisi sahaja dan “SW” pada satu sisi yang lain.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Ambroxol Hydrochloride

- Bahan- bahan tidak aktif

- Lactose
- Corn Starch
- Cochineal Red E124
- Magnesium Stearate

- Nombor MAL

MAL20001060X

Pengilang

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No. 9,11 & 17, Jalan Kempas 4, Taman
Perindustrian Tampoi Indah, 81200
Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No.9,11 & 17, Jalan Kempas 4, Taman
Perindustrian Tampoi Indah, 81200
Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

29/03/2022

Nombor Siri

NPRA(R2/1)220323/855