

NEPHROGEN TABLET

Vitamin B1/Vitamin B6/Vitamin B12 (100mg/200mg/200mcg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Nephrogen Tablet
2. Bagaimana Nephrogen Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Nephrogen Tablet
4. Cara menggunakan Nephrogen Tablet
5. Semasa menggunakan Nephrogen Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Nephrogen Tablet
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Nephrogen Tablet

Ia digunakan sebagai terapi tambahan untuk mereka yang mengalami masalah dan kesakitan saraf serta kerosakan saraf akibat kencing manis.

Bagaimana Nephrogen Tablet berfungsi

Nephrogen Tablet mengandungi vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12 yang bertindak bersama untuk meningkatkan kesihatan dan fungsi saraf.

Sebelum menggunakan Nephrogen Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Nephrogen Tablet jika anda:

- hipersensitif kepada vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12 atau sebarang bahan lain yang terkandung di dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).
- mempunyai *Leber's disease* tahap awal (gangguan saraf genetik).

- Sebelum mula menggunakan Nephrogen Tablet

Beritahu doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda:

- mempunyai anemia megaloblastik yang teruk (sel darah yang luar biasa besar) yang disebabkan kekurangan vitamin B12.

Mengandung dan penyusuan bayi

Sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk hamil atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

Nephrogen Tablet dirembeskan ke dalam susu ibu dan mungkin menjejaskan kuantiti susu anda. Doktor anda akan membincangkan risiko dan faedah penyusuan susu ibu semasa anda mengambil ubat ini.

- Jika menggunakan ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai ubat makanan untuk kesihatan. Anda perlu berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat seperti yang berikut: -

- levodopa (ubat untuk merawat penyakit Parkinson).
- isoniazid, aminosalicylic acid (digunakan untuk merawat tibi).
- penicillamine (digunakan untuk penyakit Wilson).
- ubat perancang oral.
- antibiotik aminoglycoside, chloramphenicol (merawat jangkitan bakteria).
- ubat untuk merawat sawan.
- biguanides (digunakan untuk merawat kencing manis).
- cholestyramine (digunakan untuk menurunkan kolesterol).
- cimetidine (digunakan untuk ulser perut).
- colchicine (untuk merawat serangan gout).
- ubat yang mengandungi kalium.
- methyl dopa (untuk merawat darah tinggi).

Cara menggunakan Nephrogen Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Ubat ini diambil secara oral

1 tablet diambil tiga kali sehari

- Bila perlu digunakan

Ambil tablet sebelum atau ketika mula makan. Ambil 3 kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil Nephrogen Tablet untuk tempoh yang disyorkan oleh doktor.

- Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga itu untuk mengambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak ubat ini boleh meningkatkan kesan sampingan, jika diambil pada dos yang tinggi:

- vitamin B6: boleh membawa kepada kerosakan saraf yang teruk pada kaki atau/dan tangan.
- vitamin B12: boleh menyebabkan gangguan darah (terutamanya pada mereka yang mengalami kekurangan zat besi).

Semasa menggunakan Nephrogen Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil seperti yang diarahkan oleh doktor anda.
- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda menggunakan Nephrogen Tablet.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandungi semasa menggunakan ubat ini.
- Jika anda akan menjalani sebarang pembedahan atau prosedur yang memerlukan ubat bius, sila beritahu doktor anda bahawa anda sedang mengambil Nephrogen Tablet.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.
- Jangan mengambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Jangan berikan Nephrogen Tablet kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau masalah seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin
Berhati-hati semasa memandu atau menggunakan jentera sehingga anda mengetahui tentang kesan Nephrogen Tablet terhadap anda.

Doktor anda akan memantau paras kalium dan kiraan platelet anda secara berkala semasa mengambil ubat ini.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Nephrogen Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Kesan sampingan yang dilaporkan seperti:

- loya
- sakit kepala
- kesemutan

- mengantuk
- geligata.
- tindak balas kulit seperti, kulit kemerahan, kulit muka mengelupas, ruam, dan jerawat.

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin juga boleh berlaku pada sesetengah orang. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami kesan sampingan lain semasa mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Nephrogen Tablet

- Penyimpanan

Simpan pada suhu di bawah 25°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bulat, cembung, berwarna putih pudar dan bersalut filem.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan- bahan aktif

- Thiamine mononitrate (vitamin B1)
- Pyridoxine Hydrochloride (vitamin B6)
- Cyanocobalamin (vitamin B12)

- Bahan- bahan tidak aktif

- Microcrystalline Cellulose
- Corn starch
- Polyvinylpyrrolidone (PVP) K-90
- Isopropyl Alcohol
- Magnesium Stearate
- Hydroxypropyl methylcellulose
- Deionised water
- PEG-6000
- Calcium Carbonate
- Talcum
- Titanium dioxide

- Nombor MAL

MAL20040324XZ

Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No. 9,11 & 17, Jalan Kempas 4, Taman
Perindustrian Tampoi Indah, 81200
Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

19/08/2024

Nombor siri:

NPRA(R4/1)020824/00098