

SUN-GLIZIDE TABLET

Gliclazide (80mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Sun-Glizide Tablet
2. Bagaimana Sun-Glizide Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Sun-Glizide Tablet
4. Cara menggunakan Sun-Glizide Tablet
5. Semasa menggunakan Sun-Glizide Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Sun-Glizide Tablet
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Sun-Glizide Tablet

Ia digunakan untuk merawat penyakit kencing manis pada mereka yang tidak bergantung kepada insulin untuk mengawal tahap gula dalam darah.

Bagaimana Sun-Glizide Tablet berfungsi

Bahan aktif dalam ubat ini adalah gliclazide. Gliclazide tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil sulfonylurea yang bertindak merangsangkan pengeluaran insulin dari sel beta di dalam *pancreas*. Maka, ia mengurangkan kadar gula dalam darah.

Sebelum menggunakan Sun-Glizide Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Sun-Glizide Tablet jika anda:

- hipersensitif kepada gliclazide atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut produk).
- mempunyai penyakit kencing manis yang bergantung kepada insulin, terutamanya kencing manis yang komplikasi disebabkan ketosis dan asidosis, koma atau pre-koma.
- semasa pembedahan.
- mempunyai sebarang jangkitan
- mempunyai penyakit buah pinggang atau hati yang teruk.

Mengandung dan penyusuan bayi

Beritahu doktor anda jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau menyusukan bayi.

Tiada bukti mencukupi yang menunjukkan penggunaannya adalah selamat dalam tempoh kehamilan ibu mengandung. Penggunaan ubat adalah tidak digalakkan untuk wanita hamil dan ibu menyusu kecuali manfaat yang dijangka melebihi potensi risiko.

-Sebelum mula menggunakan Sun-Glizide Tablet

Beritahu doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda mempunyai masalah buah pinggang dan hati.

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Anda perlu berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat seperti yang berikut: -

- ubat lain untuk merawat kolesterol dan trigliserida (seperti Gemfibrozil, fibrate lain).
- *Beta – blockers*, ubat untuk merawat tekanan darah tinggi. Ubat ini juga boleh menyembunyikan tanda-tanda hipoglisemia, jadi penjagaan khas diperlukan ketika mengambil ubat-ubatan ini.

Ubat-ubatan yang boleh mengurangkan kandungan gula dalam darah dan mengurangkan keberkesanan sulphonylureas;

- antibiotik untuk merawat jangkitan bakteria, tuberkulosis (seperti rifampisin).
- diuretik thiazide (tablet air) untuk tekanan darah tinggi.
- ubat untuk merawat gangguan mental yang teruk (*chlorpromazine* dan derivatif *phenothiazine* yang lain).
- ubat untuk merawat alahan dan radang (*corticosteroids*).
- ubat untuk merawat tekanan darah tinggi atau penawar untuk tahap gula yang rendah disebabkan oleh tahap insulin yang terlalu tinggi di dalam badan (*diazoxide*).
- ubat mengandung hormon seks wanita.
- ubat perancang keluarga.
- ubat-ubatan untuk merawat sembelit (*laxative abusive*) untuk menurunkan berat badan.

Ubat-ubatan yang mungkin berisiko meningkatkan kesan hipoglikemia daripada sulfonilurea oleh itu mengurangkan dos diperlukan bagi;

- antibiotik untuk merawat jangkitan bakteria (seperti kloramfenikol, sulfonamida dan sebatian *tetracycline*).
- ubat-ubatan untuk merawat jangkitan yis dan kulat (*fluconazole*, *miconazole*).
- Ubat untuk merawat kesakitan dan keradangan (*azapropazone*, *phenylbutazone*, *salicylate*).
- Ubat hormon untuk merawat kelenjar tiroid.

- antikoagulan coumarin (rawatan untuk mencairkan darah).
- halofenat, untuk merawat asid urik dalam darah.
- ubat untuk kemurungan yang dikenali sebagai perencat *Monoamine Oxidase* (MAOIs).
- Ubat yang dikenali sebagai agen *anti-arrhythmic* yang digunakan untuk mengawal rentak jantung yang tidak normal (*disopyramide*).
- cimetidine, ubat untuk gastrik.

Cara menggunakan Sun-Glizide Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Pengambilan Oral (melalui mulut).

Jumlah yang anda ambil setiap hari bergantung kepada keadaan anda. Dos awal biasanya 40mg - 80mg setiap hari dan meningkatkan dos secara berkala sehingga 320 mg setiap hari jika perlu.

Dos tunggal tidak boleh melebihi 2 tablet (160mg). Jika dos yang lebih tinggi diperlukan, adalah dinasihatkan untuk mengambil tablet dibahagi kepada dua kali sehari dan mengikut waktu makan utama seharian.

- Bila perlu digunakan

Gunakan Sun-Glizide Tablet mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan Sun-Glizide Tablet untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan terlalu banyak dos boleh menyebabkan kandungan gula dalam darah terlalu rendah.

Semasa menggunakan Sun-Glizide Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Sun-Glizide Tablet.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandung semasa mengambil ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Jangan berikan Sun-Glizide Tablet kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau masalah seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Sekiranya anda mengalami kesan sampingan, berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Sun-Glizide Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Kesan sampingan dilaporkan seperti berikut:

- kulit sensitif
- gangguan gastrousus (seperti sakit perut, pedih ulu hati, cirit-birit, sembelit, mual dan muntah)
- *leucopenia* (masalah darah)
- tidak toleransi dengan alkohol
- kekuningan kulit dan mata (jaundis)
- peluh
- pucat
- peningkatan selera makan
- kegelisahan
- degupan jantung yang cepat
- rasa gementar
- hipotermia
- sakit kepala
- kekeliruan
- sawan sampai boleh membawa seseorang ke koma

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin juga boleh berlaku pada sesetengah orang. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami kesan sampingan lain semasa mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers*→ *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Sun-Glizide Tablet

- Penyimpanan

Simpan bawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet biasa, bulat, rata, dan berwarna putih dengan ukiran skor pada satu permukaan sahaja.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Gliclazide

- Bahan- bahan tidak aktif

- Lactose
- Corn starch
- Magnesium stearate
- Polyvinylpyrrolidone (PVP)
- Isopropyl Alcohol (IPA)

- Nombor MAL

MAL20013374AZ

Pengilang

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No. 9, Jalan Kempas 4, Taman
Perindustrian Tampoi Indah, 81200
Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No. 9, Jalan Kempas 4, Taman
Perindustrian Tampoi Indah, 81200
Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

16/12/2021

Nombor Siri:

NPRA(R2/1)211123/798