

"PBF" FUSIDIC ACID CREAM 2% w/w

Fusidic acid (20mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan "PBF" Fusidic Acid Cream
2. Bagaimana "PBF" Fusidic Acid Cream berfungsi
3. Sebelum mengguna "PBF" Fusidic Acid Cream
4. Cara menggunakan "PBF" Fusidic Acid Cream
5. Semasa menggunakan "PBF" Fusidic Acid Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan "PBF" Fusidic Acid Cream
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan "PBF" Fusidic Acid Cream

Ia digunakan untuk rawatan topikal penyakit kulit seperti kulit tompok bersisik, kulit lepuh atau kulit berkerak, bisul, luka septik atau keradangan pada folikel rambut, bengkak serta lebam di bawah kulit pada akar rambut, jangkitan pada kulit di sekeliling kuku atau kuku jari kaki yang disebabkan oleh jangkitan bakteria seperti staphylococcus or streptococcus, propionibacterium acnes, Corynebacterium minutissimum, serta bakteria lain.

Penyediaan "PBF" Fusidic Acid Cream adalah tidak ketara serta tidak melekit dimana rawatannya boleh diterima dalam kegunaan kosmetik akibat jangkitan di muka dan kulit kepala.

Bagaimana "PBF" Fusidic Acid Cream berfungsi

Bahan aktif dalam ubat ini adalah asid fusidik. Asid fusidik adalah sejenis antibiotik yang mempunyai tindakan anti-bakteria yang kuat bertindak melawan beberapa jenis bakteria gram positif. Asid fusidik metabolit di dalam hati dan disingkirkan dengan hempedu.

Sebelum mengguna "PBF" Fusidic Acid Cream

- Bila tidak boleh mengguna

Jangan gunakan "PBF" Fusidic Acid Cream jika: -

- anda mempunyai alahan kepada asid fusidik atau mana-mana bahan kandungan yang disenaraikan pada akhir risalah ini.

- Sebelum mula mengambil

Bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan "PBF" Fusidic Acid Cream. Krim ini perlu digunakan dengan berhati-hati apabila berdekatan sekitar mata dan tidak boleh memasuki mata.

Kehamilan dan Penyusuan

Beritahu doktor anda jika anda mengandung, mungkin mengandung, merancang untuk mengandung atau menyusukan bayi.

"PBF" Fusidic Acid Cream harus digunakan dengan berhati-hati semasa mengandung. Tiada bukti mencukupi yang menunjukkan penggunaannya adalah selamat dalam tempoh kehamilan ibu mengandung. Jaminan kesihatan ketika mengandung tidak dapat dipastikan. Langkah berjaga-jaga perlu diambil apabila menyusukan anak.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Interaksi antara "PBF" Fusidic Acid Cream dan ubat-ubat lain tidak diketahui. Adalah penting untuk memberitahu doktor atau ahli farmasi anda mengenai semua ubat-ubatan yang anda sedang mengambil, termasuk yang diperolehi tanpa preskripsi doktor.

Cara menggunakan "PBF" Fusidic Acid Cream

Sentiasa gunakan "PBF" Fusidic Acid Cream seperti yang telah diberitahu oleh doktor anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

Ubat ini hanya untuk digunakan pada kulit anda. Jangan menelannya. Jangan meletakkan di dalam badan anda.

Keluarkan penutup tiub. Pastikan meterai tidak pecah terlebih dahulu sebelum menggunakan krim tersebut.

Sentiasa basuh tangan anda sebelum menggunakan "PBF" Cream Fusidic Acid. Sapukan ubat secara perlahan pada kulit. Jika anda menggunakannya di muka, berhati-hatilah untuk mengelakkan kawasan mata.

Melainkan jika anda menggunakan krim untuk merawat tangan anda, sentiasa membasuh tangan anda selepas menggunakan "PBF" Fusidic Acid Cream.

Jika anda secara tidak sengaja terkena di dalam mata anda, bilas mata anda dengan air sejuk segera. Lalukan mata anda dengan pencuci mata jika boleh. Mata anda mungkin menyengat. Jika anda mula mengalami sebarang masalah dengan penglihatan anda atau mata anda sakit, hubungi doktor anda dengan segera.

- Berapa banyak harus digunakan

"PBF" Fusidic Acid Cream digunakan pada kawasan yang terjejas 2-3 kali sehari, secara amnya selama 7 hari, kecuali dalam rawatan jerawat di mana terapi perlu dilanjutkan untuk tempoh yang lebih lama mengikut sifat penyakit ini.

- Bila perlu digunakan

Gunakan "PBF" Fusidic Acid Cream mengikut preskripsi doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Ia adalah penting untuk mengambil "PBF" Fusidic Acid Cream selama tujuh hari dalam tempoh atau selagi doktor anda menetapkan.

- Jika terlupa menggunakan

Sekiranya anda terlupa mengambil krim ini pada masa biasa anda, sila ambil dengan segera sebaik sahaja anda mengingati dan meneruskan pengambilan seperti biasa.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya anda menggunakan krim secara berlebihan atau tertelan sedikit krim secara tidak sengaja, ia tidak mungkin menyebabkan sebarang bahaya. Jika tertelan kuantiti krim yang banyak secara tidak sengaja atau anda risau, sila hubungi doktor, ahli farmasi atau Jabatan Kemasukan dan Kecemasan untuk mendapatkan nasihat.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lanjut mengenai penggunaan ubat ini, sila merujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

Semasa menggunakan "PBF" Fusidic Acid Cream

-Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil "PBF" Fusidic Acid Cream.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandung semasa mengambil ubat ini.
- Berikan perhatian khusus jika anda menggunakan ubat ini berhampiran mata anda atau mata kanak-kanak.
- Sekiranya anda menggunakan krim dalam masa yang lama atau dalam jumlah yang banyak, peluang untuk mengalami sebarang kesan sampingan adalah lebih tinggi. Malah, kulit anda akan lebih sensitif dengan ubat ini. Ambil ubat anda seperti yang telah diberitahu oleh doktor anda.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Jangan berikan "PBF" Fusidic Acid Cream kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda mengalami sebarang kesan sampingan, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat.

PBF" Fusidic Acid Cream adalah persiapan produk sedia ada dan tidak boleh dicampurkan dengan bahan-bahan atau persediaan lain.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, "PBF" Fusidic Acid Cream boleh menyebabkan kesan - kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Penggunaan "PBF" Fusidic Acid Cream disokong dengan baik dan mempunyai tindak balas hipersensitif yang rendah.

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami simptom-simptom lain semasa mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No.Tel : 03-78835490,

atau laman web npa.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan "PBF" Fusidic Acid Cream

-Penyimpanan

Simpan bawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya. Lindungi daripada kanak-kanak.

Jangan gunakan "PBF" Fusidic Acid Cream selepas tarikh luput yang dicetak pada tiub. Tarikh luput adalah hari terakhir bulan itu.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Krim berwarna putih.

Setiap pakej mengandungi tiub dengan 5gm krim.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Fusidic Acid

- Bahan- bahan tidak aktif

- Propylene Glycol
- Hydroxyethylcellulose
- Butylated Hydroxyanisole (BHA)
- Potassium Sorbate
- Tocopherol Acetate (Vitamin E)
- Purified Water
- White Petrolatum
- Cetyl Alcohol
- Polysorbate 60/Tween 60
- Liquid Paraffin

-Nombor MAL

MAL

Pengilang

Panion & BF Biotech Inc.

No.266 Singlong Rd.,

Pingjhen Dist., Taoyuan City 32460,

Taiwan, R.O.C

Pemegang Pendaftaran Produk

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.

No.9,11 & 17, Jalan Kempas 4, Taman

Perindustrian Tampoi Indah, 81200

Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

10/12/2019

Nombor Siri

NPRA(R2)19/82