

ACYLETE TABLET

Acyclovir (400gm)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Acylete Tablet
2. Bagaimana Acylete Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Acylete Tablet
4. Cara menggunakan Acylete Tablet
5. Semasa menggunakan Acylete Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Acylete Tablet
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Acylete Tablet

Ia digunakan untuk :

- rawatan dan pencegahan jangkitan kulit berulang yang disebabkan virus herpes simplex termasuk pada kawasan kemaluan dan membran mukus.
- pencegahan jangkitan herpes simplex pada orang yang mempunyai sistem imun yang lemah.
- rawatan kayap (jangkitan herpes zoster).

Bagaimana Acylete Tablet berfungsi

Bahan aktif dalam ubat ini adalah acyclovir, iaitu sejenis ubat antiviral. Ia berfungsi dengan mencegah pertumbuhan virus tertentu dan seterusnya melawan jangkitan virus.

Sebelum menggunakan Acylete Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Acylete Tablet jika anda hipersensitif kepada acyclovir atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).

- Sebelum mula menggunakan Acylete Tablet

Beritahu doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda;

- mempunyai masalah atau penyakit yang melemahkan sistem imun anda seperti AIDS.
- pernah melalui pemindahan organ atau sumsum tulang.

Mengandung dan penyusuan bayi

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

Acyclovir hanya boleh digunakan semasa mengandung dan penyusuan jika manfaatnya lebih daripada risiko kepada janin.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Anda perlu berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat seperti yang berikut: -

- ubat yang digunakan untuk merawat gout seperti probenecid.
- ubat-ubat lain yang mungkin memberi kesan kepada fungsi buah pinggang.

Cara menggunakan Acylete Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Dos yang perlu anda ambil akan bergantung pada keadaan anda. Doktor anda akan membincangkan perkara ini dengan anda.

Dewasa:

- Rawatan untuk jangkitan virus herpes simplex

Setengah biji, 5 kali sehari setiap selang 4 jam secara amnya untuk jangka masa 5 hari kecuali jika jangkitan lebih serius di mana terapi harus dilanjutkan.

Dos boleh digandakan, bagi mereka yang mempunyai sistem imun yang lemah, berikutan pemindahan sumsum tulang atau bagi mereka yang mengalami masalah penyerapan pada usus.

- Pencegahan jangkitan berulang virus herpes simplex:

Setengah biji, 4 kali sehari setiap selang 6 jam atau sebiji, diambil dua kali sehari, setiap 12 jam.

Dos akan dipantau secara berkala oleh doktor / ahli farmasi setiap 6 hingga 12 bulan.

- Pencegahan jangkitan virus herpes simplex bagi pesakit dengan sistem imun yang lemah

Setengah biji, 4 kali sehari setiap selang 6 jam.

Dos boleh digandakan bagi mereka yang mempunyai sistem imun yang lemah terlampau berikutan pemindahan sumsum tulang atau bagi mereka yang mengalami masalah penyerapan pada usus.

Rawatan kayap:

Dua biji, 5 kali sehari pada selang waktu kira-kira 4 jam selama 7 hari.

Kanak-kanak

Kanak-kanak lebih dari 2 tahun: sama seperti dos dewasa.

Kanak-kanak kurang dari 2 tahun: separuh daripada dos dewasa.

Orang yang mempunyai masalah buah pinggang:

Untuk jangkitan herpes simplex, setengah biji diambil dua kali sehari dengan selang 12 jam.

Bagi jangkitan kayap, dalam masalah buah pinggang yang teruk, ambil 2 biji, dua kali sehari pada selang waktu kira-kira 12 jam dan 3 kali sehari dengan selang 6 jam untuk orang yang mengalami masalah buah pinggang sederhana.

- Bila perlu digunakan

Ambil Acylete Tablet mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Acylete Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Acylete Tablet.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandung semasa mengambil ubat ini.
- Ambil Acylete Tablet hanya dengan preskripsi doktor.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.
- Jangan mengambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Jangan berikan Acylete Tablet kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau masalah seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati semasa anda menggunakan ubat dan ambil mengikut preskripsi daripada doktor/ahli farmasi.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Acylete Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Kesan sampingan dilaporkan seperti berikut:

- ruam pada kulit
- loya
- muntah
- cirit-birit
- sakit pada bahagian abdomen

Jarang

- peningkatan tahap bilirubin, urea dalam darah, kreatinin dalam badan.
- sedikit penurunan pada kiraan darah.
- kesan neurological.
- keletihan.

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin juga boleh berlaku pada sesetengah orang. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami kesan sampingan lain semasa mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

**Cara penyimpanan dan pelupusan
Acylete Tablet**

- Penyimpanan

Simpan pada suhu bilik di bawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet berwarna jingga, berbentuk perisai dengan ukiran CCP pada satu permukaan dan skor pada permukaan lain.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Acyclovir

- Bahan- bahan tidak aktif

- Microcrystalline cellulose (Avicel 101)
- Colloidal silicon dioxide (Aerosil 200 U.C)
- Povidone (K-30)
- Polysorbate 20 (Tween 20)
- Food colour Yellow No.6 Aluminum Lake (Sunset yellow F.C.F. Aluminum lake)
- Sodium starch glycolate
- Sodium bicarbonate
- Magnesium stearate

- Nombor MAL

MAL20001242AZ

Pengilang

China Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd.
182-1, Keng Tze Kou,
Taiwan.

Pemegang Pendaftaran Produk

Kireen Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No. 9, Jalan Kempas 4, Taman
Perindustrian Tampoi Indah, 81200
Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

22/02/2023

Nombor Siri

NPRA(R4/1)080223/00011