

ENSPRYNG®™ 120MG/1ML

Solution For Injection In A Pre-Filled Syringe)
Satralizumab

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *ENSPRYNG*
2. Bagaimana *ENSPRYNG* berfungsi
3. Sebelum anda menggunakan *ENSPRYNG*
4. Cara menggunakan *ENSPRYNG*
5. Semasa menggunakan *ENSPRYNG*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *ENSPRYNG*
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh Kemas Kini RiMUP
12. Nombor Siri

Apakah kegunaan *ENSPRYNG*

ENSPRYNG adalah ubat preskripsi untuk rawatan gangguan spektrum optik neuromielitis (Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders, NMOSD) untuk orang dewasa dan remaja berumur 12 ke atas.

NMOSD adalah penyakit system saraf pusat yang mempengaruhi saraf optic dan saraf tunjang.

Ia disebabkan oleh sistem imun (pertahanan badan) yang berfungsi dengan tidak betul dan menyerang saraf di dalam badan.

- Kerosakan pada saraf optik menyebabkan pembengkakan, kesakitan dan kehilangan penglihatan.
- Kerosakan pada saraf tunjang menyebabkan kelemahan atau kehilangan pergerakan pada kaki atau lengan, kehilangan perasaan, dan masalah dengan fungsi pundi kencing dan usus.

Bagaimana *ENSPRYNG* berfungsi

ENSPRYNG menyekat tindakan protein interleukin-6 (IL-6), yang terlibat dalam proses yang menyebabkan kerosakan dan pembengkakan pada sistem saraf. Dengan menyekat kesannya, *ENSPRYNG* mengurangkan risiko kambuh (*relapse*) atau serangan NMOSD

Sebelum anda menggunakan *ENSPRYNG*

- **Bila tidak boleh menggunakan**
Jangan ambil *ENSPRYNG* jika:

1. anda alah kepada satralizumab atau mana-mana bahan dalam *ENSPRYNG*. Rujuk akhir risalah ini untuk senarai lengkap kandungan *ENSPRYNG*.
2. Sekiranya perkara di bawah berlaku untuk anda atau anda tidak pasti, jangan gunakan *ENSPRYNG* dan berbincang dengan doktor, ahli farmasi atau jururawat anda.
3. pakej koyak atau menunjukkan tanda-tanda gangguan
4. tarikh luput (EXP) yang dicetak pada pek telah tamat tempoh.

- **Sebelum mula menggunakan**
ENSPRYNG

Segera berbincang dengan doktor anda sekiranya anda mengalami reaksi alahan.

Berbincang dengan doktor, ahli farmasi atau penjagaan kesihatan profesional anda sebelum menggunakan *ENSPRYNG* jika ada yang berikut berlaku untuk anda (atau jika anda tidak pasti sama ada perkara berikut berlaku untuk anda):

Jangkitan

Anda tidak boleh menggunakan *ENSPRYNG* semasa anda mengalami jangkitan. Beritahu doktor atau jururawat anda dengan segera jika anda fikir anda mempunyai tanda-tanda jangkitan sebelum, semasa, atau selepas rawatan *ENSPRYNG* seperti:

- demam atau menggigil
- batuk yang tidak hilang
- sakit tekak
- kulit lepuh atau luka genital (herpes simplex)
- Penyakit kayap (herpes zoster)
- kemerahan kulit, bengkak, kelembutan atau kesakitan
- berasa atau sakit, cirit-birit atau sakit perut.

Anda juga akan mendapatkan maklumat ini dalam kad amaran pesakit yang telah diberikan oleh

doktor anda. Anda perlu sentiasa menyimpan kad amaran ini dan menunjukkannya kepada doktor, jururawat atau penjaga.

Doktor anda akan menunggu sehingga jangkitan terkawal sebelum memberi anda *ENSPRYNG* atau membenarkan anda terus menyuntik *ENSPRYNG*.

Vaksinasi

Beritahu doktor anda jika anda baru-baru ini diberi vaksin atau mungkin diberi vaksin dalam masa terdekat.

- Doktor anda akan memeriksa sama ada anda memerlukan vaksin sebelum anda memulakan *ENSPRYNG*.
- Jangan mempunyai vaksin yang mempunyai virus yang dilemahkan atau hidup (misalnya BCG untuk tuberkulosis atau vaksin terhadap demam kuning) semasa anda dirawat dengan *ENSPRYNG*.

Enzim hati

ENSPRYNG boleh memberi kesan pada hati anda dan meningkatkan jumlah beberapa enzim hati dalam darah anda.

Doktor anda akan melakukan ujian darah sebelum anda diberi *ENSPRYNG*, dan semasa rawatan anda, untuk memeriksa keadaan fungsi hati anda. Beritahu doktor atau jururawat anda dengan segera sekiranya anda mempunyai tanda-tanda kerosakan hati ini semasa atau selepas rawatan *ENSPRYNG*:

- penguning kulit dan putih mata (penyakit kuning)
- air kencing berwarna gelap
- berasa sakit dan sakit
- sakit perut

Sel darah putih

Doktor anda akan melakukan ujian darah sebelum anda diberikan *ENSPRYNG*, dan semasa rawatan anda, untuk memeriksa jumlah sel darah putih anda.

Kehamilan dan penyusuan

ENSPRYNG®TM 120MG/1ML

Solution For Injection In A Pre-Filled Syringe)
Satralizumab

Sekiranya anda hamil atau menyusui, fikir anda mungkin mengandung atau merancang untuk mempunyai bayi, sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini.

Doktor anda mungkin menasihati anda untuk berhenti menyusui sekiranya anda diberi ENSPRYNG. Tidak diketahui sama ada ENSPRYNG masuk ke dalam susu ibu.

Memandu dan menggunakan mesin

ENSPRYNG mungkin tidak akan mempengaruhi anda untuk memandu, atau menggunakan alat atau mesin lain.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor tentang semua ubat yang anda ambil, termasuk ubat preskripsi dan tanpa preskripsi, vitamin, atau suplemen herba.

Beritahu doktor anda jika anda mengambil ubat-ubatan seperti *warfarin*, *carbamazepine*, *phenytoin* dan *theophylline* sebab dos ubat-ubatan tersebut mungkin perlu diubahsuai.

Cara menggunakan ENSPRYNG

Patuhi semua arahan yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti.

Sila tanya doktor anda atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

- Berapa banyak harus digunakan

- ENSPRYNG perlu diambil secara suntikan bawah kulit (subcutaneous)
- Pastikan keseluruhan kandungan jarum disuntik setiap kali.

Pada mulanya, doktor atau jururawat anda mungkin akan memberi suntikan ENSPRYNG untuk anda. Walau bagaimanapun, doktor anda mungkin memutuskan bahawa anda

atau pengasuh melakukan suntikan ENSPRYNG sendiri.

- Anda atau pengasuh anda akan diberikan latihan tentang cara penyuntikan ENSPRYNG.
- Bercakap dengan doktor atau jururawat anda jika anda atau pengasuh anda mempunyai pertanyaan.

Rujuklah kepada arahan penggunaan terperinci yang disertakan dengan ENSPRYNG untuk maklumat mengenai cara pengambilan atau pemberian ENSPRYNG pada bahagian akhir risalah ini.

- Bila perlu digunakan

- Ambil 3 suntikan pertama ENSPRYNG untuk 2 minggu sekali. Ini dikenali sebagai *loading dose*.
- Kemudiannya, suntikan akan diberikan setiap 4 minggu. Ini dikenali sebagai *maintainance dose* dan teruskan dengan suntikan 4 minggu sekali selama doktor memberitahu anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Terus menggunakan ENSPRYNG selama doktor memberitahu anda. Jangan hentikan rawatan ENSPRYNG melainkan doktor anda menyuruhnya. Sila tanya doktor, jururawat atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

- Jika terlupa menggunakan

Untuk rawatan berkesan sepenuhnya, ia adalah penting untuk terus suntikan.

Sekiranya doktor atau jururawat anda memberikan suntikan anda dan anda tidak hadir untuk temu janji, sila buat temu janji yang lain segera.

Sekiranya anda menyuntik ENSPRYNG sendiri dan anda terlepas suntikan, suntikannya secepat mungkin. Jangan tunggu sehingga dos seterusnya. Selepas anda menjalani suntikan untuk dos yang terlepas, suntikan anda seterusnya hendaklah sama ada:

- untuk *loading dose* - 2 minggu kemudian

- untuk *maintainance dose* - 4 minggu kemudian

Sila merujuk kepada doktor, ahli farmasi atau jururawat anda jika anda tidak pasti.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

ENSPRYNG menggunakan jarum suntikan pra-isi maka tidak mungkin anda akan menerima terlalu banyak. Walau bagaimanapun, jika anda bimbang, sila hubungi doktor, ahli farmasi atau jururawat anda.

Jika anda terambil suntikan lebih banyak dos daripada yang sepatutnya, beritahu doktor atau segera ke unit kecemasan yang terdekat. Bawa sekali ubat/ kotak ubat dan risalah ini.

Semasa menggunakan ENSPRYNG

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan doktor anda sekiranya anda tidak mengambil ubat anda seperti yang ditetapkan. Jika tidak, doktor mungkin berfikir bahawa ia tidak berkesan dan mengubah rawatan anda tanpa keperluan.

Sila beritahu doktor anda jika anda merasakan simptom anda menjadi semakin teruk selepas mengambil ENSPRYNG.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ENSPRYNG atau menukar dos tanpa pemeriksaan terlebih dahulu dengan doktor anda.

Jangan berikan ENSPRYNG kepada sesiapa pun walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

Jangan berikan ENSPRYNG kepada kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Ini kerana ENSPRYNG belum dikaji dalam kumpulan usia ini.

Jangan mengambil ubat-ubatan lain sama ada ubat preskripsi atau tanpa preskripsi, sebelum memberitahu

ENSPRYNG®/™ 120MG/1ML

Solution For Injection In A Pre-Filled Syringe)
Satralizumab

doktor, ahli farmasi anda terlebih dahulu.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Sekiranya anda hamil, atau merancang untuk hamil, menyusu bayi, sila berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

Doktor anda mungkin akan menasihati anda untuk berhenti menyusu semasa rawatan dengan ENSPRYNG.

Kesan-kesan sampingan

Maklumkan doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin sekiranya anda rasa tidak sihat semasa anda menggunakan ENSPRYNG.

Semua ubat boleh mendatangkan kesan sampingan, tetapi bukan setiap orang akan mengalaminya.

Tindak balas alergi/alahan

Jika anda perasan mana-mana kesan-kesan sampingan alahan di bawah semasa/selepas suntikan, maklumkan doktor anda atau segera ke unit kecemasan yang terdekat:

- sesak dada
- kesukaran bernafas
- demam atau menggigil
- pening
- bengkak pada bibir, lidah atau muka
- ruam, gatal-gatal, geligata

Jangan mengambil dos seterusnya sehingga anda berbincang dengan doktor anda dan doktor anda memberitahu anda untuk mengambil dos seterusnya.

Reaksi berkaitan dengan suntikan (sangat biasa: boleh mempengaruhi lebih daripada 1 dari 10 orang)

Dalam kebanyakan kes, ini adalah reaksi ringan, tetapi ada yang serius.

Maklumkan kepada doktor atau jururawat anda dengan segera sekiranya anda mempunyai tanda-tanda ini semasa atau selepas

suntikan, terutamanya dalam 24 jam pertama selepas suntikan:

- kemerahan, gatal, sakit atau bengkak di mana suntikan diberikan
- ruam, kulit merah atau gatal atau gatal-gatal
- rasa panas (*flushed*)
- sakit kepala
- kerengsaan tekak, bengkak atau sakit
- sesak nafas
- tekanan darah rendah (pening dan pening kepala)
- demam atau menggigil
- berasa letih
- berasa sakit, atau cirit-birit
- degupan jantung yang cepat, jantung berdebar atau berdebar (*palpitations*).

Maklumkan kepada doktor atau jururawat dengan segera jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan di atas.

Kesan sampingan lain:

Sangat biasa (boleh mempengaruhi lebih daripada 1 dari 10 orang)

- sakit kepala
- sakit sendi
- kadar lipid darah (lemak) yang tinggi
- tahap rendah sel darah putih dalam ujian

Biasa (boleh mempengaruhi sehingga 1 dari 10 orang)

- berasa kaku
- migrain
- degupan jantung perlahan (bradikardia)
- peningkatan tekanan darah
- tidak dapat tidur
- bengkak pada kaki, kaki atau tangan bawah
- ruam atau gatal
- alahan atau demam alergi
- radang perut (gastritis), termasuk sakit perut dan loya
- kenaikan berat badan
- ujian darah menunjukkan:
 - tahap fibrinogen rendah (protein yang terlibat dalam pembekuan darah)
 - tahap enzim hati yang tinggi

(transaminase, kemungkinan tanda masalah hati)

- tahap tinggi bilirubin (kemungkinan tanda masalah hati)
- tahap platelet rendah (yang boleh menyebabkan pendarahan atau lebam dengan mudah)

Ini bukanlah senarai kesan sampingan berkemungkinan yang lengkap. Doktor atau ahli farmasi anda mempunyai senarai kesan sampingan yang lebih lengkap. Kesan sampingan lain mungkin berlaku pada segelintir orang dan mungkin terdapat kesan sampingan yang masih belum diketahui.

Maklumkan doktor anda sekiranya anda perasan apa-apa perkara lain yang membuatkan anda berasa tidak sihat, walaupun ia tiada dalam senarai ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my

[Consumers-> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) atau Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan ENSPRYNG

- Penyimpanan

- Jauhkan ubat ini dari pandangan dan jangkauan kanak-kanak.
- Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang tertera pada label dan kotak jarum suntikan yang telah diisi sebelumnya setelah 'EXP'. Tarikh luput merujuk pada hari terakhir bulan itu.
- Simpan ENSPRYNG dalam peti sejuk pada suhu 2 hingga 8°C. Jangan bekukan. Jangan gunakan picagari jika sudah dibekukan. Sentiasa pastikan picagari sentiasa kering.
- Sentiasa simpan ubat ini di dalam karton untuk melindunginya daripada cahaya dan lembapan.

ENSPRYNG®TM 120MG/1ML

Solution For Injection In A Pre-Filled Syringe)
Satralizumab

- Jika belum dibuka dan disimpan di dalam kotak, *ENSPRYNG* boleh dikeluarkan daripada peti sejuk di bawah 30 ° C untuk satu jangka masa sehingga 8 hari. Jangan kembalikan *ENSPRYNG* ke peti sejuk.
- Jangan gunakan dan buang jarum suntikan pra-isi sebelumnya jika ia telah dikeluarkan dari luar peti sejuk selama lebih dari 8 hari.

Jangan gunakan ubat ini jika ubat kelihatan keruh, berubah warna atau mengandungi zarah halus. *ENSPRYNG* adalah cecair tidak berwarna hingga sedikit kuning.

Ubat mesti digunakan setelah menanggalkan penutup jarum dan tidak lebih dari 5 minit untuk mengelakkan ubat itu kering dan menyumbat jarum. Jika tidak digunakan dalam masa 5 minit setelah menanggalkan penutup jarum, picagari tersebut harus dibuang ke dalam bekas yang tahan tusukan atau bekas tajam dan picagari yang baru patut digunakan.

- **Pelupusan**

Kegunaan picagari adalah hanya untuk sekali sahaja dan perlu dibuang selepas suntikan tersebut. Lupuskan picagari serta jarum (dilindungi pengawal jarum) ke dalam bekas tusuk khas yang diarahkan oleh doktor, jururawat, atau ahli farmasi.

Jangan sekali-kali meletakkan picagari yang telah diguna ke dalam bekas sampah yang biasa.

Maklumat Lanjut

Bagaimana rupa bentuk ENSPRYNG

ENSPRYNG dibekalkan sebagai picagari pra-isi Satralizumab 120 mg/mL. Larutan untuk suntikan ini tidak berwarna hingga sedikit kekuningan (PFS) dilengkapi dengan peranti keselamatan jarum.

- **Bahan-bahan kandungan**
- **Ramuan Aktif:**

satralizumab

- **Bahan Tidak Aktif:**
L-histidine, L-aspartic acid, L-arginine hydrochloride, poloxamer 188, water for injection

Nombor MAL

MAL22046009ACRZ

Pengilang

Made for Hoffman-La Roche Ltd.,
Basel, Switzerland
by Chugai Pharma Manufacturing
Co., Ltd, Japan

Pemegang Pendaftaran Produk

Roche (M) Sdn. Bhd.
Level 21, The Pinnacle,
Persiaran Lagoon, Bandar Sunway,
47500 Subang Jaya, Selangor,
Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

02 August 2024
MYPILENSPRYNG20240802CDS5
.1 (BM)

Nombor Siri

NPRA (R3/01)22122022/0231

Arahan untuk melakukan suntikan sendiri

Sila membaca arahan berikut semasa:-

- Sebelum anda mula menggunakan picagari pra-isi anda
- Setiap kali anda mendapat isian semula preskripsi, kerana ia mungkin mengandungi maklumat baharu.
- Maklumat ini tidak menggantikan nasihat daripada doktor atau jururawat anda tentang keadaan perubatan atau rawatan anda.
- Doktor atau jururawat anda akan memutuskan sama ada anda atau penjaga boleh memberi anda suntikan *Enspryng* di rumah. Mereka juga akan menunjukkan kepada anda atau penjaga cara yang betul dan selamat untuk menggunakan picagari sebelum anda menggunakannya buat kali pertama.
- Berbincang dengan doktor atau jururawat anda jika anda mempunyai sebarang soalan.

Maklumat penting

- Setiap picagari diisi terlebih dahulu dengan ubat yang dipanggil *Enspryng*.
- Setiap karton *Enspryng* mengandungi hanya 1 picagari yang telah diisi sebelumnya.
- Setiap picagari pra-isi boleh digunakan sekali sahaja.
- Jangan berkongsi picagari anda dengan orang lain.
- Jangan tanggalkan penutup jarum sehingga anda bersedia untuk menyuntik *Enspryng*.
- Jangan gunakan picagari jika ia telah terjatuh atau rosak.
- Jangan cuba mengasingkan picagari pada bila-bila masa.
- Jangan biarkan picagari tanpa pengawasan.
- Jangan gunakan semula picagari yang sama


**Enspryng pre-filled syringe
(Rujuk Rajah A dan Rajah B)**

ENSPRYNG®TM 120MG/1ML


Solution For Injection In A Pre-Filled Syringe)

Satralizumab

Sebelum
penggunaan:




Selepas
penggunaan:



Penyediaan ENSPRYNG


1. Keluarkan karton yang mengandungi picagari dari peti sejuk dan letakkan di permukaan kerja yang bersih dan rata (seperti meja).
2. Periksa tarikh luput (EXP) di belakang karton (Lihat Rajah C). Jangan guna jika tarikh luput pada karton telah berlalu.
3. Periksa bahagian depan karton untuk memastikan ia terkedap rapi (Gambar C). Jangan guna jika penutupnya telah terbuka.

Jangan guna jika tarikh luput telah berlalu atau pendedapnya terbuka. Seterusnya ikut Langkah 21 “Pelupusan ENSPRYNG” dan hubungi pembekal penjagaan kesihatan anda.



- Periksa tarikh luput (belakang karton)
- Periksa sama ada karton ditutup rapi


4. Buka karton yang dikedap rapi (Lihat Rajah D).



5. Tarik keluar picagari dari karton secara perlahan-lahan dengan memegang badan picagari (Lihat Rajah E).


Jangan:

- terbalikkan karton untuk mengeluarkan picagari.
- sentuh pelindung pengaktifan kerana ini boleh merosakkan picagari
- pegang pada pelocok atau penutup jarum.



Periksa picagari (Lihat Rajah F)

6. Periksa tarikh luput pada picagari. Jangan guna picagari jika tarikh luput sudah berlalu.
7. Periksa picagari untuk melihat sama ada terdapat sebarang kerosakan. Jangan gunakan picagari jika didapati retak atau pecah.
8. Periksa menerusi tetingkap dan pastikan cecair di dalamnya kelihatan jernih, tidak berwarna hingga sedikit kekuningan. Jangan suntik ubat jika cecair di dalamnya kelihatan keruh, bertukar warna, atau mengandungi partikel.
- Mungkin terdapat sedikit gelembung udara di dalam picagari. Anda tidak perlu mengeluarkan gelembung udara itu kerana ia adalah perkara biasa.



- Periksa tarikh luput
- Periksa cecair
- Periksa picagari untuk melihat sama ada terdapat kerosakan

Jangan gunakan picagari selepas tarikh luput (EXP), picagari itu rosak atau cecair di dalamnya kelihatan keruh, bertukar warna atau mengandungi partikel. Seterusnya ikut Langkah 21 “Pelupusan ENSPRYNG” dan hubungi pembekal penjagaan kesihatan anda.

Biarkan picagari memanaskan

9. Selepas picagari diperiksa, letakkannya di atas permukaan kerja yang bersih dan rata (seperti meja) selama 30 minit. Ini akan membolehkan ia mencapai suhu bilik. Ia sangat penting agar picagari dibiarkan memanaskan secara perlahan-lahan kerana menyuntik ubat yang sejuk boleh membuat anda berasa tidak selesa dan membuatkan pelocok agak sukar untuk ditekan.

Jangan:

- percepatkan proses pemanasan dengan apa cara pun, seperti menggunakan ketuhar gelombang mikro atau merendamkan picagari di dalam air suam.
- tanggalkan penutup jarum semasa jarum hampir mencapai suhu bilik.

10. Basuh tangan anda sehingga bersih dengan menggunakan sabun dan air.


Pilih tempat suntikan

11. Pilih tempat suntikan anda sama ada di:
 - bahagian bawah perut (abdomen) atau
 - bahagian depan dan tengah paha.

(Lihat Rajah G).

ENSPRYNG®TM 120MG/1ML

Solution For Injection In A Pre-Filled Syringe)
Satralizumab



Rajah G

Tempat suntikan

- Jangan suntik ke dalam kawasan 2-inci (5 cm) di sekitar pusat anda.
- Jangan suntik pada tahi lalat, parut, lebam atau kawasan kulit yang sakit, merah, keras atau terluka.

Pilih tempat suntikan yang berbeza untuk setiap suntikan baharu.

Pilih jarum yang sudah digunakan dengan tempat yang berbeza untuk menyuntik dengan jaraknya hendaklah sekurang-kurangnya linci (2.5 cm) dari tempat yang terakhir anda suntik.

12. Sapukan tempat suntikan dengan pad beralkohol dan biarkan ia kering.

Jangan:

- kipas atau tiup di kawasan yang telah anda cuci.
- sentuh tapak suntikan sekali lagi sebelum anda menyuntik.

Cara Menyuntik ENSPRYNG

13. Pegang badan picagari antara ibu jari dan jari telunjuk anda. Dengan tangan yang lain, tanggalkan terus penutup jarum. Anda mungkin melihat setitik cecair di bahagian hujung jarum. Ini adalah perkara biasa dan tidak memberi kesan pada dos anda.

- **Gunakan picagari dalam masa 5 minit selepas penutup ditanggalkan jika tidak, jarum mungkin tersumbat.**

Jangan:

- tanggalkan penutup jarum sehingga anda betul-betul bersedia untuk menyuntik ENSPRYNG.
- pasang semula penutup jarum selepas ia ditanggalkan kerana ini boleh merosakkan jarum.
- sentuh jarum atau membiarkan jarum menyentuh sebarang permukaan selepas penutup jarum

ditanggalkan.


14. Buang penutup jarum segera ke dalam bekas peralatan tajam kalis tusukan. Lihat Langkah 21 "Pelupusan ENSPRYNG".

15. Pegang badan picagari dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Dengan tangan yang lain, cubit sedikit kulit anda yang telah dibersihkan.

16. Dengan pergerakan pantas, cucuk jarum pada sudut di antara 45° hingga 90° (Lihat Rajah H).

Jangan:


- suntik jarum menembusi pakaian.
- tukar sudut suntikan.
- masukkan jarum semula



Rajah H

17. Setelah jarum dimasukkan ke dalam kulit, lepaskan cubitan kulit.


18. Suntik semua dos ubat dengan menolak pelocok secara perlahan-lahan ke bawah sepenuhnya sehingga ia menyentuh pelindung pengaktifan (Lihat Rajah I).



Rajah I

19. Secara perlahan-lahan lepaskan pelocok dan biarkan jarum

keluar dari kulit pada sudut yang sama ia dimasukkan.



Rajah J

- **Pelindung jarum kini menutupi jarum.** Jika jarum tidak ditutup, letakkan picagari ke dalam bekas peralatan tajam kalis tusukan dengan berhati-hati supaya tidak tercedera. Lihat Langkah 21 "Pelupusan ENSPRYNG".

Penjagaan tempat suntikan

20. Mungkin berlaku sedikit pendarahan pada tempat suntikan. Anda boleh memberikan tekanan lembut dengan bebola kapas atau kain kasa pada tempat suntikan tetapi **jangan** gosok bahagian tersebut. Jika perlu, anda juga boleh menutup bahagian yang anda suntik dengan pembalut kecil. Jika kulit anda tersentuh ubat, basuh bahagian itu dengan air.

Pelupusan ENSPRYNG

21. Jangan cuba tutup semula picagari anda.

Masukkan picagari anda yang sudah digunakan ke dalam bekas pelupusan peralatan tajam sejurus selepas digunakan. Jangan buang (lupuskan) jarum suntikan ke dalam tong sampah rumah anda.

- Sila tanya doktor atau ahli farmasi anda tentang tempat yang anda boleh mendapatkan bekas peralatan tajam atau jenis bekas kalis tusukan lain yang boleh anda gunakan untuk melupuskan picagari dan penutup jarum yang sudah digunakan dengan selamat, jika anda belum mempunyai bekas seperti itu.

- Buang bekas pelupusan benda

ENSPRYNG^{®/TM} 120MG/1ML

Solution For Injection In A Pre-Filled Syringe)

Satralizumab

tajam yang telah penuh seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jangan buang bekas pelupusan benda tajam yang penuh ke dalam tong sampah isi rumah.
- Jangan kitar semula bekas pelupusan peralatan tajam yang telah penuh