

# SPASMOLIV FILM-COATED TABLET 10MG

Hyoscine N-butylbromide 10mg.

## Apakah yang ada pada risalah ini?

- Apakah kegunaan Spasmoliv
- Bagaimana Spasmoliv berfungsi
- Sebelum menggunakan Spasmoliv
- Cara menggunakan Spasmoliv
- Semasa menggunakan Spasmoliv
- Kesan-kesan sampingan
- Cara penyimpanan dan pelupusan Spasmoliv
- Maklumat lanjut
- Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
- Tarikh kemaskini

## Apakah kegunaan Spasmoliv

Digunakan untuk melegakan kekejangan:

- disebabkan oleh ulser perut dan ulser usus kecil.
- di dalam usus kecil dan usus besar.
- disebabkan oleh batu hempedu atau batu buah pinggang.
- semasa sakit haid.
- disebabkan oleh pergerakan pantas saluran usus.
- disebabkan oleh muntah selepas pembedahan.

## Bagaimana Spasmoliv berfungsi

Hyoscine N-butylbromide adalah *antispasmodic*, ia membantu merehatkan otot yang kejang dan melegakan kekejangan perut yang sakit.

## Sebelum menggunakan Spasmoliv

### Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Spasmoliv jika anda alah (hipersensitif) terhadap bahan-bahan yang terkandung dalam ubat ini.

### Sebelum mula menggunakan

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Spasmoliv jika anda:

- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusu.
- mempunyai gangguan saraf-otot.
- mempunyai masalah gastrousus tersumbat.
- mempunyai keradangan usus.
- mempunyai penyakit jantung atau saluran darah.
- mempunyai glaukoma (tekanan di dalam mata meningkat).
- mempunyai kelenjar tiroid yang terlampau aktif.
- demam.

### Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau kebelakangan ini

mengambil ubat lain, termasuk sebarang ubat tanpa preskripsi.

## Cara menggunakan Spasmoliv

### Berapa banyak harus digunakan

*Dewasa:* 1 hingga 2 tablet empat kali sehari.

*Kanak-kanak berusia 6 tahun ke atas:*

1 tablet tiga kali sehari.

### Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

### Berapa lama perlu digunakan

Berdasarkan preskripsi doktor atau ahli farmasi. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

### Jika terlupa menggunakannya

Ambil secepat mungkin sebaik sahaja anda teringat. Jika dos seterusnya adalah hampir, ambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

### Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Simptom terlebih dos adalah resah, perasaan teruja, kulit kemerahan, dahaga, tekanan darah rendah, sukar untuk bernafas, dan koma.

Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda terambil secara berlebihan atau bimbang dengan keadaan yang dialami.

## Semasa menggunakan Spasmoliv

### Perkara yang perlu dilakukan

- Sentiasa cuci tangan sebelum mengambil ubat.
- Amalkan pengambilan ubat pada waktu yang sama setiap hari.
- Jangan kunyah tablet. Telan tablet bersama air.

### Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil ubat ini tanpa preskripsi doktor atau ahli farmasi.

### Perkara yang perlu diberi perhatian

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- alah terhadap bahan-bahan yang terkandung dalam ubat ini.
- hamil atau menyusukan anak.
- mengalami masalah saraf-otot, gastrousus, jantung atau saluran darah.

## Kesan-kesan sampingan

- mulut kering.
- Penglihatan kabur.
- Denyutan jantung terlalu pantas.

Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan atau masalah alahan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-85535550, atau lawan web [portal.bpfk.gov.my](http://portal.bpfk.gov.my) (*consumers* → *Reporting*)

## Cara penyimpanan dan pelupusan Spasmoliv

### Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C.

Jauhi dari kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput.

### Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi.

## Maklumat lanjut

### Rupa dan warna produk

Tablet bulat berwarna putih dan bersalut lapis.

Didapati dalam 10 tablet per blister strip, 100, 500 dan 1000 tablet dalam satu kotak.

### Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

Hyoscine N-butylbromide.

Bahan tidak aktif

Magnesium Stearate, Purified Talcum, Starch Lactose Granules, HPMC Compound Mix, Microcrystalline Cellulose, Colloidal Silicon Dioxide, Purified Water.

### Nombor Pendaftaran

MAL19860125AZ

## Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd  
1-5 Cheng Industrial Estate,  
75250 Melaka, Malaysia.

### Tarikh kemaskini

25 March 2020

### Serial Number

NPRA(R2/1)200325/403