



Colimix<sup>®</sup>  
Syrup

Colimix<sup>®</sup>  
Syrup

Relieves infant colic,  
wind and abdominal  
discomfort



For children and adults

60ml



5

004

Colimix<sup>®</sup>  
Syrup

Dosage:

- Infants over 6 months: 5ml before each feed. Do not exceed 4 doses in 24 hours.
- Children 4 to 12 years: 5 to 10ml 4 times daily.
- Adults: 10ml 3 to 4 times daily and at bedtime. Or as advised by a physician.

Caution: It is dangerous to exceed the stated dose.

Dicyclomine is not recommended for use in infants under 6 months of age

Each 5 ml contains:  
 Dicyclomine HCl 5 mg  
 Simethicone 50 mg  
 Parabens 0.25% w/v as preservative

Storage: Store below 30°C. Protect from light.

Refer to enclosed leaflet for further information.

SHAKE WELL BEFORE USE



9 556492 003070



Manufactured and Marketed by  
**Xepa-Soul Pattinson (M) Sdn Bhd**  
 1-5, Cheng Industrial Estate,  
 75250 Melaka, Malaysia.

Colimix<sup>®</sup>  
Syrup

Melegakan kesakitan  
spasma usus pada bayi,  
kembung dan  
ketidakselesaan perut



Untuk kanak-kanak  
dan dewasa

60ml



B  
MFG  
EXP



Colimix<sup>®</sup>  
Syrup

Dos:

- Bayi berumur lebih dari 6 bulan: 5ml sebelum setiap penyusuan. Jangan melebihi 4 dosis dalam tempoh 24 jam.
  - Kanak-kanak 4 - 12 tahun: 5 - 10ml 4 kali sehari.
  - Dewasa: 10ml 3 - 4 kali sehari dan sebelum waktu tidur.
- Atau dinasihatkan oleh para doktor.  
 Amaran: Adalah merbahaya jika melebihi dos yang dinyatakan.

Dicyclomine tidak harus diberi kepada kanak-kanak berumur kurang dari 6 bulan

Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya.  
GONCANG SEBELUM GUNA

原量:

- 6个月以上婴儿: 喂奶前服用5毫升。
- 小童: 4至12岁, 每次5至10毫升, 每日4次。
- 成人: 每次10毫升, 每日3至4次及在睡前服用。或遵照医生指示。

注意: 原食过量有危险。  
置放在不高于30°C阴凉处。远离光线。

不适用于6个月以下的婴儿。

服用前请摇均匀。

**CONTROLLED MEDICINE**  
 KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
 JAUHI DARI KANAK-KANAK  
 储存于儿童的活动范围以外

FOR ORAL USE ONLY

MAL 19871663AZ  
 SIN 3333P  
 HK-29775

CODE C00101  
 MM Reg: No. R1808AA855  
 BRU 10040454P



Colimix<sup>®</sup>  
Syrup

Colimix<sup>®</sup>  
Syrup

Relieves infant colic,  
wind and abdominal  
discomfort



For children and adults

90ml



6

005

Colimix<sup>®</sup>  
Syrup

**Dosage:**

- Infants over 6 months: 5ml before each feed. Do not exceed 4 doses in 24 hours.
- Children 4 to 12 years: 5 to 10ml 4 times daily.
- Adults: 10ml 3 to 4 times daily and at bedtime. Or as advised by a physician.

**Caution:** It is dangerous to exceed the stated dose.

Dicyclomine is not recommended for use in infants under 6 months of age


Each 5ml contains:

Dicyclomine HCl	5mg
Simethicone	50mg
Parabens 0.25%w/v as preservative	

**Storage:** Store below 30°C. Protect from light.

Refer to enclosed leaflet for further information.

SHAKE WELL BEFORE USE



9 556492 002257



Manufactured and Marketed by  
**Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd**  
1-5 Cheng Industrial Estate  
75250 Melaka, Malaysia

Colimix<sup>®</sup>  
Syrup

Melegakan kesakitan  
spasma usus pada bayi,  
kembung dan  
ketidakselesaan perut



Untuk kanak-kanak  
dan dewasa

90ml



B  
MFG  
EXP



Colimix<sup>®</sup>  
Syrup

**Dos:**

- Bayi berumur lebih dari 6 bulan: 5ml sebelum setiap penyusuan. Jangan melebihi 4 dosis dalam tempoh 24 jam.
- Kanak-kanak 4 -12 tahun: 5 - 10ml 4 kali sehari.
- Dewasa: 10ml 3 - 4 kali sehari dan sebelum waktu tidur.

Atau dinasihatkan oleh para doktor.

Amaran: Adalah merbahaya jika melebihi dos yang dinyatakan.

Dicyclomine tidak harus diberi kepada kanak-kanak berumur kurang dari 6 bulan

Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya.

**GONCANG SEBELUM GUNA**

**dosage:**

- 6个月以上婴儿: 喂哺前服用 5 毫升, 每日不可超过 4 次剂量。
- 小童: 4 至 12 岁, 每次 5 至 10 毫升, 每日 4 次。
- 成人: 每次 10 毫升, 每日 3 至 4 次及在睡前服用, 或遵照医生指示。

注意: 服药过量有危险。置放在不高于 30°C 阴凉处, 远离光线。

不适用于 6 个月以下的婴儿。

服用前请摇均匀。

**CONTROLLED MEDICINE**

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

JAUHI DARI KANAK-KANAK

储存于儿童的活动范围以外

**FOR ORAL USE ONLY**

MAL 19871663AZ

SIN 3333P

HK-29775

CODE C00104

MM Reg: No. R1808AA855

BRU 10040454P